

OMNIBONI  
FERRARI

MEDICI AC PHILOSOPHI  
DE ARTE MEDICA  
INFANTIVM,

LIBRI QVATVOR.

QVORVM DVO PRIORES DE  
*tuenda eorum sanitate, posteriores de cu-  
randis Morbis agunt.*

AD EXCELLENTISSIMVM CELEBERRIMVMQVE  
*Philosophorum ac Medicorum Veronensium  
Collegium.*



B R I X I AE,

*Apud Franciscum, & Pet. Mariam fratres, de Marchettis.*

M. D. LXXVII.

C

OMNIBUS

PER ALII

MEDICI AD HUNGARIAM

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO



DE REGIO

DE REGIO

DE REGIO



# EXCELLENTISSIMO CELEBERRIMOQ. MEDICORVM

AC PHILOSOPHORVM VERONEN-  
SIYM COLLEGIO

OMNIBONVS FERRARIYS MEDICVS,

ET PHILOSOPHVS

S. P. D.



**Q**UO PRIMO Cuiq; Viri excellentissimi, duo potissimum in omni vita debent esse proposita. Primum, vt cum se natum ad agendum semper aliquid nobilitate hominis dignum intelligat, inertiam vitet, ne otio sese tradens marcescat, vitamq; silentio transeat. Alterum, vt de se benemeritis gratum se, ac memorem præbeat, cumq; ab aliis hominibus, qui vel adhuc viuunt, vel naturæ iam concesserunt, innumerabilia acceperit beneficia, ipse quoque ad humani generis vtilitatem, aliquid, quod & præsentibus, & futuris prodesse queat, in medium proferat. Cum igitur animaduertentem veteres, qui ad hunc vsque diem de tuenda infantum sanitate scripserunt, de morbis nutricis, re admodum infantum valetudini necessaria, nihil, aut certe parum scripsisse, neque de morbis singulis, qui illi ætati solent euenire, plenè, aut methodicè curationem propriam tradidisse. Inter recentiores autem,

etiam quidam nonnulla tetigerunt, multa tamen, quæ vel  
ad nutricem, vel ad infantium curam, & morbos per-  
tinent, prætermisissæ, aut modicæ, aut laconicæ, potius  
de illis locutos fuisse, operepretium me facturum existi-  
maui, si munus hoc diligentius ipse pertractarem. Itaque  
quatuor libris à me summis vigiliis, laboribusq; & quam  
maxima potui, diligentia conscriptis, hanc medicinæ par-  
tem totam complexus sum. Quos quidem libros cum in  
lucem ad communem omnium vsum, & commodum es-  
sem editurus, meminissimq; me septimum iam annum in  
hac illustri, ac celeberrima patria vestra commorantem,  
multa à vobis, cum singulis, tum vniuersis beneuolentiæ,  
atque humanitatis officia percepisse, eos vobis, & excellen-  
tissimo Collegio vestro dicare constitui, vt & grati animi,  
& singularis meæ ergà vos obseruantia in perpetuum es-  
sent testes; atque eiusdem Collegii, cui nullum aliud in to-  
ta Europa, vel nobilitate, vel eruditione, vel priuilegiis,  
atque liccirco etiam auctoritate est anteponendum, præ-  
sidio muniti; tutiores, & grauioribus in manus hominum  
prodirent. Nunc igitur, viri clarissimi, & præstantissimi,  
pro summa humanitate, quam semper in vno quoque  
vestrum expertus sum, lucubrationes has nostras benigne,  
vt soliti estis, suscipite, & in exiguo munere magnum er-  
gà vos largientis amorem, ac beneuolentiam complecti-  
mini. Valete. Veronæ Kal. Martii. 1577.



# OMNIBONVS FERRARIVS

MEDICVS, ET PHILOSOPHVS

CANDIDIS LECTORIBVS.

S. D.



VM FIERI plerunque soleat, ut, quæ in una-  
quaque arte scripta quotidie in publicum pro-  
deant, ea non ab eius peritis modo, sed à quam-  
plurimis etiam aliarum studiosis interdum legan-  
tur. Nos in hoc opere nostro scribendo, in quo  
artem medicam infantium tradere sumus conati, quo ea facilius  
ab omnibus percipi posset, dedimus operam ut tritis hodiè, &  
apud medicos usitatis uocabulis, ac dicendi formis in loco utere-  
mur, nè medicum professi inancem potius nobis cultæ latinæ lin-  
guæ plausum, quam solidum alijs utilis ad uitam scientiæ nostræ  
fructum quaerere uoluissè uideremur. Quo quidem factum est, ut  
ad maiorem etiamnum quorumuis cognitionem, qui in horum li-  
brorum lectionem inciderent, auctorum nomina, libros, eorumque  
capita, undè maxima ex parte hæc mutuati sumus, quòd ea in  
margine, propter eius angustias commodè integra perscribi non po-  
tuerant, in tabella quadam seorsum adiuncta explicata haberi uo-  
luerimus. Quòd si hunc laborem nostrum uobis aliqua ex parte  
satisfecisse, & profuisse senserimus, D. O. M. concedente, metho-  
dum de tuenda senum ualetudine, & curandis eorum affectibus,  
quam præ manibus habemus, alacriori animo absoluemus. Valete  
nostri memores.

- Act. lib. 4. cap. 7.* *Actius libro quarto capite septimo.*  
*Gal. lib. de causis morborum cap. 7.* *Galenus libro de causis morborum capite septimo.*  
*Gal. 1. de sanit. tuen. cap. 7.* *Galenus libro primo de sanitate tuenda capite septimo.*  
*Gal. quod ani. mor. temp. corporis sequant.* *Galenus quod animi mores corporis temperaturam sequantur.*  
*Gal. 5. de simpl. med. fac. cap. 21.* *Galenus libro quinto de simplicium medicamentorum facultate ca. uigesimo primo.*  
*Aul. Gel. lib. 12.* *Aulus Celsus libro duodecimo.*  
*Virg. lib. 4. Aeneid.* *Virgilius libro quarto Aeneidos.*  
*Auic. 1. F. 1. doc. 1. cap. 2.* *Auicenna libro primo Fen. tertia doctrina prima capite secundo.*  
*Paul. 4. cap. 2.* *Paulus Aegineta libro 4 capite secundo.*  
*Gal. 6. de anat. adminis. cap. 1.* *Galenus libro sexto de anatomicis administrationibus capite primo.*  
*Gal. 1. de semine cap. 7.* *Galenus libro primo de semine capite septimo.*  
*Gal. lib. 3. de alim. fac. ca. 15.* *Galenus libro tertio de alimentorum facultate capite decimo quinto.*  
*Gal. de succor. bon. & uit. cap. 8.* *Galenus de succorum bonitate, & uitio capite octauo.*  
*Gal. 6. de morb. uulg. com. 5.* *Galenus libro sexto de morbis uulgaribus commentario quinto.*  
*Hip. 6. de morb. uulg. com. 4.* *Hippocrates libro sexto de morbis uulgaribus commentario quarto.*  
*Gal. de uenae sectione ad Eras. cap. 5.* *Galenus de uenae sectione ad Erasistratum capite quinto.*  
*Auic. 3. F. 20. tract. 1. cap. 11.* *Auicenna libro tertio Fen. uigesima, tractatu primo cap. undecimo.*  
*Orib. lib. 5. cap. 3.* *Oribasius libro quinto capite tertio.*  
*Hip. 1. aphor. 20.* *Hippocrates libro primo aphorismorum aphorismo uigesimo.*

- Gal. 1. ad Glauco. cap. 14. Galenus libro primo ad Glauconem capite quartodecimo.
- Gal. de par. pilæ exer. cap. 1. Galenus de parua pilæ exercitatione capite primo.
- Hip. 2. de uict. rat. acut. Hippocrates libro secundo de uictus ratione in morbis acutis.
- Auic. trac. 2. de remed. noc. acci. ex aere cap. prop. Auicenna tractatu secundo de remedijs nocumentorum accidentium ex aere capite proprio.
- Mars. Fici. lib. 2. de uita cap. 11. Marsilius Ficinus libro secundo de uita capite undecimo.
- Cicero 2. de diuin. cir. m. Cicero libro secundo de diuinatione circa medium.
- Gal. lib. 11. de usu part. cap. 8. Galenus libro undecimo de usu partium capite octauo.
- Gal. lib. 8. met. med. cap. 91. Galenus libro octauo methodi medendi capite nonagesimo primo.
- Gal. lib. 1. de comp. med. sec. loc. cap. 9. Galenus libro primo de cõpositione medicamentorũ secundũ locos cap. nono.
- Plinius lib. 20. cap. 3. Plinius libro uigesimo, capite tertio.
- Albertus magnus de mineralibus, lib. 2. tract. 2. cap. 17. Albertus magnus de mineralibus libro secundo, tractatu secundo capite decimo septimo.
- Gal. lib. de atra bile cap. 5. Galenus libro de atra bile capite quinto circa finem.
- Gal. lib. prorrhet. 3. com. 69. Galenus libro prorrhetici Hippocratis tertio commentario 69.
- Gal. lib. 3. prognost. com. 34. Galenus libro tertio prognosticorũ Hipp. commentario trigesimo quarto.
- Gal. lib. 4. aphor. 57. in com. Galenus libro quarto aphorismorũ aphorismo. 57. in commento.
- Hip. lib. 5. prognost. tex. 15. Hippocrates libro tertio prognosticorũ textu decimo quinto.
- Gal. lib. 2. de sympt. caus. cap. 4. Galenus libro secundo de symptomatum causis capite quarto.

- Auic. lib. 3. F. 10. cap. de signis asthm.* *Auicenna libro tertio Fen. x. capite de signis asthmatis.*
- Gal. lib. 1. de loc. affect.* *Galenus libro primo de locis affectibus cap. 4.*
- Gal. 3. de natur. fac. cap. 15.* *Galenus libro tertio de naturalibus facultatibus capite decimo quinto.*
- Gal. lib. finit. med.* *Galenus finitionis medicæ.*
- Alexander tral. lib. 9. cap. 2.* *Alexander tralianus libro nono capite secundo.*
- Arist. lib. 5. de nat. anim.* *Aristoteles libro quinto de natura animalium capite decimo nono.*
- Gal. lib. 2. de natu. huma.* *Galenus libro secundo de natura humana text. 13.*
- Gal. lib. de tum. præter nat.* *Galenus libro de tumoribus præter naturam capite 17. & 18.*
- Cor. Celsi. lib. 6. cap. 18.* *Cornelius Celsus libro sexto capite decimo octauo.*



# INDEX OMNIVM

## Capitum.

### QVAE IN HISCE QVATVOR

Libris de Morbis infantum

tractantur.

Capita		Page
I	<b>D</b> E electione nutricis	2
II	De lacte nutricis	5
III	De uictus ratione nutricis	6
IIII	De cibo, & potu nutricis	8
V	De somno, & uigilia nutricis	10
VI	De coitu nutricis uitando	11
VII	De exercitatione nutricis	12
VIII	De curatione morborum nutricis	13
IX	De tumefactione, et dolore mamarū ob lactis redūctiā.	14
X	De rimis papillarum nutricis	16
XI	De lacte nimis crasso	18
XII	De lacte nimis aquoso	21
XIII	De paucō uel diminuto lacte nutricis	22
XIIII	De lacte imminuto à qualitate calida	23
XV	De diminutione lactis à qualitate frigida	25
XVI	De lacte imminuto propter nimiam lubricitatem alui	27
XVII	De imminutione lactis ob penuriam	30
XVIII	De lacte ob aliquem terrorem perditō, uel imminuto	31
XIX	De coagulatione lactis in casei substantiam	32
XX	De coagulatione lactis in grumos	34
XXI	De suppuratione mammarum	36
XXII	De ratione siccandi lac post ablactationem infantis	37

### CAPITA SECUNDI LIBRI.

I	<b>D</b> E electione aeris	40
II	De infantum acre, qui non habent optimum temperamentum	42
III	De incisione umbilici	43
IIII	De nutritione infantis	ead.
V	De cibo infantis	44
VI	De frictione inunctione infantis	46



VII	De balneo infantis	47
VIII	De fasciando infante	48
IX	De modo cubandi infantis	50
X	De somno ex ploratu infantis conciliando	53
XI	De nutritione seu cibo infantis ab initio dentium productionis usque ad biennium.	55
XII	De lactis, & cibi infantis mutatione	56
XIII	De regimine infantis à dentium productione, usque ad lactis remotionem	58
XIII	De remotione infantis à lacte	61
XV	De ijs quæ pertinent tam ad animi mores, quàm ad tuendam sanitatem infantis.	63

CAP. TERTII LIBRI.

I	<b>D</b> E natura infantium	66
II	De lactea crusta	69
III	De erysipellate	70
IIII	De herpete exquisita	74
V	De herpete exedente	76
VI	De herpete miliarî	78
KII	De achoribus	81
VIII	De fauis	84
IX	De tinca	85
X	De siriâsi	87
XI	De inflatione capitis ab aqua extra cranium.	88
XII	De inflatione capitis ab aqua intra cranium	91
XIII	De inflatione capitis a flatu	93
XIIII	De terribili somno	94
XV	De uigilijs	95
XVI	De epilepsia	97
XVII	De paralyfi	100
XVIII	De conuulsione	101
XIX	De oculorum infusione	105
XX	De strabismo	107
XXI	De palpebrarum crassitie, & pilorum casu	109
XXII	De prurigine palpebrarum	110
XXIII	De dolore aurium	112
XXIIII	De auribus uermiosis	114
XXV	De steremutatione	115

XXVI	De destillatione, & catarrho	117
XXVII	De rimis labiorum	119
XXVIII	De gingivarum prurigine ex dentium productione	120
XIX	De gingivarum abscessibus ex dentium productione	122
XXX	De superflua carne ex dentitione orta	123
XXXI	De uesticulis gingivarum	124
XXXII	De dolore dentis	125
XXXIII	De aphtis	127
XXXIII	De incisione filetti sub lingua infantis	130
XXXV	De ranunculo	131

CAPITA QVARTI LIBRI.

I	De tonsillarum Columellaque inflammatione	134
II	De tussi ex destillatione	137
III	De asthma	141
IIII	De stomachi debilitate	143
V	De uomitu	145
VI	De singultu	147
VII	De colico sine ventris dolore	151
VIII	De fluxu ventris	152
IX	De dysenteria	155
X	De tenesmo	158
XI	De aere constictione	160
XII	De inflatione ventris	161
XIII	De humbricis	164
XIIII	De inflammatione umbelici	170
XV	De tumore seu eminentia umbelici	172
XVI	De calculo uesticae	174
XVII	De urinae incontinentia	176
XVIII	De retentione urinae	178
XIX	De hernia, siue tumore inguinis	181
XX	De procidentia ani	182
XXI	De intertrigine coxarum	184
XXII	De papulis siue uariolis	187
XXIII	De scabie	189
XXIIII	De febre	193
XXV	De ambustis	194

# ANTONII GROTTÆ.

PRAEMIA summa sibi Venus, & Lucina petebant,

Quod primæ humani causâ forent generis:

At Natura inquit, meruit FERRARIUS illa;

Quo fine quid prosunt munia vestra mihi?

PHOEBE tuas habuit semper rarissimas artes;

Dic precor; hoc nostro tempore numquis habet?

OMNIBONI numeros, medicas atque inspicie chartas;

Tu tibi iam poteris dicere, si quis habet.







OMNIBONI FERRARI  
MEDICI AC PHILOSOPHI  
DE ARTE MEDICA  
INFANTIVM.

LIBER PRIMVS.

P R A E F A T I O.



**S**CRIPTVRS Artis medicæ par-  
tem, quæ infantium curam habet, &  
quam Græci pædotrophichin uocant,  
eam in duas præcipuas partes diuiden-  
dam putavi, unam scilicet, quæ ad  
tuendam sanitatem, & alteram,  
quæ ad curationes morborum perti-  
net; Quæ ad tuendam sanitatem attinet, in duos libros  
diuisa est; quorum primus erit præ ipsius tuenda infantis  
sanitate, de electione, uictus ratione, & curatione morbo-  
rum nutricis, cum multi morbi, tam in intemperie, quàm  
in solutione continuitatis, infantibus eueniant, tum pro-  
pter earum ægriitudines, tum etiam propter malam ui-  
ctus rationem, ex qua lac corrumpitur, & generantur

Aetius lib. 4.  
cap. 7.

Gal de can-  
sa morb. c. 7

Gal. lib. 1. de  
sanit. tuen.  
cap. 7.

in ipsis infantibus uarij morbi: Quandoquidem pleraq; nu-  
trices ineptis utentes cibus, uitiosum lac efficiunt; & ex hoc  
diuersis morbis infantes, qui etiam optimam structuram  
adepti sunt, obijciunt, cum enim infantium corpora mollia  
sint, ac penè fluxibilia facile inuertuntur; cum & in exitu a  
matricis utero, non rectè ab obstetricibus excipiuntur, & non  
commodè fascijs inuoluuntur, ac deinceps à nutricibus sine  
modo, aut attolluntur, aut reponuntur, & dùm lactantur, &  
& dùm lauuntur, & dùm fascijs alligantur. Secundus erit  
pro ipsa tuenda sanitate, de uictus ratione, & educatione in-  
fantis: Etenim ex malo regimine alteratur substantia, & de-  
prauatur figura; sed ratione uictus, & tuendæ sanitatis me-  
thodo adhibita, hoc facile euitari poterit, & huiusmodi homo,  
qui arti sanitatis tuendæ traditur educandus, fortunatus utiq;  
erit, si statim editus in lucem ei committatur; Alteram  
uero partem in duos alios pariter diuisilibros, qui ambo  
erunt de medendis ipsis morbis particularibus, qui solent ip-  
sis infantibus contingere, uniuscuiusq; uero sigillatim ex  
rationali methodo curationem apponam.

## DE ELECTIONE NUTRICIS.

### CAP. I.

**C**um satis compertum sit aegritudines corporis tem-  
peraturam sequi, alijs enim pituitosi, alijs biliosi, alijs  
sanguinei, & alijs melancholici morbis corripiuntur, &  
cùm

cum animi etiam mores eandem temperaturam sequi Galenus doceat; propterea semper mater nutricibus pre-  
 rendenda est, nisi ex lactis defectu, aut corruptione, aut agri-  
 tudine, aut malis moribus hoc prohibeatur. Etenim  
 unusquisque sibi persuadet laudabilioribus moribus orna-  
 tam esse matrem, quam nutricem; Qui matris lacte  
 pueri aluntur, ij iam non solum consuetudo, verum etiam  
 maxime proprio utuntur alimento. Lac. n. purioris san-  
 guinis menstrui parti, ex qua fetus in utero alitur, affine  
 est, & nimis inhumanum, & monstrosum esse videtur  
 in uisceribus genuisse, & aluisse filium, postea cum alieno  
 lacte nutricandum tradere. Infans enim à nutritio-  
 ne, & materna custodia separatus, non facile sustinet ea;  
 quæ necessariò accidunt eius uictui, sicuti plantæ, dum in  
 eodem loco, in quo natæ sunt persistunt, aeris ambientis  
 iniurias facile ferunt, sed aliò translatae, radicibus non-  
 dum bene firmatis facile exarescunt; uel ut hædi lacte  
 ouillo, nutriti pilum gignunt teneriorem; Et agni la-  
 cte caprarum aliti lanam ferunt duriorē; eodem mo-  
 do filij aliquandò cum alieno lacte aluntur, magis amant  
 nutricem, quam matrem; prout exemplo Cornelij Sci-  
 pionis patet, qui cum anno ab urbe condita D. I I. ex  
 bello contra Antiochum uictor Romam redisset (ut scri-  
 pium legimus) decem strenuos suos milites ex causa  
 uestalium morte condemnauit, unde à Scipione Afri-  
 cano eius fratre pro mitiore sententia assidue frustra cum  
 deprecatus fuisset, ac clementer postea precibus unius filiae  
 suæ Nutricis condemnatis pepercisset, à nonnullis interro-  
 gatus,

Gal. quod  
ani. morb.Gal. 1. de Ga-  
niz. tuen. c. 7.Gal. 5. de  
simpl. med.  
fac. cap. 22.

gatus, quare gratiam ipsam potius suæ nutricis filiæ, quàm intuitu Scipionis Africani matris filij concessisset; sic respon-  
disse fertur: Ego magis mihi iudico esse matrem quæ, etsi non  
me peperit, per triennium me nutrit, quàm quæ me pepe-  
rit, & postea dereliquit. Ex Aulo Gellio etiam sumitur  
Phauorinus Philosophus, cum audisset à matre cuiusdam  
nobilis puerperæ parcendum esse ei, & adhibendas puero nu-  
trices, nè ad dolores, quos in enitendo tulisset, munus quoq;  
nutritionis graue ac difficile accederet, dixisse, oro te mulier  
sine eam totam, integram esse matrem filij sui, quod est enim  
hoc contrà naturam imperfectum, atq; dimidiatum matris  
genus, peperisse, ac statim ab se se abiecisse: immanissimæ etiã  
feræ filios suos alunt, unde Virgilius, Hyrcanæq; admorunt  
ubera tigres. Verùm si mater erit aliqua legitima de causa  
impedita, tunc ad electionem nutricis erit properandum,  
quæ debet habere has conditiones: Primum ut sit iuuenis, in  
qua ætate, si erit ab annis 25. usq; ad 35. melius erit, quoniã  
ea est salubrior, & fortior alijs; deinde boni coloris, qui indi-  
cat sanitatem; figuræ satis concinnæ; Etenim figura exterior  
significat semper compositionem interiorem; si enim concinna  
est, semper bonum est signum, pectoris, lati, fortis, musculosi,  
& carnosi, non adipe abundantis, ut facile possit abundare la-  
cte, & sustinere ea incommoda, quæ lactantibus solent acci-  
dere, & eligenda omni studio, & diligentia est; quæ iàm bis  
peperit masculum, & non fœminam, & non abortit, & se-  
mel saltem lactauit, quia sic in ea lac facile non corrumpi-  
tur, & magis assueta est in similibus. Postremò debet esse  
bonis moribus prædita, non iracunda, non melancholica, non

plena

Aul. Gell. lib.  
12.Virg. lib. 4.  
Æneid.Auic. 1. F. 3.  
doc. 1. c. 1.  
Paul<sup>9</sup> A. Egi-  
neta lib. 4.  
cap. 2.Gal. 6. de  
anat. admin.  
cap. 1.  
Gal. arte  
med. cap. 11.

plena mærore, aut tristitia, non stolidi, passiones enim, & qualitates istæ corrumpunt, & permutant temperamentum lactentis, lac autem eius erit explorandum, eo modo, quo in sequenti capite, declaratur.

## D E L A C T E N U T R I C I S.

## C A P. I I.

**L**AC optimum, & præstantissimum est, quod gustanti, olfacientiq; suaue, intuenti candidum, æquabile, ac liquidum, crassi<sup>q</sup> medium, apparebit; quod uitiosum est, è diuerso, aut crassum, aut caseosum, aut liquidum, & serosum, ac liuidum, tum consistentia ipsa, coloreq; inæquabile uidebitur, idem gustantibus amarorem, aut salsedinem, aut qualitatem quampiam extraneam exhibebit; tale uerò, nec olfacienti, suaue erit; Lac etiam probari potest hoc pacto, lacte in uas uitreum infuso coaguli portio misceatur, digitisq; agitetur, atq; ita permittatur, donec cogatur, deinde inspiciatur, utrum minor sit pars, quæ in caseum concreuit, quam ea, quæ in serum abiit, quod si sit utile erit lac, si contrà erit concoctu difficile, quod uerò æquam utriusq; portionem habebit, id erit probatissimum: illud etiam commendatur, quod in unguem pollicis stillatum, & in lucem spectatum, ungue inclinato, nec citò, nec tardè defluit. Prætereà inter bonitates, & optimas partes, lactis copia est necessaria prò nutritione infantis; si igitur una tantū nutrix lacte abundauerit, multò salubrius infans unius naturæ lacte nutrietur, quam diuersarum; nam si non abundauerit plures conueniunt nutrices.

Gal. 1. de diet. tuen. c. 9.

Orib. lib. 5. cap. 1.

## DE VICTVS RATIONE NUTRICIS.

## CAP. III.

**S**IC facta electione nutricis . quantum equorum equites .  
 Scruum, & manuum, brachiorum uè sagittarij curam ha-  
 bere quotidie uideantur . tantam saltem ipsi nutrici, cerebri,  
 cordis, & iecinoris rationem habere conuenit, imò tanto ma-  
 iorem, quanto nobiliora, & magis ad uitam necessaria hæc  
 membra, quàm illa sunt, & his frequentius, quàm illis utun-  
 tur, & maius beneficium afferunt; Etenim sanguis efficitur  
 à naturali uirtute, quæ in iecinore uiget, cuius tenuissima pars  
 in cordis uirtutem uitalem fluit, et exinde spiritus lucidissimi  
 orti ad cerebri arcem, & animalis facultatem ascendunt; &  
 sic per tres earum uirtutes tribus in seruiantibus truncis in quo-  
 libet ipso principali membro, uno scilicet ex aorta arteria in  
 corde, ex caua uena in iecore, & dorsi medulla in cerebro uni-  
 uersum corpus regitur, & nutritur, & calor innatus, ac spiri-  
 tus ipsi, ex quibus efficitur, digeritur, expurgatur, & dilucida-  
 tur sanguis, qui postea, si bonus est, conuertitur in optimum  
 lac, si uero uitiosus in pessimum, qualis enim est sanguis, ta-  
 les sunt spiritus, & tale uerò est lac, qualis est sanguis. Pro-  
 pterea in primis caput eius quotidie exonerato uentre, & nare  
 mane à pituita expurgata peccat, & fricet, adeò ut sordes à  
 cute abstergantur, abluat caput eius, etiam saltem semel in  
 hebdomada, illud attendens, ut a lotione ipsa diligenter ex-  
 siccetur caput, & in lixiuosi cerebrum ualde humidum ha-  
 bet ebulliendum curet chamæmeli, baccharæ, maioranæ, ro-  
 sarum, stæchados an. M. I. agarici in lineo panniculo ligati

3.1. Et prohibendum est omni ingenio, ne aeris frigiditas, & humiditas ledat caput ipsum, & præcipuè in die ablutionis; Stomachus etiam si frigidus sit calidus arte, cum pannis ex optima, & molli lana contextis, & purpureo colore tinctis, uel leporina pelle, aut uulturis custodiatur. Cor autem, iecur, thorax, pedes, & ut breuiter omnia dicam, totum corpus semper calidum conseruandum est, nisi à maxima caliditate iecoris, & cordis, uel à nimia caliditate ambientis; Aliud indicetur; diligentissimeq; prouidendum est. ut optimæ fiant concoctiones, nutrimentiuè, neq; ab aromatibus, neq; ab alijs qualitatribus adeo sit calidum, aut frigidum, ut adurat, uel in-frigidet sanguinem, uel inducat aliquam obstructionem in ipsis membris; Et cum surgit mane à lectulo, expurget thora-cem, per palatum à pituita, & caput, prout dictum est, per na-res, & omnia alia corporis excrementa. Operæ pretium est autem cauere, ne lac in grumos, uel in congelatam, uel nimis spissam substantiam conuertatur ut euitet, tum in cibo, & potu, tum in alijs rebus, ea, quæ augent, & generant pituitam; Ac etiam ne augeatur atra bilis, caueat à cibis in sequenti capitulo declarandis, & ab ira, à timore, à dolore, à tenebris, & à similibus, quoniam si sanguis efficitur melancholicus, & lac sibi simile gignit, & facile in mammis generat ulcera can-crosa, & apostemata perniciofa, & multa alia sæua in infan-tibus accidentia.

Gal. 1. de fa-  
m. tuen. c. 9.

**I**N primis de nutrice ipsa non parùm solliciti esse debemus; quid edat, quid bibat, quo pacto in somno, uenere, exercitatione uè se habeat; propterea in primis statim diebus, quibus lactare incipit, si infans de recenti natus sit, cibum leuem, boni succi, & facilis concoctionis accipiat, ueluti sunt carnes uitulorum, hœdorum, agnorum, ueruecum, & pullorum galinaceorum, & auium terrestrium. Comedat panem benè fermentatum, elaboratumq̃, & satis coctum. Bibat ius prædictarum carniū, uel aquam cum seminibus coriandrorum decoctam; Euitet uinum, nè lac nimis spissum ex ipsa potatione uini factum, cum difficultate in mox natis infantibus descendat per angustas partes gutturis, & prouocet distillationem à capite; Euitet omnia olera, & præcipuè syluestria, etenim nullum boni succi est, ne lacte deprauato incidat in aliquam ægritudinem simul cum infantulo, prout liquet ex Galeno, hoc pulcherrimo exemplo, dicente; nam lac quidem, quod uitiosus est succi, non ad eò succum probum gignit; cui rei argumento fuit is infans, qui cum priore nutrice mortua, alterius prauis succi lac suxisset, totum corpus multis ulceribus habuit refertum, utebatur autem secunda hac nutrix in agro syluestribus oleribus propter annonæ caritatem, quæ ueris tempore acciderat. Postea transactis primis diebus inter olera comedere poterit lactucam, mentam, fœniculum, spinachiâ, atriplicem, boraginem, saluiam, & petroselinum, quippè eorum qualitate adiuuat generationem lactis. cum autem pau-

Gal. lib. 3. de  
alim. fac. c.  
15.



eis diebus peractis infans fortior, & solidior fit, solidiorem, &  
 fortiorem cibum, moderatè tamen, nutrix comedere incipiat;  
 & cibus saltem bis in die sumendus est, adeò ut famem cibus,  
 & sitim potus expectet, fastidium, & nimiam saturitatem  
 fugiat, & cibos nimis crassos, viscosos, & frigidos, nè augeatur  
 sanguis pituitosus; Nec non ut pariter melancholicus sanguis  
 non augeatur, hortor ut diligentissimè caueat à cibus nimis du-  
 ris, siccis, falsis, acribus, acutis, ueteribus, uistis, assatis, & fri-  
 ctis, à pane non benè fermentato, azimo, à carnibus bouinis  
 ceruinis, leporinis, caseis ueteribus, leguminibus, ab eruca, à  
 brassica, ab allijs, à cœpis, à porris, & à uino nigro spisso, turbi-  
 do, & crasso, cum enim sanguis melancholicus superabundaue-  
 rit faciliè in diuersas aegritudines diuturnas, & perniciosas in-  
 curret. Inter fructus autem euitet fugaces, quoniam facile pu-  
 trescunt, & comedat æstatis tempore nuces, auellanas, amyg-  
 dalas, & cucurbitas; Autumno uuas, & ficus, præsertim cum  
 exactam maturitatem fuerint adeptæ. Hyberno autem tem-  
 pore mala cydonea, pyra, & poma cocta, & etiam castaneas  
 coctas; sunt enim ex his, quorum arbores ferunt, ferè succi ma-  
 li ex capis castaneis, glandibus, quas uocant, quæ si rectè eas  
 conficiat uenterculus, alibiles fiunt, ac crassi succi, minimè tamè  
 mali; Et in uere comedere inter olera etiam lupulos, & aspara-  
 gos poterit; Bibat uerò uinum non fumosum, satis maturum,  
 & colore rubrum, & adeò temperatum, nè in cruditatem, aut  
 ebrietatem incidat; nam infans ex ipsa ebrietate, aut crudita-  
 te facillimè egrotabit, & præcipuè ijs morbis, qui à materia  
 cruda petunt caput.

Gal. de suc-  
 corū bon. &  
 uit. cap. 8.

**I**N somno autem oportet, ut nutrix sit temperata, ita tamē, ut possit facere bonas concoctiones, caueat somnum diurnū post cibum, replet enim caput uaporibus crudis à cibo eleuatis, & prouocat destillationem à capite, dormiat noctu saltem per horas septem, & si oportuerit nocturno tempore, ob infantis uigilantiam, uigilare, mane stomacho ieiuno, dormiente alumno, dormiat, usq; ad digestionem, idq; si fieri poterit ante solis ortum, quoniam oriente sole alteratur, & agitur aer, & sic alterantur etiam, & agitantur humores nostri, & præcipue sanguis; ex qua alteratione, & agitatione, secundum humorum prædominium facilius in somno propter caloris concentrationem generantur diuersæ egritudines: sed omni studio, & diligentia euitet uigilias noctis, & præcipue post cœnam; Etenim in nocte melancholia, & pituita quæ frigidissimæ, & crassæ sunt dominantur; At in uigilia naturalis calido ad cutem profuso, uiscera frigidiora euadunt, & sic augentur per ipsas uigilias humores ipsi frigidissimi. Per somnum autem ad centrum remocatur calor naturalis. Evidenter enim uigilans calidior exterius; interius autem frigidior, dormiens e contrario, scilicet (ueluti dictum est) calor ad centrum reuocatus, & adeo ut in nocte per ipsam proprietatem caloris innati iuuatur comestorum concoctio, & sit diminutio generationis pituitæ, & melancholiæ, quæ duo horribilia monstra sunt in corporibus nostris, & præcipue in nutrice perniciofa, ueluti nauigantibus Scylla, & Charybdis omni assiduitate nitanda

Gal. 6. de  
morbis vulg.  
com. 5.

Hipp. 6. de  
morbis vulg.  
com. 6.

da; Dormire igitur à cœna conuenit saltem per horam, & in diluculo è lectulo surgere; Etenim in aurora mouetur (ut dictum est) aer. per ipsum solis ortum, & sic pariter per aerem humores. Propterea in uigiliarum tempore per motum ad ipsas uigilias pertinentem, magis attenuantur, & clariores fiunt spiritus; spiritus uerò clarum efficiunt sanguinem. ac proinde ipsum lac, & ut uno uerbo dicam, dies uigilijs, & nox somno tribuatur.

## DE COITU NUTRICIS VITANDO

## CAP. VI.

**M**VSAS Poeta uirgines esse uolunt, etenim coitus rationi, & ingenio, quo diuina utuntur, aduersatur, euacuat enim de substantia spirituum, propterea debilitat cerebrū, & nē dicam ueluti dixit Epicurus, uenereorū nullus est usus salubris, cum est superfluous (prout dicitur semper in nutrice) renes, hepar, stomachum, & præcordia lædit, aded ut membra ipsa labefactata sanguinē, & nutrimentum per uenas aquosum, nimisq; serosum transmittant; quo nutrici, & infanti præcipuē, nihil perniciosius esse potest; Consulo igitur, ut ipsa nutrix à coitu omnino se abstineat, & a consuetudine uiri, & ab omnibus cibis bellarijs, quoniam ipsi uenerem, & menses prouocant, & per fluxionem ipsorum mensium sæpè deprauatur lac; Menses enim uiri consuetudine prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat; Quin etiam aliquæ (scilicet nutrices) in utero concipiunt, quo nocentius puello adhuc lactenti nihil est; Interim

Gal. 1. de sa-  
nit. tuen. c. 9.

Gal de uen-  
sect ad Eral  
cap. 5.

Anic. 3. P. 30  
wac. 1. c. 11.

enim quicquid sanguinis est optimum in factu, et coitu absumitur, *Auicenna* coitum similem comitiali morbo indicauit, & quandoq; superat in ipso coitu cholera, & melancholia, & accidit ei uertigo à debilitate, & in illis in quorum corpore sunt humores mali cholerici, mouetur post coitum horripilatio.

Anic. libid.

## DE EXERCITATIONE NUTRICIS.

### CAP. VII.

**N**UTRIX Otium tanquam horribile monstrum, ex quo pituita, & humores frigidissimi augentur, et generantur, omni cura, & cogitatione fugiat nisi maior urgeat necessitas, et exonerato uentre, si fieri possit, antequàm lactet infans, exerceat se bis in die, mane, & uespere antecibum, cum ea exercitatione, quæ ad mulieres pertinet, & præcipue ut infans meliori chymo alatur cum partibus supernis, etenim lac facilius ea modo expurgatur, & digeritur, ueluti texendo, molendo pannos, uel inuolucra infantis abluendo mundando uestes, uel cubiculum à sordibus expurgando, uel panem elaborando, coquendoq; uel gestando infantem si trimestris, uel quadrimestris est, uel manibus ad conciliandum somnum, in cunis infantem ipsum agitando, mouendoq; uel etiam deambulando domi parumper; Exercitatio enim ipsa mirum in modum confert; nam exercitatione inferiorum iuuantur partes petoris.

Orib. lib. 5.  
cap. 3.

Gal. 5. de  
mitt. c. 3.

## DE CURATIONE MORBORVM NUTRICIS.

## CAP. VIII.

## P R A E F A T I O.

**P**RIVS QVAM De curatione morborum nutricis uerba faciam, pauca, ad faciliorem cognitionem huiusce artis declaranda perneccessaria mihi uidentur; Ac primum nostri instituti esse de morbis tantummodo scribere, qui etsi nutrici contingunt, tamen non sunt diuturni, nec eo tempore imminet periculum mortis. Secundo de his, qui dum afficiunt nutricem, nihilominus ipsa nutrix, uel lactat infantem, sine multo eius nocumento, uel lactatura est infra paucos dies. Tertiò de ijs morbis, qui sola uictus ratione, ex arte bene instituta facile, uel paucis localibus adhibitis, curandi sunt. Quartò de his, qui pertinet ad tuendam sanitatem infantis. Quintò & ultimò de his, qui non indigent ad eorum curationem, neq. missione sanguinis, neq. medicamentis ualde exiccantibus, & calefacientibus; Etenim ex ijs remedijs facile extinguitur, uel exterminatur lac, sed tantummodo de ijs pertractare, qui facile sanantur medicinis benedictis in primo, uel secundo gradu, quae leniter euacuant, sine nocumento, ueluti est casia fistula, manna, syrupus ex pluribus infusionibus rosarum, uel uiolarum, uel florum persicarum, diaprunum, electuarium lenitiuum, diasena, agarieus, & reubarbarus. Verum in ijs affectionibus, quibus, uel missio sanguinis, uel remedia à caliditate, aut à frigidityte ualde exiccantia conueniunt, tum quoniam his oblatiis occasionibus propter periculum defectus lactis, et periculum mortis, necesse est eligere aliam nutricem, tum etiam, quia ab alijs

Gal. 5. de  
simpl. med.  
fac. cap. 22.

Gal. de ueng  
sect. ad Eras.  
cap. 5.

alijs clarissimis uiris fusijs, & separatim de omnibus ijs mor-  
bis pertractatum, & scriptum est; propterea de ijs tanquam  
superfluis in hoc opere nihil dicam.

DE TUMEF ACTIONE, ET DOLORE MAMMARUM  
OB LACTIS REDUNDANTIAM.  
CAP. VIII.

DEFINI  
TIO MOR  
BI CAV  
SAE SI  
GNA.

Aulc. 3. Fen.  
21. cap. 3.  
PROGNO  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

**A**FFECTIO Hæc in matre, uel nutrice contingere so-  
let, ut plurimum post partum, quæ nihil aliud est, quàm  
a multiplicatione sanguinis, copiosa conuersio lactis, ex qua  
in ipsis mammis fit tumor, & tensio dolorosa, tum propter ci-  
bi insueti abundantiam, tum propter sanguineum cor-  
poris temperamentum, & signa manifesta sunt, & per-  
cipi poterunt tum uisu, & tactu, tum etiam ipsius nu-  
tricis sermone; propterea quantum ad partem progno-  
sticam prædicere conuenit, lac quando superfluit pluri-  
mum nocet, & apostemata gignit, & affert etiam alias  
ægritudines; igitur in primis, secundum ipsam indicationem,  
debet nutrix parumper de suo cibo subtrahere, ut lactis exube-  
rantia minuatur, & comedere cibos tum minus alentes, tum  
etiam in minore quantitate, & qui sint facili concoctionis, &  
boni succi, et bibere aquam coctâ cum seminibus coriandrorû,  
uel iura carniû pullorum, uel uitulorum, & quotidie aluum  
exonerare fecibus, uel spõte, uel arte clysterijs communibus, al-  
ternis diebus positis, & hoc modo paratis, R. bliti, maluarum,  
mercurialis matrum uiolarum, furfurum, an. M. I. bulliant  
omnia simul in s. q. a. postea colentur, & s. a. fiat decoctio, de  
qua decoctione R. libram unam, & uncias duas, olei oliuarum

communis ꝑnc. 3. uitelli unius oui. salis q.s. misce, & fiat cly-  
 ster, postea parum se exerceat, & præcipue deambulando do-  
 mi, ieiuno, stomacho, quoniam exercitatione inferiorum iu-  
 uantur magis partes, quæ circa thoracē sunt, & aeris calidita-  
 tem, & frigiditatem fugiat: sed quia in primis debemus seda-  
 re dolorem; dolor. n. ipse dissoluit uirtutem, & prohibet mēbra  
 à suis operationibus naturalibus: Quapropter ad māmillas fiāt  
 infrascriptæ fomentationes pro sedatione doloris R. uini rubri,  
 lib. s. olei rosati omphacini, aceti an. ꝑnc. 3. aquæ fontis lib. I.  
 misce, & lento igne in uase æneo parum omnia calefiant, po-  
 stea cum spongia infusa & benè compressa stomacho ieiuno s. a.  
 fiant fomentationes ad mammillas bis in die per horam unā,  
 antè cibum: Aut lentes aqua marina, uel muria, coquito, &  
 cum ipsa decoctione calida mammas abluito, & postea lentes  
 ipsas contusas, & in formam emplastei redactas, apponito, &  
 si dolor etiam non sedabitur, tunc R. dactylorum contusorum,  
 numero 10. pul. florū chamæmeli rosarū rubrarū, an. M. I.  
 olei rosati completi ꝑnc. 2. sapæ q. s. ad incorporandū misce, &  
 fiat emplastrū, & calidum apponatur, & perseuerante dolore,  
 neq. ab adultis, neq. ab infante emulgere conuenit mammas do-  
 lentes nutricis: Nā ex ipsa emulsione plus materie attrahitur  
 ad locū affectū. Postea si abundantiā lactis cōstringere uolueris  
 emplastrū infrā descriptū, ad māmās appone, R. aluminis ꝑnc.  
 4. psyllij coriadrōrū an. ꝑnc. I. s. portulacæ M. I. cōterēda cō-  
 terātur, deindē cū oleo ros. omphacino, & aceto an. partes æqua-  
 les q. s. ad incorporandū misce, et s. a. fiat emplastrū, & appona-  
 tur, uel alio modo, R. lapidis pyritidis cōtriti lib. s. aceti fortis olei  
 ros. omphacini an. ꝑnc. 3. misce, et apponatur, et si his peractis,  
 tumor,

Gal. de san.  
tuen. cap. 3.Aui. c. 1. Fen.  
2. doct. 3. c.  
22.MEDICA-  
MENTO -  
RVM RA-  
TIO.

Aetius 4. c. 6

Paulus ægin.  
lib. 3 cap. 3.  
ex auth. sera-  
pi.

tumor, uel durities mammarū non tollatur. (abundantia enim lactis, hac uictus ratione seruata, statim primo, uel in secundo die diminui solet) cataplasma infrā notatum appone, R. summitatum petroselini, fœniculi, mentæ, foliorum caulium an. M. S. incidātur omnia parumper, deindē in mortario cum medulla unius panis frumentacei, optimē contundantur, & adde pinguedinis anseris recentis vnc. 4. mellis q. s. ad incorporandum misce, & fiat cataplasma, & calidum apponatur. Verum post sedationem doloris à peritis mulieribus, uel à semetipsa quotidie mammæ nutricis leniter exugantur. Postea etsi expedit hoc in morbo, sectionem uenæ adhibere, ea tamen in nutrice, quæ lactare uult, prohibenda est, quia ex-terminat lac.

Accius lib.  
26. cap. 34.

## DE RIMIS PAPILLARVM NUTRICIS.

### C A P. I X.

DEFINI-  
TIO MOR-  
BI.

CAUSA.

SIGNA.

**I**NTER Morbos, qui ualde papillas mammarum nutricis infestant, sunt rimæ, quæ nihil aliud sunt, quàm parua scissura ipsarum papillarum, & ægrotatio ipsa, græco nomine diaphia dicitur, & ut plurimum in muliere, quæ paulo ante peperit, & lactare incipit, generatur. Et sæpe causam, & originem trahit ab exiccante acrimonia, & mordacitate humorum contentorum in ipso lacte, uel à mala complexionē sicca totius corporis, & hoc rarò euenit, nihilominus si à mala complexionē totius sicca proueniant ipsæ rimæ, macies per uniuersum corpus apparebit, & tunc, cum ipse morbus indicet diuturnitatem, & indigeat humectatione, & tempus hu-  
meclan



meētandi sit longum, & ipsa complexio in hæcticam facile  
 conuertatur, hic de ipso pertractare non opus est, sed alia nutrix  
 lactet infantem. Si uerò ex ipsa humorum acrimonia fiant,  
 apparebunt fissuræ ipsæ, sinè tumore, & tensione ab ipsa tan-  
 tummodo qualitate sicca humorum ortæ; causa enim omniū  
 fissurarum est siccitas, in cute adeò donec scindatur, & illa sic-  
 citas, aut propter complexionem singularem; aut propter  
 malitiam humorum mittentium materiam exsiccantem acu-  
 tam. Et cum ipsa aegritudo sit multi tædij, & doloris causa,  
 adeò ut cum infans papillam in ore suscipit, dolores acutissimi  
 excitentur, propterea ubi recentes fuerint, confestim eas curare  
 tentandum est; Nam cum prorogatur earum cura, induran-  
 tur, & fiunt callosæ, & diuturniores, adeò ut chirurgiam ad-  
 hibere oporteat, & aliquandò in ulcera cancrofa conuertantur.  
 In primis igitur aer inclinet ad humidum magis, quàm ad sic-  
 cum, & in caliditate temperatum, somnus conuenit longior so-  
 lito, & ab exercitatione uacet. Victus humidus conuenit, ut  
 liquida ueluti cremor ptisanæ, & pingua, seu glutinosa, & fa-  
 cilis concoctionis, ut sunt carnes elixæ gallinarum, pullorum,  
 uitulorum, hædorum, agnorum, ueruecum, auium aquatiliū,  
 & præcipue earum iura pingua; Inter olera comedere poterit  
 maluam, spinachiam, boraginem, & endiuia, oua recentia,  
 & sorbilia, & reliqui cibi exhibeantur cum butyro, uel adipe  
 anseris, aut gallinæ, aut oleo amigdalaram dulcium parati.  
 Inter fructus, poma dulcia, mala cidonia, & pyra cocta co-  
 medere poterit. Bibat uinum tenue album, quod non susti-  
 neat aquæ misionem; Euitet in cibo omnia acria, aspera, sal-  
 sa, mordacia, astringentia, cruda, & sicca, uel quæ nimia cali-  
 ditate,

Amic. 4. Ven.  
 7. trac. 3. c. 5.

PROGNO-  
 STICA.

VICTVS  
 RATIO.

MED. RA-  
TIO.

ditate, aut frigiditate siccitatem generant. Ad diminuen-  
dam verò abundantiam acrimoniæ, & humoris serositatem,  
suscipiat infrascriptum bolum, per horam unam ante cibum,  
R. casie nuper extractæ 3. x. diacatholicon 3. 2. misce, &  
cum saccharo. f. b. vel alio modo in forma potabili, R. Syru-  
pi rosati solutiui ꝑnc. 4. decoctionis maluarum. q. f. ad dis-  
soluendum misce, & fiat potio; vel pro diuitibus alio modo;  
R. manna electæ masticina ꝑnc. 3. decoctionis prædictæ. q.  
f. ad dissoluendum misce, & f. p. vel R. reubarbari electi,  
& mundi in puluerem resoluti. 3. I. sacchari rosati ꝑnc. s.  
misce, & cum saccharo f. b. Verum in illo die, in quo susci-  
pit potionem, vel bolum ipsum, alia nutrix lactet infantem;  
sequenti autem die inungat papillas oleo balsamino, aut è lu-  
teis ouorum tepido, vel pomata, vel adipe hircino, vel succo  
aparinae; vel alio modo, R. mellis, butyri recentis, olei amyg-  
dalarum dulcium an. ꝑnc. s. misce, & simul omnia opti-  
mè conquassentur; postea inunge, vel R. olei rosati completi.  
ꝑnc. 3. & in mortario plumbeo infundito, & cum pistillo  
plumbeo terito, donec oleum crassum, & subnigrum redda-  
tur, & ex ipso quotidie bis, vel ter inunge papillas ipsas.

## DE LACTE NIMIS CRASSO.

## CAP. XL

DEFINI-  
TIO MOR-  
BI.  
CAUSAE.  
SIGNA.

**S**I Nutrix lac habeat nimis crassum hic affectus dicitur  
a latinis lactis concreti opituitosa, quæ generatur aliquan-  
do propter otium, aliquando propter ambientem aerem, ali-  
quando propter cibum, et potum crassæ substantiæ, vel propter  
rationem temperamenti; Et percipitur ex signis istis; tum ex  
diffi-

difficultate digestionis, & excretionis per Ventrem infantis, & excessu in crassitie ipsius lactis, tum etiam ex consistentia ipsius, ut percipitur visu, si de ipso super Unguem mulgeas guttam, quæ si fluit est subtile, si verò Unguis inclinetur, & non currat est crassum. Et de parte prognostica sciendum est infanti aliquando ex difficultate digestionis, & excretionis ipsius alimenti nimis crassi per Ventrem accidere crudita-tem humorum, & abundantiam eorum, & conuersionem in casei substantiam lactis ipsi nutriti, ex qua postea infantes facillimè incurrunt in perniciosas egritudines. Crassus enim lac abscessus, & furunculos circa infantis corpus generat. Nutrix igitur degat in aere calido, & sicco, & accipiat cibum digestibilem, & qui modicè nutrire possit, cuiusmodi sunt carnes vitulinæ, & pullorum gallinaceorum, & hædorum, & si milium elixa, Bibat Vinum aqua temperatum, vel paucarū Pirium, & moderatè; Euitet carnes porcinas, bouinas, & omnia caseosa, unctuosas, acrias, & acetosas, legumina, pultes, oua elixa, & præcipuè dura. Et inter olera comedere poterit lactucam, spinachiam atriplicem; Etenim boni, maliq; succi in medio sunt, hyssopumq; petroselinum, fæniculum, mentam, & cichoream, & radices raphani. Ex fructibus comedat nuces, amygdalas, & auellanas, & temperato utatur exercitio, & præcipuè deambulando, exercitatione enim inferiorum iuuantur partes pectoris, & non dormiat in die post cibum, sed noctu utatur somno temperato, & præstat quotidie in manè bis, aut ter, prius manibus proprijs, aut ore alieno, aut proprio cū illo vitreo instrumēto; capite, de imminutione lactis, delineato, nō aut ab alumno emulgere māmas, postea papillā infanti tribuere,

Aui. 1. p. 3.  
doc. 1. cap. 2.

Actius 4. ca.  
5.

PROGNO  
STICA.

Actius 4. ca.  
6.

VICTVS  
RATIO.

Gal. de fuc.  
bonit. & uit.  
cap. 8.

Gal. 5. de  
sanit. tuen.  
cap. 3.

MEDICA-  
MENT. RA-  
TIO.

ut crassities eius, sic per ipsam emulsionem euacuetur, & lacte in melius purgato nutriatur infans, donec ad equalitatem substantia ipsius lactis reducatur. Prætereà pro ut nobis indicat morbus ad calefaciendum, & attenuandum, quotidie manè sumat per septem dies continuos hunc syrupum in diluculo, & post assumptionem ipsius per horam dormiat. R. oximellis simplicis. ꝯnc. l. s. decoctionis infra scriptæ ꝯnc. 3. misce pro uno syrupo, & sic pro alijs R. hyssopi, mentastri, origani, pulegij, cichoreæ an. M. l. seminum anisforum drag. 3. bulliant omnia simul in s. q. aquæ usq; ad tertias, postea s. a. coletur & colatura usui seruetur in uase uitreo cooperto, ad diluendum syrupum, & illud attendant studiosi, in præmissam uictus rationem, tantummodò per septem dies continuos seruabunt, si ne alijs remedijs localibus, lac facile reducet ad equalitatem. Verùm si in his diebus non euenerit equalitas, dicente Galeno, quòd in uitioso lacte debemus semper sanguinem contemplari, & si pituitosus est, medicamenta requirit, ex calefacientia, aut primo, aut secundo ordine, non tamen desiccantia. Laudo igitur post assumptionem ipsorum syruporum, ut exhibeatur nutriti per horam unam, antè cibum, bolus iste. R. electuarij lenitiui, drag. l. o. agarici præparati drag. 2. misce, & cū saccharo f. b. uel alio modo, per horas tres antè cibum, R. reubarbari electi, & mundi, in puluerem reducti drag. l. agarici trochiscati drag. l. sacchari rosati ꝯnc. l. misce & f. b. uel in forma potionis, R. syrupi rosati solutiui ꝯnc. 3. agarici præparati drag. 2. decoctionis florum, et fructuum cordialium q. s. ad dissoluendum misce, & f. p.

Galeni s. de  
simplimed.  
fac. cap. 1. a.

## DE LACTE NIMIS AQUOSO.

C A P. XII.

**E**T SI contigerit ex continuis, & uehementibus exerci- CAUSAE  
tationibus, et laboribus attenuantibus, uel ex cibis calidis,  
ex aromatibus, falsamentis, uel ex subtiliatiuis, uel lubricis, uel DEFINI-  
ab ambiente aere, uel à prædominio ipsius temperamenti, lac TIO MOR-  
ipsum fieri nimis aquosum, aegritudo ipsa, uocatur, lactis BI.  
fusio biliosa, à qua sumitur indicatio, prò ut signa indicabunt SIGNA.  
ex macie infantis, ex pluribus excretionibus biliosis cum mor-  
dacitate per uentrem, & per urinam citrinam, & ex fluxione  
lactis guttæ, super unguem posita, tunc quoniam periculum  
est, nè infans ex ipso lacte ducatur, uel ad febrem biliosam, uel  
ad dysenteriam, uel lienteriam, uel si acrius fiat lac, appetitus PROGNO-  
deficiat, & pustulæ acerrimæ in corpore fiant alterius nutriticis STICA.  
lac exhibeatur infanti. Quoniam autem Galenus ait, ipsum Aetius lib. 4.  
sanguinem in uitioso lacte contemplari oportere, & si est bilio- c. 6.  
sus primam purgationem desiderat mox uictum: propterea Gal. 5. de  
in primis capiat hunc bolum, manè per horam unam ante cibū simpl. med.  
R. electuarij lenitiui drag. 9. diacatholicon drag. 3. misce, & fac. cap. 21.  
cum saccharo f. b. uel alio modo in forma potabili, R. syrupi MED. RA-  
de pluribus infusionibus rosarum ꝑnc. 3. diacatholicon drag. TIO.  
4. aquæ endiuie q. s. ad dissoluendum misce, & f. p. Postea  
per dies septem continuos quotidie in diluculo capiat loco syru-  
pi cremoris ptisanæ cyathum unum, cum iure carniū disso-  
luti; Et si opus fuerit, etiam post assumptionem ipsius ptisanæ,  
exhibeatur bolus iste R. reubarbari electi, & mundi contriti  
drag. i. sacchari rossati ꝑnc. s. misce, & cum saccharo q. s.

VICTVS  
RATIO.

q. s. fiat bolus, & ipsum sumat per horas quinque antè cibū. Quā-  
tum attinet ad victus rationem, pro ut nobis affectio indi-  
dicat, degat in aere potius declinante ad frigiditatem, quā  
ad caliditatem ipsa nutrix, et ab exercitio remoueat, et quie-  
scat, & dormiat somnū longiorē solito; pro cibo panē comedat,  
sine sale elaboratū, & temperatē coctū, sed satis fermentatū,  
et carnes hœdinas, uitulinas, ueruecinas, et bubulas etiā, et oua  
elixa; Bibat uinū dulce, mustū coctū, caueat postea ab aromati-  
bus, à salsamentis à fructibus fugacibus ab oleribus omnibus,  
rater lactucam, spinachiam, atriplicem, boraginem, mal-  
uam, petroselinum, & mentam, & ab his, quæ facile con-  
uertuntur in bilem, & sunt difficilis concoctionis, & mali  
succī. Ultimo loco, si erit necesse, inungantur mammi-  
læ oleo lumbricorum terrestrium, & ab adultis, non au-  
tem ab infante exugendum est lac, nè in casei substan-  
tiam coalescat, una uice tantumquāq; die, donec ad aliquam  
crassitiem, seu equalitatem substantia ipsius lactis deueniat.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 3.

## DE PAUCO, VEL DIMINUTO LACTE NUTRICIS.

### CAP. XIII.

DEFINI-  
TIO MOR-  
BI.

PROGNO-  
STICA.

Auic. 3. f. 12.  
cap. 2.

CAUSAE.

**S**I verò contigerit lac paucum, vel diminutum esse, affe-  
ctio hæc, dicitur lactis defectus, expedit, quoniam hic mor-  
bus magis infanti nocet, quā nutrici, alterius lac exhibere,  
donec denuò abundet; postea considerandum est, si causa est  
in toto corpore nutricis; Lac. n. multiplicatur, multiplica-  
tione boni sanguinis. Igitur hæc affectio erit necessario a di-  
minuta boni sanguinis generatione, veluti ob qualitatem ca-  
lidam,

lidam, vel frigidam, tùm à cibo, tùm ab aere, tùm à ratione temperamenti diminuentem, vel ob aliquam, immodicam, sanguinis, & aliorum humorum euacuationem præcedentem, uel a fluxu corporis, impediente boni sanguinis generationem, vel ob penuriam alimentorum, uel ob aliquam expurgationem. Prætere à illud attendendum est, si diminutionis causa ipsa est tantummodò in mammillis ipsius nutricis, vel si adest in una tantum, vel in ambabus; Quippè si erit in una tantum, alterius mammillæ lac exhiberi poterit, donec altera curetur; si verò erit in ambabus, tunc remedijs localibus erit utendum, secundum rationem morbi, loci, & SIGNA. temporis, prout signa ex visu, & tactu indicabunt, & ut docetur in arte chirurgica. Nam ut plurimum morbi mammas infestantes ad ipsam chirurgiam pertinent, de quibus nunc mihi non est scribendum.

DE LACTE IMMINUTO  
QUALITATE CALIDA.  
CAP. XIII.

**I**MMINUTIO Lactis a mala intemperie totius corporis calida, à qua sumitur indicatio istius affectionis, & que SIGNA. percipitur a macie, & à colore, vel citrino, vel pallido nutricis, & ab excrementis biliosis, & amaritudine ipsius lactis, tunc ipsa nutrix degat in aere temperatæ frigiditatis, si VICTVS  
RATIO. tamen hoc toleret anni tempus, & quiescat, & exercitatione vacet, caueat ab aromatibus, a salitis cibis, ab acribus, ab allio, à porris, à cæpis, à fructibus horarijs, sine fugacibus, quia facile putrescunt, & conuertuntur in bilem.

bilem, & ab omnibus calefacientibus, & crudis, & difficilis  
 concoctionis; Et cibum consuetudine leuiorem capiat ex car-  
 nibus boni succi, & facili concoctionis, & in iure carniū co-  
 ctam comedat lactucam, spinachiam, cucurbitam, atriplicem,  
 portulacam, & semina earum, panem comedat sine sale bene  
 fermentatum, & optime coctum; Bibat iura carniū, uel  
 aquam cum seminibus anisorum, uel coriandrorum coctam;  
 Alius exoneretur quotidie, uel sponte, uel arte, alternis die-  
 bus, cum clystere communi descripto in capitulo 8. ad quem  
 habeatur relatio, & quotidie mane, loco syrupi, sumat sequens  
 decoctum, per dies septem continuos, & etiam per quindecim  
 dies, si opus fuerit, donec abundet lac R. radicū petroselini,  
 foliorū lactucæ, scariolæ, spinachiæ, atriplicis, mētæ, endiuie,  
 ordeī mundi an. M.s. seminum anisorum drag. 3. bulliant  
 omnia simul in f. q. aquæ usq. ad tertias, postea colentur, & in  
 uase uitreo cooperto seruetur ipsa decoctio, de qua, pro quaq. ui-  
 ce sumat uncias sex in diluculo, et statim per horam dormiat,  
 et si opus fuerit, fiat ipsa decoctio dulcis, ut stomachum ali-  
 quando delectet, uel modico saccharo, uel cum iulep uiolato q. s.  
 postea ut (si corpus plethoricum sit) aliquid materiæ detraha-  
 tur, post assumptionem decoctorum præmissorum septem, su-  
 mat bolum cassiæ, uel potionem mannæ, uel syrupum ex pluri-  
 bus infusionibus rosarum hoc modo paratum. R. cassiæ recen-  
 ter extractæ drag. 10. electuarij de sebesten drag. 2 pulueris  
 anisorum drag. 2. misce, & cum saccharo f. b. & exhibeatur  
 matutino tempore per horam unam ante cibum, uel R. man-  
 næ electæ masticinæ ꝑnc. 3. & cum decoctione superscripta  
 q. s. misce, & f. p. uel alio modo R. syrupi ex pluribus infusio-  
 nibus

MEDIC.  
 RATIO.



bus rosarum, vnc. 3. diacatholicon drag. 4. decoctionis præ  
 ordinate q. s. ad dissoluendum misce, & f. p. & exhibeatur  
 per horas tres, antè cibum; Et à proprietate in omni extermi-  
 natione, aut diminutione lactis, laudo ut nutrix ubera ouis,  
 uel caprarum, cum ipso lacte comedat. Et Aetius dicit bi-  
 bat zytum, & eadem die mammillæ lacte replebuntur. &  
 zytum ipsum nihil aliud est, quàm potus ex ordeo aqua re-  
 soluto.

Auc. 1. f. 3.  
 doc. 1. cap. 2.

Aetius 4. ca.  
 6.

q. 3. 2. 246  
 2. 246 2. 246

## DE DIMINUTIONE LACTIS A QUALITATE

FRIGIDA. CAP. XV.

**S**I signa prout crassities, & albedo totius corporis, & ex-  
 crementa decolorata, & pituitosa indicabunt causam de-  
 fectus lactis esse à materia frigida; à qua sumitur istius af-  
 fectionis indicatio; tunc alienum lac præbere infanti necesse  
 est, & ab adultis exugendæ sæpè sunt mammæ, ut lac facile  
 redeat, & abundet; deinde eligatur aer ad caliditatem uer-  
 gens; & nutrix exerceat se in aliquo opere faciundo, & præ-  
 fertim cum partibus supernis, ut lac digestum facilius exeat;  
 Bibat uinum album, satis maturum, sed paucarum uirium,  
 & cibis utatur boni succi, & facilis concoctionis, cum oleri-  
 bus aperitiuis, ueluti semina, radices, & summitates fœniculi,  
 anethi, nigellæ, & petroselini. Aluus lubrica sit, & quotidie  
 euacuetur à fœcibus, uel spontè, uel arte, alternis diebus, cly-  
 stere communi, in capitulo octauo huiusce libri, descripto, ad  
 quem se conferre poterit; Et in diluculo sumat quotidie per  
 dies septem, inferius scriptum decoctum, loco syrupi. R. semi-

SIGNA.

VICTVS  
 RATIO.

Auc. 1. f. 3.  
 doc. 1. cap. 2.

MEDIC.  
 RATIO.

D num



subleuata, possit facilius abundare lacte. Propter à post-  
 sumptionem decoctorum præmissorum septē, sumat hunc bo-  
 lum R. electuarij lenitiui drag. 10. agarici præparati drag. 2.  
 misce, & cum saccharo f. b. uel alio modo in forma potabili;  
 Decoctionis florum, & fructuum cordialium q. s. misce et f. p.  
 uel R. reubarbari electi, et mundi, in puluerem resoluti, drag.  
 1. spica grana 3. contrita subtiliter, agarici præparati drag. 1.  
 sacchari rosati ꝑnc. 1. misce, & cum saccharo q. s. f. b. &  
 exhibeatur per horas quinq. antè cibum, mane; Vbi uerò ob  
 aliquam sanguinis immodicam euacuationem lactis immi-  
 nutio prouenerit, indiget sola uictus ratione boni sacci hume-  
 tante, & excafaciente.

DE LACTE IMMINUTO PROPTER NIMIAM  
 LUBRICITATEM ALUI  
 CAP. XVI.

**V**BI Defectus lactis euenerit propter nimiam lubrici-  
 tatem alui, citrà cruentas deiectiones, & citrà fe-  
 brem, cerebri, uentriculi, iecinoris, & intestinorum imbe-  
 cillitatem, & breuiter citrà symptomaticam excretionem.  
 Etenim de his morbis, cum ipsis symptomatibus coniunctis,  
 in quibus nutrix infanti præbere lac non potest, nec debet, nec  
 breui tempore præbitura est; non sum scripturus, sed tantum-  
 modò de alui profluuio à multitudine malorum humorum  
 in corpore nutricis contentorum pertractabo. Id autem  
 græcè dicitur *διὰ γαίαν*, & originem trahit, uel ab otio,  
 uel à prætermissa exercitatione, uel etiam à copia ci-  
 borum,

A. 1012

odg. 1 q. 11  
10. 20. 10. 11ba. 1. 160  
Qal. 9. 46  
simpl. med.  
fac. cap. 2.O. 1012  
A. 1012V. 1012  
A. 1012DEFINI-  
TIO.

CAUSAE.

SIGNA.

Hip. 1. apho-  
rum 20.Gal. 1. ad  
glau. c. 34.  
burn. aliqui  
1. 4. 950. 351PROGNO-  
STICA.VICTVS  
RATIO.Aetius lib. 9  
cap. 51.

borum, & potuum ingestorum à bile, uel à pituita excitato-  
rum, ut signa in excrementis indicabunt; si à bile crocea, &  
biliosa sine mora exhibunt, si à pituita alba, & pituitosa. Pro-  
pterea dicente Hippocrate, quæ indicantur, & indicata sunt,  
integre, neq; mouere, neq; nouare aliquid oportet, siue medica-  
mentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Tota igitur  
curatio naturæ permittenda est; Et tantummodo uictus ra-  
tionem s. a. instituere; sic enim purgatur corpus. Verum si  
profluuium ipsum in termino dierum septem integre nec iudi-  
catur, nec iudicatum est; ad id, quod deficit, supplere conue-  
nit, quia spatium, & perseverantia ipsius periculosa est. Ete-  
nim aliquando tormina, & febres excitat, & uires absumit;  
transactis igitur diebus sex, uel septem, si adhuc perseveret  
profluuium cum signis biliosis a quibus sumitur indicatio istius  
morbi, uictus ratio instituenda erit, hoc pacto. In primis eli-  
gatur aer potius ad frigidum, & siccum, quam ad calidum,  
& humidum uergens, somni sint longiores solito in nocte, &  
caueat a diurnis, simplices fricationes conueniunt in hoc gene-  
re morbi, propterea supplere loco exercitationis, comedat pa-  
nem bene fermentatum, & optimè elaboratum, & coctum,  
& fercula in iure pedum uitulorum, et caprum castratorum  
ex chondro, oryza, & halica cum malocidonio, uel mespilo, uel  
tragacantha in panniculo inuoluta, decocta, & citrà carnes  
predictas comedere etiam poterit, carnes capreolorum, leporum,  
& pullorum gallinaceorum, & uitellos ouorum assos, & ace-  
to intinctos, & in primo cibo confectiones ex cornis, sorbis,  
mespilis, & diacydonitem, sine speciebus conueniunt; Bibat  
unum tenue, aquosum, nigrum, & astringens, sed bibat pau-

cum, multus enim potus facit supernatare cibum in stomacho, & alui profluuijs infestissimus existit, conuenit etiam lac ouillum, & caprinum in quo lapides igniti extincti sint, parū per calefactum, tū in portione sumptum, tū in clysterijs. At ijs non obstantibus, per seuerante profluuiio sumat per septem dies continuos, si opus fuerit, syrupum hunc in diluculo

R. Syrupi de myrto, de endiuia, miuæ cydoneorum an. ꝯnc. s. aquarum plātaginis, endiuia, an. ꝯnc. I. s. misce pro uno syrupo, & sic pro alijs. Nec non quotidie inungatur uenter totus oleis istis, R. olei de cydonijs, de myrto an. ꝯnc. I. misce, & calidis inunge bis in die, per horam unam ante cibum, ueluti dictum est. Et emplastrum de diaphenicon moderate calidum q. s. stomacho applicetur. Præterea, si opus fuerit, etiam post assumptionem ipsorum syruporum, laudo ut capiat per duos, aut tres dies continuos, uel alternis diebus, si uires sunt imbecillæ, bolum hunc R. reubarbari electi, et mundi, contriti drag. s. sacchari rosati ꝯnc. s. misce, & f. b. & hoc, manè, horis quinque, ante cibum. Porro si à pituitosa materia proveniet alui fluor. tūc uictus ratio uergat ad calidum, & siccum, & inunctio uentris fiat hoc pacto R. olei de mēta, de absinthio, de cydonijs, an. ꝯnc. I. misce, & calidis inunge; Et syrupus sic instituatur. R. Syrupi de rosis siccis, de menta, miuæ cydoneorum an. ꝯnc. s. pulueris spodij drag. I. aquarum menta, absyntij an. ꝯnc. I. s. misce pro syrupo, & post assumptionem syruporum quinque, euacuetur humor, peccans modo præscripto, postea manè, & uespere ante cibum, sicut ego sæpissime expertus sum, ad constringendum tantū, quotidie sumat per tres, uel quatuor dies unam ex istis pilulis R.

Acrius lib. 9  
cap. 49.M E D I C.  
RATIO.

e dil. 20. 15A  
26. 942

trochiscorum de carabe; trochiscorum de spodio, cum semini-  
bus acetosæ, suffuf de granis myrti, descript. Mesue an. scrup.  
I. s. conterantur omnia subtiliter, postea cum miua cydoneo-  
rum, reformatur pillula quinq; & inaurentur, uel unam  
ex istis alijs quotidie sumat, R. pulueris reubarbari, agarici,  
an. drag. s. misce, & cum miua cydoniorum reformatur p.  
3. & inaurentur.

## DE IMMINUTIONE LACTIS OB

PENURIAM. CAP. XVII.

SIGNA.


PROGNO-  
STICA.

Hip. 1. apho.  
51.

VICTVS  
RATIO.

**Q**UANDO ob penuriam alimentorum fit imminutio  
lactis, indicatio manifesta est, ex macie ipsius nutriticis;  
propterea tunc infanti (Etenim, ex emulsione frequenti mā-  
marum magis lac exsiccatur, & uires nutriticis magis debili-  
tantur) lac alienum exhibeatur, & nutritici alimentum boni  
succi, & facilis concoctionis præbere debemus, id uero paula-  
tim facere oportet. Nam plurimum, atq; repente replere pe-  
riculosum; quoniam omne nimium est naturæ inimicum, &  
præcipue cum uires sunt imbecilles, sed quod paulatim fit, tu-  
tum est. Et laudo ut quotidie in mane sumat cremorem pi-  
sanæ, in iure carniū decoctum, loco syrupi per quatuordecim  
dies continuos, & post eius assumptionem per horam dor-  
miat, & fiant fricationes lento modo, quotidie per totum cor-  
pus stomacho ieiuno. Et aluus, uel sponte, uel arte clystere  
cōmuni exoneretur, & mundetur à facibus, & in aere mo-  
deratæ caliditatis degat, uitans ambientis frigiditatem, & à  
caloribus, & exercitatione uacet, & dormiat longiorem con-  
suetu

suetudine somnum, vitans diurnum; Et ne lac in totum nutritrix deperdat ab alijs, uel a semetipsa, cum quodam uireo, & paruo instrumento, gratia huiusce emulsionis facto ut in Italia fit, in eius osculo prius papilla mamillae immissa, & eius fistula ore proprio suscepta poterit his quotidie emulgere mammas, donec lac facilius abundet: cuius forma ad claram omnium intelligentiam hic delineata apparet.



# DE LACTE OB ALIQUEM TERROREM

DEPERDITO VEL IMMINUTO.

CAP. XVIII.

**S**i per somnum, uel per tonitruum, uel per terræ motum, uel per casum, uel per armorum strepitus aliquo modo expurgata, uel ut dicitur græcè *εκφυγίας*, nutritrix lac deperdat, uel imminutum habeat, statim exerceat se

CAUSAE.

MEDIC.  
RATIO.

bra

brachijs. & manibus ualide; Postea mammilla fricentur,  
 & sub ipsis uentose applicentur, sine scarificatione. & fomen-  
 tentur fomentationibus, & inunctionibus, assignatis in capi-  
 tulo, de diminutione lactis à qualitate frigida; ad quod reuer-  
 tarar; & exhibeatur ei cyathus unus uini maluatici, cum mo-  
 dico pane in ipso madefacto, & prius ingesto; quia uinum op-  
 timum, generosumq; letificat cor nostrum. Deinde si fieri  
 poterit, urgente necessitate, nutrix omni ingenio à mœrore su-  
 bleuetur, uel musico concentu, & harmonia, uel colloquijs,  
 uel iucundis spectris, uel spe aliqua. Nàm Galenus ait, mul-  
 tos sola letitia morbos euasisse; postea uero infans ad lactan-  
 dum applicetur ad mammas: lac enim per terrorem ipsum cō-  
 strictum reddetur. Nec non exhibere etiam potest electua-  
 ry letitiæ Galeni drag. I. cum uino maluatico, uel iure pulli  
 sumptam, pro una uice tantum.

Gal. de par.  
 pil. exerc. c. 1

DE COAGULATIONE LACTIS IN  
 CASEI SUBSTANTIAM.  
 CAP. XIX.

DEFINI-  
 TIO MOR-  
 BI.  
 Auic. 3. f. 12.  
 cap. 4.

COAGULATIO Lactis in substantiam casei, cum nil  
 aliud sit, quàm seiunctio crassæ substantiæ à seræ lactis;  
 Et si dicat Auicenna, quandoq; lac coagulatur in casei natu-  
 ram, in mammilla propter caliditatem exsiccatiuam, & quā-  
 doq; etiam propter frigiditatem congelatiuam; nihilominus  
 mea quidem sententia, coagulatio ipsa, tantummodo fit à ca-  
 liditate; Etenim ut ipsum lac coaguletur, opus est, ut pars  
 serosa segregetur, & separatio ipsa necesse est, ut fiat à cali-  
 ditate, ut testatur Galenus; Propterea sequitur non a frigi-

Gal. 3. de a-  
 liem. fac. cap.  
 16.



ditate fieri coagulationem, lac uero in grumos congelatum, uel concretum benè fieri potest ab intemperie frigida; At non coagulatio ipsa in casei substantiam. Causa igitur tantummodo erunt a caliditate, a qua sumitur indicatio, prout ab aere ambiente, uel a corporis temperamento, uel a ratione uitus præterita, ueluti ex cibis calidis, cum aromatibus copiosis, & ex salsamentis, & similibus. Signum erit, si emulseris mammas, & lac concretum sit, & difficulter exeat, & ex difficultate digestionis in infante, & excretionis per uentrem. Tunc, quia, si statim caseatum lac non curatur, generat apostema in ipsis mammis, & exulcerationes. Et quoniam lac uitiatum est, alia nutrix lactet infan-tem, & interea ab aliqua muliere adulta, quotidie emulgeantur mammae nutricis bis, uel ter in die, ut lac exeat, & sic facilius fiat resolutio coagulationis. Deinde electo aere, magis ad frigidum, quam ad calidum declinante, parum exerceat se nutrix, tam cum inferioribus, quam cum superioribus partibus ad adiuuandum concoctionem, & nutrimenti distributionem per totum corpus. caueat a somno diurno, dormiat in nocte breuiorem somnum solito, Bibat aquam, uel cum seminibus coriandrorum, uel anisorum coctam, uel cum pauco cinnamomo, comedat cibos boni succi, & facili concoctionis, cuiusmodi sunt carnes uituli, ueruecis, pulli parui gallinacei, & auium terrestrium; caueat ab acribus, ab aromatibus, a caseosis, a salsamentis, ab acetosis, a fructibus fugacibus, & ab omnibus oleribus, & præcipue calefacientibus, & a leguminibus. Verum enim uero quia in quocunq; morbo semper adest, quod fit, & quod factum est, propterea ad prohibendam coagulationem, quæ fit R.

CAUSAE.

SIGNVM.

Galj d alim.  
fac. cap. 16.PROGNO  
STICA.VICTVS  
RATIO.IN-EST  
NON-EST  
M E B I C.  
RATIO.

olei de menta, de chamæmelo, rosati an. ꝑ. i. misce. & ex ipsis oleis tepidis mammae inungantur bis in die, antè cibum, per horas duas; Vel R. olei anethini, ruta, cyprini, an. ꝑ. i. misce, & in mortario plumbeo ducantur, donec. s. a. fiat linimentum, & inunge, uel alio modo. R. foliorum menta, subtiliter in puluerem resolutorum, seminum coriandrorum contritorum, an. ꝑ. i. olei rosati ꝑ. i. cerae liquefactæ q. s. misce, & s. a. fiat linimentum. Ad resoluendam uerò ipsam casei substantiam, quæ facta est. R. aceti fortissimi, olei rosati, succi apij, succi foenugræci, coaguli leporini an. ꝑ. i. croci ꝑ. i. misce, & omnia simul benè conquassentur; postea inunge. Et si ijs peractis, ipsius casei coagulatio nō resoluetur, applicetur cataplasma hoc propè scriptum, R. foliorum solatri, apij, caulium, an. M. s. omnia parum admodum incidantur, postea in mortario optimè contundantur; & adde pulueris myrrhæ, pulueris rosarum, pulueris ireos an. ꝑ. i. croci. ꝑ. i. olei de ruta ꝑ. i. aceti fortissimi q. s. ad incorporandum misce, & s. a. fiat emplastrum & applicetur bis, uel ter in die, si opus fuerit.

## DE CONGELATIONE LACTIS IN GRUMOS

### C A P. XX.

DEFINITIO MORBI.

CAUSAE.

**I**N Grumos congelatio lactis est illa affectio, quæ uocatur astrictio uniuersæ lactis substantiæ simul in grumos coactæ. Cause uerò proueniunt a mala uictus ratione frigida, a qua sumitur indicatio, ut in precedenti capitulo dictum

Etum

Etum est, ueluti ex potionibus, & cibis crassis, & infrigidantibus, vel acetosis, acribusq, vel ex dormitione in locis frigidis, vel a corporis temperamento, vel ab aere ambiente, & cum lac vitiatum sit, alia nutrix lactet infantem, etenim lac ipsum facit obstructionem, & aquam inter cutem, & febrem. Apparebunt signa, tum ex difficultate egressionis ipsius lactis congelati, tum etiam ex difficultate digestionis, & alui excretionis in infante. Igitur in primis aer temperatè calidus eligatur, & nutrix utatur exercitatione manè, & vespere, antè cibum deambulando, vel manibus se exercendo in aliquo opere, prout dictum est in capitulo proprio huiusce libri. Aluus mundetur quotidie ab excrementis, vel spontè, vel arte, dormiat longiorem somnum consuetudine, & caueat a diurno; caueat etiam a cibis, uel potionibus frigidis, crassis, crudis, acribus, acetosis, & præcipue ab ijs, qui sunt difficilis concoctionis, & mali succi; Bibat vinum album, tenue, & satis maturum; comedat panem benè elaboratum cum seminibus anisorum, uel foeniculi coctum, & carnes, quæ sunt facilis concoctionis, & boni succi, coctas cum radicibus hyeme, & cum summitatibus æstate foeniculi, petroselini, & mentæ. Postea ad resoluendam grumosam ipsam congelationem superfusio mammillarum, cum aqua calida, uel oleo dulci calido mirum in modum confert. Deinde fiant fomentationes cum spongia ad ipsas mammas, bis in die, per horam unam antè cibum; ea ratione qua descripta est in capitulo decimo quarto huiusce libri, & statim fiant inunctiones oleis istis calidis. R.

PROGNO  
STICA.

SIGNA.

Gal. & alim.  
fac. cap. 15.

VICTVS  
RATIO.

MEDIC.  
RATIO.

Aetius lib.  
16. cap. 35.

Gal. 10. de  
simpl. med.  
fac. cap. de  
coagulo.

olei de lilio, de costo, anethino an. ꝑ. unc. I. misce, & calidis inun-  
gantur mammae post fomentationes, & applicetur emplastrum  
hoc; R. lentium decoctarum, muria, aut aqua marina, & in  
mortario bene contusarum, lib. I. croci drag. 2. cumini deco-  
cti q. s. misce, & fiat emplastrum, & calidum applicetur, uel  
R. furfurum, farinae ordei, erucæ sicca, & puluerizata, fenu-  
græci farinae, farinae seminum lini, anisorum, pulueris ruta  
sicca, misce, & omnia simul bulliant, in aceto acutissimo, uni-  
ca leui ebullitione, postea cum melle q. s. misce, & s. a. fiat em-  
plastrum, & reiteretur ad mammas applicatio ipsius em-  
plastri bis, aut ter in die, si opus fuerit. Ultimo loco exhi-  
beatur leporini coaguli contriti, ad pondus unius drachmæ  
pro quâq; uice in uino optimo maluatico ipsi nutritici stoma-  
cho ieiuno, quoniam non solum lac, sed etiam concretum  
sanguinem in uentrem dissoluit. Nec non ore proprio,  
uel ab adultis bis in die emulgeantur mammae, donec  
lac ad suam naturalem qualitatem redeat, postea lactet  
infantem.

## DE SUPPURATIONE MAMMARVM.

CAP. XXI.

**S**I uero mammae ipsius nutritici, uel ad suppurationem, uel  
ad aliquam inflammationem deuenierint, tunc curandæ  
sunt manu chirurgica, & quoniam aliquândo inflammatio-  
nes ipsæ sunt morbi diuturni, & difficilium curationum, pro-  
pter humiditatem copiosam fluentem ad ipsas mammas, &  
etiam propter conuersionem earum in peiores morbos, propte-  
reâ

reà alia nutrix inuenienda est. Quamobrem de ipsis morbis hic non est scribendum, cum intentio mea sit tantummodò (ueluti dictum est cap. 7.) scribere de morbis, qui curari possint, lactante nutrice, uel lactatura infra paucos dies, pro tuenda sanitate infantis. Etenim cum lac per multos dies, transit in cibum assuetum, infantis mutatio periculosa, & permo-  
lesta est. Præclare. n. inquit Hippocrates, cibos uerò, quibus uti non consueuerunt, etiam si mali non fuerint, molestè fe-  
runt, consimili modo, & potus. Propterea à infantibus pri-  
mo lacte assueti difficile ab altera nutrice lac emulgent, ad-  
eò ut interdum aliqui ab hac necessitate coacti fame pereunt.

Hip. 2. de  
uict. r. rat. d  
acut.

DE RATIONE SICCANDI LAC POST  
ABLACTATIONEM INFANTIS.

CAP. XXII.

POST QUAM Ablactatus fuerit infans, cum in mam-  
mis nutricum congregetur, & continuè multiplicetur lac,  
quod nisi statim emulgeatur, aut siccetur, dolores in ipsis mam-  
mis excitat, & aliquandò apostemata, & diffunditur per  
uniuersum corpus, & febres succendit. Propterea ipsius  
lactis siccandi rationem, quanquam ad infantis tuendam  
sanitatem non pertinet; nihilominus publicæ utilitatis gra-  
tia, hic docere non erit absurdum. In uictus igitur ratione  
conueniunt, quæ habent facultatem siccandi. Vnde aer fri-  
gidus eligatur, laboriosa exercitatione utatur, & præcipuè  
cum partibus infernis, deambulando, aluum deiciat. Som-

CAUSA.

PROGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

RATIO.  
MEDIC.

mus sit breuior solito. Vinum moderate bibat subnigrum, & astringens; panem satis coctum, & carnes assas comedat. Vitet in cibo ea, quæ lactis generandi, & augendi uim habent, prout a nobis in libro hoc, capite. 3. antè ostensum est. Et si ut plurimum duobus, vel tribus diebus, sola victus ratio ad ipsius sufficiat exiccationem, nihilominus quia non semper sufficit, aliquid de ratione medicamentorum in medium afferre conueniens esse uidetur; Quapropter in primis ter, aut quater, si mammae non doleant, (quoniam si dolent abstinere oportet) prima die manibus proprijs lac è mammis emulgeat; Secunda uerò die abstineat ab ipsa emulsione; Deindè oleo omphacino ipsa prima die mammas inungat; secunda autem oleo myrtino, & masticino admisto inungere prestat. Verum si hæc non sufficiant cataplasma hoc apponito. R. farinae fabarum unc. 2. pulueris foliorum myrti, mirrhæ, thuris, masticis an. drag. 2. albuminis euorum duorum misce, & fiat cataplasma. Præterea si opus fuerit, ut tuto, & citius exsicccetur ipsum lac, in tempore veris, & æstatis hunc bolum nutrice exhibere poterit. R. cassia recente'r extractæ. drag. 10. diacatholicon. drag. 2. misce, & cum saccharo fiat b. Vel fiat ex electuario lenitino, vel cum manna electa fiat potio, aut cum syrupo ex pluribus infusionibus rosarum, & similibus. In autumni uerò, uel hyemis tempestate exhibere poterit, horis quatuor antè cibum, pilulas istas, R. pilularum ex reubarbaro, & agarico Mesue an. scrup. 2. s. misce, & cum melle rosato reformatur pilule





OMNIBONI FERRARI  
MEDICI AC PHILOSOPHI  
DE ARTE MEDICA  
INFANTIVM.

LIBER SECVNDVS.

DE ELECTIONE AERIS.

CAP. I.



Gal. i. de fa-  
nit. tu. c. ii.

**I**N Primis, quia aer est causa, sine qua uiuere non possumus, & ipsum optimum in pulmones attrahere, omnibus salubre est. Propterea eius nunc parua non habenda est ratio, & diligentia adhibenda, pro sanitate tuenda infantis. Idcirco optimum aerem (inquit Galenus) cenſeo, qui prorsus sit purus. Aer purus est, qui nec stagni, nec paludis halitu sit perturbatus, nec ex profundo specu pestilentem auram spirante infectus, nec qui ex cloacis, quae magnam aliquam urbem, aut numerosum exercitum purgent, uitium contraxerit; nec qui ex animantium, & olerum, aut leguminum putredine, aut fimo coinquinatur, nec qui ob stagnum, uel flumen uicinum nebulosus est, nec qui editis undique montibus in cauo loco clausus nullum recipit



recipit flatum. Si igitur infans natus sit, vel in ciuitate, vel in eius aliquo uico, vel ruri, vel in aliqua istis qualitatibus mali aeris infecta domo; tunc in alium salubriorem aerem re ducendus, & ibi educandus est, & semper in partibus supe- rioribus domus a terra, & humiditate eleuatis collocandus, nisi aliud indicetur; Et cubiculum ipsius a parte septentrio- nis debet fenestras habere clausas, nam aer septentrionis con- densat corpus, & prohibet resolutionem, & exprimere cere- brum, & uentrem; & propter illud sequitur ophthalmia, & tussis; Recte enim Hippocrates inquit. At si aquilo- nia fuerint, tussis, fauces, alui duræ, difficultates urine, horrores, costarum dolores, & pectoris. Et a parte meridiei debent fenestræ, hyberno, autumnali, & diurno tempore re- seratæ esse; tempore autem ueris, & aliquando in æstate, (uenti enim austrini eo in tempore ut plurimum flant) de- bent esse clausæ, quia proprietas uenti australis facit dissolui humores, & ipsos facit ad profundum corporis fluere, & re- plere cerebrum vaporibus, unde sequuntur scotomia, & vertigo, & scabies, & furunculi. Et Hippocrates dicit, austri auditum hebetantes, caliginosi, caput grauantes, pigri, dissoluentes. A parte uerò orientis, & occidentis quotidie hye- me aperiantur fenestræ, manè orientales, & post meridiem occidentales, ut sol manè, & serò, tam in ascendendo, quam in descendendo loci partes illuminare, calefacere, & exsic- care humiditates valeat. Quippè uenti orientales, & oc- cidentales comparatione meridionalium, & septentriona- lium temperati sunt. Verùm si orientales uenti in fine diei, & occidentales in principio flauerint, quoniam orientales

orig. & qm  
Auc. trac. a  
de rem. noc.  
acci. ex aere  
cap. pprio.

Hip. 3. apho  
rum. 1.

Auc. ibidē.

Hip. 3. apho.  
3.

Auc. 1. f.  
doc. 1. cap. 8.

Auc. 1. f.  
doc. 1. cap. 8.

F manè.

manè, & occidentales serò flare solent, cùm hoc sit contrà eorum naturam, tunc fenestræ claudendæ sunt. Et cùm dico, tempore hyemalis fenestras reſeratas esse debere, intelligendum est, ut tantum lux & caliditas penetrare possit, non autem aeris frigiditas, & humiditas. Propterea tempore quo imbres abundauerint, & præcipue hyeme, siccitates. n. imbribus salubriores sunt; Ignis in cubiculo accendatur quotidie, et æstate ad euitandam intēsissimam solis caliditatem, præter orientales fenestras, quæ quotidie debent summo mane aperiri, saltem per horas tres, & omnes aliæ claudi, post solis occasum; denud aperiātur saltē occidentales, & oriētales.

DE INFANTIVM AERE, QVI NON HABENT  
OPTIMVM TEMPERAMENTVM.

CAP. II.

**C**VM Verò corpora infantium non habent optimum temperamentum, & quibus præcipue ab aliqua ex quatuor qualitatibus humorum, vel simplici, vel composita prædominantur, tunc secundum earum qualitatem (si contraria contrarijs curantur) in aere cōtrario modo aduersari oportet. In quibus. n. infantibus aliqua exuperans qualitas dominatur, ijs utilisſimus aer est, qui ei qualitati maxime est aduersus, frigidus calidæ, calidus frigidæ, humidiori siccus, sicciori quā par est tantò humidior, quantò magis, siccitas ipsa modū excessit. Et eodem modo etiam obseruare oportet in tempestibus anni, ueluti in tempore æstatis, in quo aer, ut plurimum, calidissimus, & siccus est, in locis frigore opaco præditis, cubandus est infans, et in hyeme, & tempore frigidissimo in lo-

Hip. 3. apho  
ris. 11. & 12.  
Galen. 1. de  
diff. 1. & 2.  
11. & 12.

Galen. 5. de  
nat. tu n. ca.  
11. & 12.

eis calidis, & sic de singulis, eo modo semper conseruanda est ratio aeris, constitutionis corporis, & temporum tempestatū.

## DE INCISIONE UMBILICI.

### CAP. III.

**S**TATIM Cum infans natus sanus est, quod percipies, tū si mater per totū gestationis in utero tēpus, sana uixerit, & si in terrā positus eiulatū edit, cum conueniente firmitate, tū si in omnibus partibus, ac sensibus integer est. In primis igitur umbilicus acuto scalpro quatuor a uentre digitis refecetur, & prohibeatur, ne refectio fiat cū arundinibus, aut uitris pro ut antiqui utebātur, ne quid atteratur, et cōtētus in ipso sanguis grumosus exprimatur, et spongia detergatur. Deinde cū lana ligari munda debet, quæ sit retorta parumpèr, & subtilitèr, ingeniose adeò ne doleat, uel talitèr ne lædat, et pannus, seu petia infusa in oleo, est super ipsum ponenda, & propter ipsius umbilici incisionem, præceperunt sapientes, ut Venarum citrinarum, & sanguinis draconis, & sarcocollæ, & cymini, & vſneæ, & myrræ partes sumantur æquales, et tritæ umbilico superponantur cuminum inspergere super ipsius umbilici incisionē reprobāt, propter eius acrimoniam. Vltimo loco duplicatus ipse umbilicus, & lanæ inuolutus, lenitèr in medio cōponatur.

Auiclib. 1. 6.  
3. doc. 1. ch.  
1.

Auic. ibidē.

Actius. lib.  
4. cap. 3.

## DE NUTRICATIONE INFANTIS.

### CAP. IIII.

**N**UTRICATIO Autē infātis, qui corporis habitu est optimo, in duas partes diuiditur. Vna est, quæ ab eius natali extēditur

usq; quo priores dentes emisserit. Altera verò a dentium generatione ipsa usq; ad uiginti menses, vel ad biennium, quod spatium temporis communiter in usu est pro lactatione infantis; Qui enim lactent paulò plus ultra secundum sententiam Neotericorum tardiusculi sunt, disciplinæq; apprehendendæ parum idonei. Igitur de ipsa prima parte, quæ est usq; ad dentium productionem, nunc pertractare operæ pretium est. Et animaduertant studiosi, quòd intentio nostra, non est obstetrices omnia ad earum artem maximè necessaria docere; sed ea tantummodo, quæ potius pro tuenda sanitate infantis ad nutrices pertinet, & necessaria sunt pertractare. Quoniam statuo obstetrices ipsas instructas esse; prout ubiq; terrarum secundum consuetudinem regionum, prouinciarum uè, alijs atq; alijs modis instructæ inueniuntur; & hoc propter aeris, loci, et cibi rationem; Nihilominus docebimus ea, quæ erunt, prout dictum est, ad tuendam sanitatem infantis, & ad curationem morborum eius, tam ad nutrices, quam ad obstetrices, secundum ordinem in suis locis pertinentia.

## DE CIBO INFANTIS.

### CAP. V.

**C**UM Dentes ipsi primi, qui ob lactis qualitatem, quæ si calida est, citò, & si frigida, tardè suboriuntur. Propterea aliquandò in quinto, aliquandò in undecimo, & ut plurimum in septimo mense nascuntur, teste Paulò Aegineta, dicente, circa mensem ferè septimum in pueris dentes producuntur; Laudo ut infans eo tempore solo lacte nutriatur. Et

si ma-

Paul. 1. ca. 9.

Gal. 1. de fa  
nit. tuen. ca.  
10.

si mater filium lactare uoluerit, uel nutrix, quæ de recenti peperit, in primis quatuor diebus, uel paulo post. Lac enim eo in tempore indigestibile, crassum, & uitiosum est, quod Latini uocant colostrum, Græci uero τεοφαλδος Præstat igitur exhibere, pro lacte, infanti parum mellis optimè despumati, sed hoc in Italia non est in usu. Mammæ enim matres, & puerperæ ab alijs mulieribus emulgendas tradunt, donec in ijs diebus lac uitiosum expurgetur, & interea salubrius lac, ab alia nutrice infanti præbeatur, & cum cæperit mater, uel puerpera, transactis quatuor primis diebus, præbere lac infanti, conuenit in ijs principijs, bis, aut ter mane, lac ipsum prius manibus, uel ore alieno emulgere, postea papillam infanti tribuere, ut si aliquod uitiosum adhuc in mammillis permanet, per ipsam emulsionem exauriatur, & lacte in melius purgato nutriatur infans. Et sufficiat infanti in ijs primis diebus eius natalis, sugere mammillas bis, aut ter in die. Etenim ob imbecillitatem caloris innati, non est multum lactandus, ut possit optimas facere concoctiones, & præfocationem ob copiam lactis uitare. Verum probæ obstetrices ad confortandum cor, & resistendum malignitati sanguinis menstrui melancholici, qui in ipso infante ab utero matris originem trahit, & adhuc abundanter eo in tempore permanet; exhibere solent folium unum auri infanti cum lacte nutricis, pro primo cibo. Et quia sæpè contingere solet, (ne prætermittam secundum ordinem in suis proprijs locis ea, quæ necessaria sunt,) uel ob incuriam nutricis, uel ob imbecillitatem dextræ eius mammæ, aut malum usum, ut ex sola sinistra mamma lactet infantem, adeo, ut lactando, post-

Aetius. 4. ca.

3.  
Aulic. 1. f. 3.  
cap. 2.

quam

quam a fascijs soluta sunt brachia infantis, infans ipse dextram manum necessario in brachijs nutricis semper oppressam tenens sequatur, ut ex ipsa consuetudine expedita, ut plurimum sinistra fiat sinister, scilicet, qui manum sinistram tantummodò administrat; Quamobrem ad utrasq; mammillas conuertere debet nutrix infantem, ut modò dextram, modò sinistram manum liberam habeat.

## DE FRICATIONE, INUNCTIONE INFANTIS.

### CAP. VI.

**C**UM Infans in utero matris nullam rem durā, aut asperā tangat, nec aeris frigiditas, aut caliditas extranea illi usquā noceat; Propter eā corpus ipsum est molle, ac fluxibile, natus postea ubi in duriora, & aspera corpora, et frigiditatē et caliditatē ambientis eius membra aliquandò incidere contingat, ut cutis ipsius, qui modò natus est, & membra ipsa densiora, & duriora ad tolerantiam, quā aptissima fiant; statim post eius ortum, et primum balneum aquæ dulcis calidum corpus ipsius, præter oculos, nasum, aures, & os; & sensus ipsi hebetes non fiant, modico sale, subtiliter, in puluerem resolutò, & cum oleo oliuarum, dulci, calido, misto aspergatur, & inungendo fricetur. Et simultum humidum, & crassum est corpus infantis, præstat pèr aliquot dies, puta, per octo, vel per decem, ad arbitrium bonæ obstetricis, miscere paucum salis contriti cum ipso oleo; Et ipsum primo die eius natalis transactò, non tantum inungere quotidie debemus; uerū etiā mediocriter conficcare, per totum corpus fricationes enim

Gal. 1. de la-  
nit. tuen. ca.  
10.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap.  
1.

Gal. 1. de sa-  
nit. tuē.

conueniunt. Lactē in Ventriculo adhuc crudo non existente, veluti fiet, si post longum somnum tempus obseruetur, & ante balneum. Nam fricatio ipsa adiuuat concoctionem, & loco exercitationis supplementum præbet, attrahens alimentū per uniuersum corpus, & omnia membra roborans, & ea solidiora, & fortiora reddēs. Et hoc obseruare quotidie conuenit; donec tres annos (lactationis scilicet) infantes ipsi exceßerint. Qui verò hos tres annos exceßerint, eos si non quotidie, at ter tio quoq; die, quarto uē inungere, atq; fricare oportet. Si verò corpus infantis sit macrum, & extenuatum, tunc animaduertant studiosi, quod inunctio salita, non conuenit antè balneum, sed potius post ipsum balneum ad constringendum, & claudendos porros per caliditatem ipsius balnei reſeratos; alioquin alimentum fusum, ac dispensatum a uirtute balnei, in halitum per ipsos porros, rarefactos resolueretur.

Gal. 1. de ſa  
nit. tuen. ca.  
10.

## DE BALNEO INFANTIS.

### CAP. VII.

**E**XPEDIT Vt ſemel ſaltē infans quotidie lauetur ob multas ſordes, et humiditates corroſiuas, et immunditias, quibus corpus ipſius cōtinuē abūdat. Et ſi dicat Auicēna, ut ipſe infans, bis in die, aut ter lauetur. Nihilominus, quoniam frequens lauacrum reddit corpus flaccidum, & imbecille. Ob id, mea quidem ſententia, ſemel balneandus eſt ipſe infans, niſi maior urgeat neceſſitas, & hoc ſaltem, uſq; in quartū, a natali, menſem, poſtea uſq; ad ſeptimū, præſtat, alternis diebus balneare infantem, a ſeptimo verò uſq; quò a lacte amoueatur infans.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 6.

infans, sufficiat eum lauare bis in hebdomada. Et locus ubi lauatur debet esse hyberno tempore calidus, & æstate temperatus, et clausus, ne aeris subtilitas per cutem in balneo rare factam ingrediatur, & faciat obstructionem, uel aliquam putrefactionem excitet. Hora uero, qua balneandus est, melior est, quæ post somnum obseruatur, & post perfectam digestionem. Nam si ante digestionem, uel post cibum statim balneetur, uel fricetur, tunc corpus crudo alimento implebit, tunc caput onerabitur malis vaporibus. Igitur a longiori somno excitatus fricetur statim, & balneetur, et postea ad nutriendum lac exhibeatur. Et animaduertendum est, post cibum minime bibere infanti permittendum esse, quem balneum excepit. Etenim eorum, quæ ventriculus continet, præcipitatio distributio in corpus fiat. Et balneum fieri debet, æstate, aqua suauis, & tepida, parum cum rosis, violis, & chamæmelo ebullita. Hyeme uero aqua calida, at non pungente, cum rosis siccis, floribus chamæmeli, maiorana, salvia, menta, pulegio, & calamento, prius, lento igne, parum ebullita. Et aures custodiantur, ne remaneat in eis humiditas balnei; Et pori obstructi perfrigescant, quia si ingreditur aqua in aure quandoque cum non custodit eam ille, qui balneatur, aut abluatur, & lædit, & quandoque apostematur radix aurium, uehementem incurrit dolorem. Lauacrum uero ipsum fieri debet hoc modo. Pectus infantis non tangendo ventrem, manu sinistra nutricis, sustinendum est in concha satis magna, aqua balnei plena, & manu dextra, uel alienis manibus, postea leniter abluatur, ita ut omnes sordes, quæ in collo sunt, & concaua loca, sicuti sunt axillæ, & inguina diligenter exter-

Gal. 1. de  
nut. tuen. ca.  
10.

Gal. libidem.

Auic. 3. f. 4.  
cap. 20.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 1.



tergantur; Et deinde mollibus pannis linteis, & candidis, calidisq; hyberno tempore, & æstate siccis, tantum, exsiccentur, & suauiter extergatur.

DE FASCIANDO INFANTE.

CAP. VIII.

**O**BSTETRIX Postquam, prima die lauit infantem, statim post eius ortum, sedere debet (idemq; singulis diebus efficiatur) & genibus iunctis femoribus suis in linteolo mundo, & calido superposito, hyeme, panno lana contexto, infantem suauiter, & summa cum diligentia accipere, tangere, voluere, & tractare debet, & prius digitis purgare nares, & oleum dulce oculis infundere, ut tunice, quibus constant oculi, molliantur, & extergantur, & viuiores factæ integrum visum habere possint, & minimum eius digitum in ano infantis immittere, et in circuitu orificium mouere, & ubi opus fuerit dilatare, cōstringere, & omnia membra eius subtiliter tractare, & eas rectas adaptare naturaliter faciat, vesicam eius quoq; comprimere, ut urinae exitus facilis fiat. Postea sub pannis ipsis, sublata fascia, lata, & satis longa, ut sufficienter singulas partes circumcingere valeat, & in primis caput pannis, aut lino, aut lana contextis, at semper mundis, contegatur, hyberno tempore ex lana, æstate verò ex lino. Deinde thoracem, ab humeris incipiendo, simul cum pannis ipsis circumuoluatur, prius brachijs super ipsum thoracem, extensis ad eò, ut manus eius usq; ad genua ducantur, mox, coniunctis genibus, fascijs inuoluantur, &

Auic. lib. 1.  
in ab. 2. dñ  
11. q. 2. 42

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap.  
42

Auic. ibid.

talibus eorum interponatur, ne ita coniunctis aliquid de membranulis corrodat. Ultimo loco, signo crucis, in qua forma salus nostra pependit, muniatur; ne ab aliqua nocturna, & malefica strige maleficietur. Scribitur. n. (sed omnino fabulose) sententia mea) subera strigum infantium labris immulgere, & sic postea sanguinem eorum exugere. Nihilominus Marsilius ficius sic ait; Communis quaedam est, & uetus opinio. Aniculas quasdam sagas, (quae & striges uulgari nomine nuncupantur) infantium sugere sanguinem, quo, pro uiribus iuuenescant. Et similiter quotidie fasciis leuiter constringendus est infans, donec membra eius optime roborentur, & solidentur, & praecipue manus, & pedes eius, a natali usque, ad menses quatuor fasciis inuoluendi sunt; & transacto quarto mense manus, & brachia soluenda sunt; Post decimum uero mensem, pedes etiam, (nisi aliud indicetur) soluantur. Totus autem thorax, & uenter usque, ad biennium, ad fouendum calorem innatum, & ad tuendas partes ipsas fasciis tegendus est.

## DE MODO CURANDI INFANTIS

### CAP. VIII.

**P**OST QUAM Lauit, sumpsitque cibum infans, deo membra soporis, in loco non luminoso, sed potius tenebroso, ut facilius somnum capiat, non frigido, neque humido, sed

Mars. Fici.  
lib. 2. de ui.  
m. cap. 11.

Aulc. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 11.

moderate calido; ubi non adsit fumus, nec malus odor, & ubi cum dormientem ledere non possint animalia venenosa. Etenim aliquando euenit, ut æstatis tempore, propter incuriam, nutritis, relicto infante in aliquo viridario dormiente, sub aliqua umbra, sine custodia, serpentes per os ingrediantur, vel mordeant corpus ipsius infantis; & necent ipsum; vel ubi non sit humiditas copiosa, uel immunditia aliqua. Aranei enim, & scorpiones in ijs locis sæpè generantur; nè aduenientes ipsi supra dormientem infantem aculeo venenato inficiant eum. Veluti anno salutis nostræ 1570. in agro Veronensi, ubi dicitur a Baldaria, accidit, dormiente enim quodam infante, filio unico Domini Antonij Francisci Anzolelli in cunis, scorpio satis latus ingressus est per os ipsius infantis dormientis, postea in eius gutture aculeo inficit eum, adeò, ut infans experrectus, & dolore excitatus, post multos labores, & dolores, & ploratus euomerit scorpionem ipsum, & obierit diem suum, cum maximo dolore parentum suorum. ET ALEXANDER LANDUS Nobilis Veronensis Vir medicinae arte clarissimus, & omni doctrina, & humanitate præstantissimus retulit mihi, se uidisse quendam infantem, in cuius stomacho (dum in quodam prato dormiret) lacertæ duæ, tempore æstatis, ingressæ fuerant per os, adeò, ut ipse sæpè veluti epilepticus caderet in aromataria, ad signum fontis in ciuitate Veronensi, prope templum sancti Vitalis, quò ab ignorantibus causam ad medicum, curationis gratia, ductus erat ipse puer. Et post ipsius in eodem loco casum euomisse in eius præsentia, cum magna

Cicero. 2. de  
diuin. cir. m.

omnium, qui aderant, admiratione, duas ipsas lacertas, qui postea statim è morbo sanus euasit. Cicero autem loquens de Roscio inquit; Experrecta nutrix animaduertit puerum dormientem circumplicatum serpentis amplexu. Quapropter ut tutus sit, & ille sus conseruetur, nunquam infans, uel dormiens, uel vigilans, derelinquendus est sine custodia, & cum dormit caput, & totum corpus eius tegatur in cunis cum linteolo mundo, ita tamen, ut respirare valeat, & ab animalibus istis, & alijs uenenosis, uel similibus, sic facile ledi non possit. His ergo seruatis, infantem cubare uolentas in canis ponant, quibus stratum paretur concauum, sed satis molle adeo, ut extra cunas cadere facile non possit, ut spina dorsi, aut collum non contorqueatur, & caput eius eleuatum semper sit; Et si oportuerit lucernam accensam ponere in loco ipso, prout dictum est, tenebroso, ubi dormit; Animaduertendum est, ut ipsa lucerna non ponatur post caput ipsius infantis, ne ipse ad aperiens oculos, & uersus ipsam lucernam cernens, necessario cogatur contorquere oculos; adeo ut per longum tempus strabositatis habitum assumat. Ideo semper ponenda est ipsa lucerna ad pedes cunarum, ut recte ad aperiens oculos in eam cernere possit. Vtcrius infans ipse non est locandus, precipue nocturno tempore in lectulo apud nutricem, donec ipse infans cubare possit, manibus, & pedibus solutis, sine fascijs, et admotiones, et functiones naturales peragendas, ualidus, & aptus sit. Nam sepiissime ob negligentiam nutricis somno profundo deuincte euenire solet, ut infans fascijs alligatus manibus, & pedibus, non ualens se mouere, sub lectulo tegatur, & suffocetur.

## DE SOMNO EX FLORATV INFANTIS

## CONCILIANDO.

## CAP. X.

**S**i infans ante lactationem plorat, ploratus ei confert, at vero cum hora assueta, post fricationes, ablutiones, & lactis assumptionem, non conciliat somnum, sed plorat, tunc ploratus ipse ei nocet, impediens concoctionem, & deorsum pellens cibum indigestum. Propterea somnus tribus modis conciliari debet. Primo si nutrix ponat papillam mamillarum in ore ipsius infantis. Nam non parum lenit eorum dolorem. Secundo si mediocriter in cunis moueatur. Etenim post lactationem, eius cunae uehementi motu non sunt mouendae, quia in ipsius stomacho lac concutitur, & sic facilius indigestum descendit. Tercio si nutrix vocis modulationem exhibeat, quibus modis uti prudentiores nutrices consueuerunt, sic dolorem, & somnum conciliantes, qua corpori simul, & animo auxiliatur. Verum enimvero si ijs non obstantibus, perseueret ipse infans in fletu, fasciam statim in primis inspicere debemus, ne nimis stricta sit, aut si pedem, aut manum contorserit, aut si ab aliqua re pungente laedatur; prout aliquandò accidit, ob negligentiam nutricum. Relicto enim aliquo acu, aut aliqua re dura, aut aspera, in ipsis cunis, in uolucrisq; euenit ut saepe infantes ipsi pungantur, aut propter nimiam repletionem lactis, quòd perspicies si praecordia, & stomachus eius erit repletus, et tensus; Inspicies etiam si causa erit propter grauitatem coopertiorum, aut propter paucitatem eorum, aut ob nimiam caliditatem, aut ob frigiditatem, aut ob desiderium uolendi

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 2.

Gal. 1. de fa-  
nit. tuen. ca.  
7.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap. 1.

se in latus. Quoniam infantes ipsi nunquam plorant sine legitima causa. Quippe loquelæ adhuc expertes, ploratu, clamore, iracundia, & inordinato sui motu dolorem indicant. Propterea prudens nutrix diligenter debet animadvertere, & inuestigare, ut causas ploratus eorum cognoscat, quibus cognitis opportuna remedia ipsis exhibeat; Et principaliter animaduertenda est immunditia eorum, quippe in inuolucris, et pannis immundis, et sordidis inuolutus infans nunquam quiescet; Amans semper exactissimam munditiam, veluti exemplo pulcherrimo nos docet Galenus, dicens. Ego, namquam puello quodam totum diem irato, ploranteq, ac immodice, inordinateq, se iactante, nutrice ipsa omnis consilij inope, deprehendi, quod offendit, quippe ut neq, papilla in os immissa, neq, a nutrice prolatus, si forte meiere, aut aluum exonerare vellet, lenitus est; sed nec ulnarum agitata reclinari est cæptus. Aduerti autem tum lectum, tum inuolucra, tum vestes ipsas sordidiores. Propterea puellum ipsum immundum, atq, illotum lauare, detergereq, iussi, tunc lectulum illi mutari, ac vestem omnem tersam, mundamq, præberi, quibus peractis, protinus ab immodico agitato conqueuit, illicoq, dormiuit, non suauissimum modò, verum etiam longissimum somnum. Vtèrius cùm infans dormit custodiatur a prohibentibus somnum. Nàm maiori parte temporis infantes dormiunt, & cùm surgit a somno excitetur ad videndum lucem, in tenebris enim infantes ti-





panis incisus, cum lacte ebullitus, vel cum aqua, & oleo, vel iure carniū ei exhibendus est, vel farina ex frumentaceis seminibus cum lacte vaccino, vel ouillo, caprinoq; similiter cocta, donec apparuerint canini dentes, qui postquam fuerint orti, & firmati poterit ei exhibere panem non valde durum, & pultes, mox carnes, & legumina, & similia secundum exigentiam sanitatis, fortitudinis, virum, temporis, & iudicii bonæ nutriticis. Vnum tamen obseruandum est, ne lac in stomacho coaguletur infantis, ut post lactationem, & emulsionem lactis, ei non exhibeantur acetosa, neq; salsa, neq; aromatica, neq; acria, neq; vinosa. Et si dicat Galenus, quare, neq; iam adultis vinum, nisi modice sumptum, existimandū est vtile esse. Quod uidelicet ad iram præcipites, & ad iniuriam incontinentes facit, & partem animi rationalem turbidamq; reddit. Nihilominus ad adiuvandā concoctionem, & nutritionem, postquam fuerit infans a lacte remotus, at non ante laudo ut ipsi infanti parum vini aqua correcti, & moderate exhibeatur. Aetius enim inquit, donec firmetur infans, lacte nutriatur; postquam verò solidus factus fuerit, micis panis ex vino mulso, aut vino dulci, aut lacte. Deinde etiam ova sorbilia sumat; nam quæ mandere oportet, salvia in ipsis replentur. Potus dandus est vinum dilutum.

Gal. 1. de fanic. tuen. ca. 11.

Aetius. lib. 4 cap. 28.

## DE LACTIS, ET CIBI INFANTIS MUTATIONE.

### CAP. XII.

**E**T Quia infantes interdum propter aliquam infirmitatem, vel mortem nutriticis, vel ob aliquam aliam causam,



fam, cōguntur maximo suo periculo, & molestia ab altera nutrice lac emulgere, vel in cibo mutationem facere; propterea, si, a natali usq, ad septimum mensem, vel paulò ulter à contigerit, lactis, seu nutricis mutationem facere, quoquo modo facta sit, (dummodo nutrix optimas eius conditiones habeat) facilis erit mutatio. At cum infans dignoscere incipit difficilime' alterius nutricis mammas emulget; prout ego ingenuè fateor me infantem quendam vidisse, qui (eius primæ nutrice, propter commercium viri pregnante) potius, quàm ab altera lac emulgeret, fame perijisse. Germani autem hac difficultate commoti, statim ab initio incipiunt nutrire infantes pulmento quodam, quod vulgari sermone miosam vocant ex uaccino, aut ouillo, vel caprino lacte, & frumenta-  
ceis farinis igne confecto, ut in similibus valeant sine nutrice nutrire infantes. Verùm si ista euenerit necessitas, tunc secunda nutrix nocturno tempore in tenebris, sub silentio, nè uisu, aut loquela eam dignoscat, incipiat paulatim lactare ipsum infantem, donec assuescat. Et si hæc non sufficiant, modico melle, aut saccharo in puluerem redacto, cum lacte ipsius nutricis admisto papillas mamillarum inungat, & in os infantis injiciat, quousq, ad emulgendum alliciatur. Vel lac in ore manibus proprijs emulgeat infantis; quoad ipse infans a suauitate lactis excitatus papillas ipsas suscipiat, & eas sugere incipiat. At si infans ab lactatus erit, donec percipere cum ratione valeat eum abstinere valde necessarium est a eibis unctuosius, pinguibus, fructibus, dulcibus, & facile putrescentibus, similibus enim assueti infantes alios cibos comedere nequeunt. Præterea cibos, quibus uti non con-

Hip. lib. 2.  
acutorum.

H sueuerunt,

Hip. lib. 1.  
aphor. 13.

Hip. lib. 1.  
aphor. 14.

sueuerunt, etiam si mali non fuerint, molestè ferunt. Et cum minimè infantes ipsi ieiunium ferant, præsertim, qui inter ipsos sunt inuidiores, cum eos cibare uolueris, necessitate coactus eris, aut eis assuetos cibos exhibere, aut absq<sup>ue</sup> nutrimento de die in diem absumi corpus eius inspicere. Qui crescunt enim plurimum habent calidi innati, plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus absumitur.


DE REGIMINE INFANTIS A DENTIVM  
PRODVCTIONE, VSQ<sup>ue</sup> AD LA-  
CTIS REMOTIONEM.

CAP. XIII.

**C**UM Infans iam solidior factus sit, & brachijs, & manibus mouere, & pedibus sinè fascijs repere cæperit, ingredi; uel ambulare, uel aliquid motus facere immature cogendus non est, ne eius membra distorqueantur. Verùm quia in ambulando sæpissime in ijs principijs contigit infanti cadere. Propterea ut facies, & caput eius cadendo lædi nō possint. laudo ut quotidie ponatur in capite infantis circulus quidam rotundus, et leuis ex panniculo lineo, uel pelle hædina factus, & coto plenus, uelut corona regia, in quatuor partibus diuisus, cuius forma hic annotata uidetur.



Postea ut ad incedendam facilius assuescat eum substinendo sub axillis, & brachijs adiuuare debemus, ad parumpè deambulandum, & hoc stomacho non repleto, & non statim post cibum. Lando etiam, ut aliquandò ponatur in quodam (ut in Italia fieri solet) paruo curriculo, gratia huiusce exercitationis tantummodo factò, in quo per se ipsos infantes deambulando cadere non possunt; cuius forma ad clariorem intelligentiam quorumcunq; inferius descripta apparet.



Deinde cum erit fessus, uel gestandus est, uel prout multis in locis obseruatur, eum ponere ad sedendum debemus in quadam parua sede, in qua concluditur adeò, ut pariter cadere non possit, & meiere, & aluum exonerare quàm aptissime possit, sine aliquo impedimento, cuius forma similiter ad claram omnium cognitionem, hic posita est.



Et cum ratio in eis sopita sit prætereà ab ipso infante semper remouendi sunt lapides, ligna, fustes, cultelli, Vitrum, & omnia alia instrumenta ferreà generis cuiuscunq; quæ ledere, pungere, aut incidere, aut frangere, aut grauari possunt, & pariter summa cum diligentia semper remoueatur ab igne, ab aquis, à pueris, à locis altis, & a locis, quò sepe conueniunt, & transire solent animalia, quæ vel morfu, vel cornibus, vel pedibus ledere solent, & possunt, prout sunt canes, boues, equi, & similes; Postea, sed semper cum custodia, more agni, sic vel sedendo, vel deambulando lasciuire concedatur. His ergò omnibus de die in diem summo studio, diligentiaq; seruatis, sanitas facillime custodietur infantis, donec peruenerit ad biennium, vel ad etatem, in qua ex se ipso ad ambulandum, loquendum, & comedendum quam aptissimus erit; Et cum aliquid intelligibili modo lo-

qui

qui cæperit, hortor ut ante omnia a nutrice, vel a matre doceatur pronuntiare ea, quæ pertinent ad cultum diuinum, veluti orationem dominicam, Symbolum apostolorum, & salutationem angelicam; quoniam initium sapientiæ est timor Domini.

## DE REMOTIONE INFANTIS A LACTE

## CAP. XIII.

**A**NTEQUAM, Infans a lacte remoueat, necesse est, ut ad omnium dentium firmitatem, & perfectum numerum, qui in uno quoque duos, & triginta continet, in utraque maxilla sexdecim collocatos perueniat, ut valeat cibum solidum incidere cum anterioribus, qui incisores nominantur, & octo sunt numero: 4. supra, & 4. infra, & cum proximis, qui canini vocantur, & quatuor numero sunt, si quid propter duritiem ab incisorebus scindi minus potuit, id frangatur & manducare etiam ualeat, aut læuigare interioribus, qui molares uocantur, & in numero debent esse quinque, vel saltem quatuor, ab utraque parte; tunc a lacte eo tempore ipsum deducere poterit; Quod si ante eorum ortum remoueat, periculum est ne infans ipse in ipsorum dentium generatione, et maxime cum caninos edit dentes (tunc enim propter febres, alui profluvia, gingivarum dolores, oris ulcera, & alia seuiora symptomata, quæ ei ut plurimum contingunt, comedere nequeat) & a lacte remotus potius fame, quam morbo pereat. Propterea ut inquit Aetius. Vbi vero iam intrepide frumentaceum alimentum infans sumit, quod plerumque circa uigesimum mensem

Gal. lib. 11  
de usu part.  
cap. 8.

Gal. ibid.

Aetius lib. 4.  
cap. 28.

Hip. 1. d. uic.  
rat. acut.

Auic. 1. f. 3.  
doc. 1. cap.  
3.

Hip. de den-  
titione.

contingit, tunc latenter, & paulatim ab ubere desuescat, & oportet ut hoc paulatim fiat, ut ad mutationem ipsius cibi facilius assuescat. Mutatio enim ipsa periculosa, & permolesta est, ut Hippocrati uisum est, dicens, cibos uerò quibus ui non consueuerunt, etiam si mali non fuerint, moleste ferunt, consimili modo, & potus. Laudo etiam, ut ipsa a lacte remotio fiat, uel in tempore ueris, uel in autumnno, ne infans, qui, relicto cibo assuetus, & qui ex nouo, non secundum consuetudinem nutritur, & aliquo modo patitur, a qualitatibus etiam ambientis, scilicet a maximis caloribus, et frigoribus aliarum tempestatum, facilius non ledatur, adeò, ut in aliquam perniciosam infirmitatem incidat. Igitur in primis diebus, uel in uere, uel in autumnno, ad id, quod est ex genere sorbendi, uelati ex ijs, quæ conficiuntur ex lacte, & farina, uel carniū leuium assuefaciendus est, uel ex ferculo, quod Itali uocant, panatellam, cum pane minutim inciso, oleo, & aqua, uel iure carniū cocto, ex qua quotidie manè prò primo cibo, ad calefaciendum stomachum, cyathus unus ipsi infanti cum surrexit è lectulo exhibeatur, & glandes etiam, & pastilli ex farina, & saccharo confecti ei exhibeantur. Verum ubi infans difficile relinquat emulsionem mammarum, nutrix papillas mamillarum suarum succo absinthij recentis inungat, quas semel cum gustauerit, sic inunctas, amplius emulgere non cupiet; uel R. mellis drag. 2. aloes contriti drag. 1. succi mentastri recentis drag. 2. misce, & papillas inunge. Infantes enim qui dum lactent, interim cibum adsumunt, facilius ab lactationem ferunt.

DE HIS QVÆ PERTINENT TAM AD ANI-  
MI MORES, QVAM AD TVENDAM SANI-  
TATEM INFANTIS.

CAP. XV.

**E**TSI de ijs tantummodo, quæ ad tuendam sanitatem, & curationem morborum infantium, lactentium attinet, scribere proposueram. Nihilominus, quoniam aliqui, (prout dictum est in cap. I I. istius libri) sugunt per bienniū, & aliqui etiam usq; in tertium a natali annum, & eo in tēpore incipiunt secundum rationem intelligere, loqui, & ambulare; Propterea de animi moribus etiam, qui ad ipsam, tūm animi, tūm corporis sanitatem pertinent, aliquid proponere mihi per necessarium esse uidetur. Quapropter cum infans cœpit dignoscere, obseruare oportet, ut infans non incidat in iram fortem, neq; uehementem timorem, neq; tristitiam, neq; uigilias; etenim ualde exsiccant corpus, & impediunt ipsius excrescentiam, & aliquandò generant diuersas ægitudines. Ita enim, quæ furor quidam est, existentis in corde caloris, ob immoderatum motum, per totum nonnunquam diffusa corpus febrem accendit. Sed indulgendum est ei infanti, quod moderatè desiderat. Nàm etati, & consuetudini, & tempori aliquid indulgere conuenit. Igitur post somnum, si est balneadus, prout dictum est capite proprio in libro hoc, balneetur. Deinde laudo, ut eum ludere permittatur; Et post ludum, aliquid ei ad manducandum exhibeatur. Et summo perè illud attendendum est, ne uideat horribiles figuras, nec qui custodit eum nimis ferox in uultu ei se obuiam offerat, ut repente non perterreat eum, ne melancholia, & nimio

Auc. 1. f. 3.  
doc. 2. cap. 2.

Gal. de causis  
morb. cap. 2.

Gal. lib. 8;  
met. med. c. 9.

maxore;

Gal. de par-  
tiz pillæ ex-  
ere cap. 8.

Abiz. 1. F. 3.  
doc 2. cap. 4.

Paul. aginc-  
ra lib. 1.

mærore oppressus, & sic malè affectus in malos mores, & in infirmitates incidat. Etenim multi præ sola læticia morbos euaserunt, multi etiam præ mærore egrotauerunt; sed hilari, & amabili fronte occurrentem sibi exhilaret eum semper. Spiritus enim per radios oculorum fascinare, inspicere, & afficere potest, adeò, ut non omninò mirum sit morbos quosdam animi, atq; corporis inferri, & auferri posse. Prospiciat etiam qui custodit eum, ut in præsentia ipsius non proferat, nec proferri ab alijs toleret blasphemias, maledicentias, & obtrectationes, nefaria, uel impudica uerba, nec ea, quæ non spectent ad honorem, & cultum Dei, nè discat postea cum maximo genitorum suorum dedecore, & nonnunquam contra eorum sententiam talia pronuntiare. Et antequam ad magistrum, qui eum doceat, ducendus sit, saltem sex habeat annos, ut aliqua ratione, & ordine, et naturæ fortitudine gradatim discere valeat; Et si mens patris erit, ut infans, exempli gratia, literis incumbat, & arma odio habeat (etenim infantes ipsi, veluti mollis cæra, sunt, quæ omnem sigilli formam recipiit) oportet ut tempestiue libros illi porrigat, & literas doceat, & proponat, eas laudando, arma uerò semper ei occultando detestandoq; Animi enim mores corrumpuntur malis consuetudinibus, cibis, ac potibus, & gymnasijs inspectionibus, auditionibus, & mala musica; quòd si causarum superiorum occulta inclinatio nonnunquam magis urgere uideatur, veluti de Achille scribitur ab Homero; Nihilominus uir sapiens dominabitur astris, & nihil difficile uolenti, experientia probamus. Postremò cū legere, & aliquid intelligere cæperit, de ætate in ætatem prouidendum est illi de præceptore probo, & doctiore, qui humani-  
tate,



rate, diligentia optimè doceat ea, quæ respondent uoluntati patris. Motus uerò, & exercitationes cum proportionem annorum commensurare oportet. Nam Galenus inquit, Recens tamen nati puelli tam ualentem motum, quam est, qui uehiculis, nauigijs, equis uè præstatur, adhuc non desiderant. at qui iam tertium, aut quartum annum, à natali agunt, his uehiculo, nauigioq; modice agitari licet. Septennes uerò etiã ualentiores motus tolerant, ita ut equitare iam assuescant.

Gal. de tuen.  
sanit. cap. 4.

INFINITUM

TERRE TERRE

PIRELLA

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

INFINITUM

OMNI



OMNIBONI FERRARI  
MEDICI AC PHILOSOPHI  
DE ARTE MEDICA  
INFANTIVM.

LIBER TERTIVS.

PRAEFATIO

Auc.lib.1.F.  
3.doc.1.c.3.



**I**N CURANDIS infantium lactetium morbis, pro qualibet curatione obseruare operæ pretium est. Primum ut nutrix rectè regatur, ut si in ea aliqua repletio ex quatuor humoribus superabundauerit, statim adhibita distinctione, secundum qualitatem eorum abundantiam, minuatur, et propria euacuatione tollatur. Et si oportuerit medicinam solutiua ipsi exhibere nutrici, tunc per diem naturalem, alia nutrix lactet infansem. Præterea semper, (nisi aliud indicetur) euitanda erunt pharmaca solutiua. Ex ipsis, n. facile extinguitur, uel exterminatur lac. Nutrices igitur, & infantes ipsi, quoad eius fieri poterit, curari debent cum his quæ comeduntur, & bibuntur. Nec non animaduer-

Gal.lib. 3. de  
simpl. med.  
facul. cap. 21

animaduertendum est, quòd infātes ipsi, propter uirium imbecillitatem, non possunt tolerare medicamenta, tam intrinsecus, quàm extrinsecus ualde alterantia, & euacuantia; nec sanguinis missionē ante pubertatem. Studiosi postremo animaduertant, ut si quispiam morbus, necessario, primò, post ortus eius afficiat infātem; nihilominus nō ab ipso incipere curationem constituimus. Sed primo ab ægritudinibus capitatis, ut à sede animæ rationalis initium fiat, & methodicè agatur. Postea de omnibus morbis, infantibus ipsis contingētibus, quos uel ab auctoribus approbatis græcis, aut Arabibus, aut Latinis, uel aliunde collegimus, & experti sumus per singulas partes corporis, gradatim descendendo examinabimus, & proposito quolibet morbo, quis affectus præter naturam sit inuestigabimus, & quibus signis, & ipse, & eius causæ cognoscantur declarabimus; mox & eius morbi prognostica, & propriam curationem, secundum methodum, & doctrinam rationalem, scribere tentabimus.

Gal. lib. 11.  
met. medic.  
cap. 14.

## DE NATURA INFANTIVM.

De Hippocrate CAP. I.

De Galieno CAP. I.

**A**NTEQVAM Curationem morborum infantium scribere aggrediar, prius de natura ipsorū, tanquā de subiecto istius artis, aliquid diserere rationi cōsonum est, quæ in duas partes diuiditur. Quarum una est cū membra ipsius infantis, nondū ad motiones, & ad ambulandū sunt apta, de qua ut plurimum à nobis in hoc opere pertractare statutum est. Altera uerò est, post ambulationem, & antè

Auic. lib. 1.  
F. 1. doc. 3.  
cap. 3.

Gal lib. 8. de  
Hip. & Plat.  
decretis c. 6.

Hip. lib. de  
matura hu-  
mana cōm.

corporis robur, quando nondum dentes ceciderint, & nati fue-  
rint. In prima, ille, qui est uocatur infans, id est, qui non-  
dum fari cœpit. In secunda uerò puer, quoniam purus est, &  
nondum ad pubertatis annos peruenit. Et natura eorum  
habet eandem rationem in ætatibus, quàm uer. in quatuor  
temporibus, scilicet calida est, & humida. In infantia ma-  
gis, quàm in pueritia pituita abundat. Vere enim ineunte  
pituita adhuc in corpore uehemens manet. In pueritia uerò  
indies fit diminutio ipsius pituitæ, & calor, & sanguis au-  
gentur. Qui enim crescunt, plurimum habent calidi innati.  
In infantia, quæ perficitur, ut plurimum per biennium den-  
tes generantur, et hactenus cùm ratione caruerint, tunc loqui,  
& cum aliqua ratione dignoscere incipiunt. Attamen ad-  
huc eorum corpora mollia, & fluxibilia sunt. In pueritia au-  
tem, de qua nunc loquimur, quæ est inter dentium generatio-  
nem, & mutationem, & extenditur usque ad septimum an-  
num, quoniam de ea, quæ extenditur usque ad tertium deci-  
mum annum, nunc uerba non sum facturus, disciplinæ capa-  
ces aliquo modo fieri incipiunt: potius in fine, quàm in principio.  
Etenim imbecillis adhuc in ipsis ratio est, & eorum osium  
natura potius cærea, quàm lapidea uidetur, & eorum pulsus  
creberrimus est, propter abundantiam caloris innati, unde cor  
frequenti refrigeratione aeris indiget, sed propter angustiam  
instrumentorum, minuitur ipsa refrigeratio, ex qua angu-  
stia, uox etiam redditur in ipsis acuta. At natura,  
siue temperamentum eorum adeo temperatum est, ut in-  
fantes, ipsi facilius, quàm adulti, (sicuti ego longa ex-  
perientia didici) maximas ægritudines tolerare uideantur,

& præcipue qui lacte nutriuntur: Et cum cibi non sunt expertes sæpè ex diuturnis, & grauisimis morbis euadunt, & conualescunt. Vnde PAULVS DIONISIVS Clarissimus Medicus Veronensis à quo carminibus elegantissimis, & elegiacis de natura oculi, methodus curandi ulcera, & Hippocratis aphorismi sæliciter, & doctissime explicati sunt, in actu practico se uidisse mihi dixit quendam infantem annorum duorum, filium cuiusdam sui uicini, oculis clausis, pulsu, & motu ex grauisima febre destitutum, qui postea è morbo conualuit. Et si infantes ipsi uoraces sunt, multum lactis trahentes non pro ratione carnosifunt. Et si multum mingunt minimè anniculi fiunt. Et qui plus mingunt, quàm egerunt, pro ratione pinguiorès sunt. Qui bene dormiunt, & pinguiorès sunt, multum alimentum adsumunt, idq; adiacet, non sufficienter distributū, quibus infantibus insugendo lac rursus instat, uuam maiorem habere solent.

Hip. de dentit.

DE MORBO DENTITIS. CAP. VII.

CAP. VII.

ET SI de hoc morbo antiqui nihil sub isto nomine scripserunt, intelligentes forsan ipsum, ut Galenus sub psydriacij, aut achorum, & ut Auicenna sub sahafati nominibus cõprehendi, nihilominus, quia à recentioribus, ut Manardus in suis epistolis ait, ut Gulielmus de Saliceto in empirica, & ex consuetudine, omnes mulieres lactis impuritatem hac affectio sequi putatur, ut facilius dignosci ualeat, sub

Gal. lib. 1. de comp. medi. sec. loc. c. 9.  
Auic. lib. 4. F. 7. trac. 3. c. 1.

nomi

DE DEFIN.  
MORBI.Auc. ibidē.  
CAUSA.  
SIGNA.PROGNO-  
STICA.  
Auc. ibid.VICTVS  
RATIO.Auc. lib. 1.  
F. 3. doc. 1.  
cap. 3.

nomine ipso curationem scribendam duxi sequens auctori-  
tatem ipsius de saliceto, qui præter achoras, etiam sub nomi-  
ne lactucij, aut lactuminis, de morbo ipso scripsit. Qui nihil  
aliud est, quam saniosa crusta colore albicans, qua ut pluri-  
mum in principio lactationis, caput, facies, & aliquando uni-  
uersū corpus infantis cooperitur; propterea lactea crusta uoca-  
tur, græco uerò uocabulo γαλακτικός πλάξ, & causam trahit ab  
humiditate acuta, salsa et corrosiua, à qua sumitur indicatio  
& permiscetur sanguini, prout signa ex asperitate, colore,  
& tenacitate ipsius crustæ indicabūt. Et si oculos crusta ipsa  
non ledit, & non dehonestat, & cū ut plurimū in Hyemē  
appareat, prædicendum est cū ipso Auicenna morbū ipsum  
esse facilis, & uelocis curationis. Quapropter in uictus ratio-  
ne aer eligatur, ad siccum, & frigidum uergens, exerceat se  
nutrix manē, & serò per horam antè cibum quotidie, secun-  
dum consuetudinem, aluus deijciat, uel sponte, uel arte,  
clysterijs communibus, & in infante, si non deijciat soluēda  
est hoc pacto, detur ei parū mellis, aut terebinthinæ, ad quā-  
titatem unius ciceris; Nec non caueat ipsa nutrix à diurno  
somno, & precipuè à prandio. In cibo preterea caueat à sal-  
sis, ab omnibus oleribus, præter lactucam, endiuia, aceto-  
sam, spinachiam, & atriplicem, caueat ab alijs, capis, porris,  
raphanis, & leguminibus, à caseosis, à pulmentis, ab aroma-  
tibus, et carnis bubulis, suillis, & ouillis, & ab omnibus ijs, quæ  
sunt difficilis concoctionis, & mali succi, & perturbationes  
animæ vitet. Comedat in cibo panem benè subactum, fermē-  
tatum, & satiscoctū, carnes vitulorum, hædorum, verue-  
cum, & pullorum, gallinaceorum, & auium terrestrium, &  
simi

similium, bibat uinum subnigrum, astringens, & paucarum uirium, & aqua temperatum. Pro curatione uerò ad præscriptas affectiones, conuenienti uictus ratione uti oportet, corporisq; ac capitis purgationem adhibere per pilulas ex aloë. Propterea nutrix per tres, aut quatuor dies continuos capiat pilulã unam sequentem, per horam ante cœnam. R. pilularũ de hiera cum agarico de aloë, an. gran. 12. & cum melle rosato reformetur p. i. & in auretur. Postea si crusta in infante sicca sunt, abluantur aqua simplici rosacea, aut oleo rosaceo, uel R. unguenti rosati, Mesue, unguenti albi, infri-gidantis Gal. an. ꝑnc. s. misce, & inunge, uel R. aqua plan-taginis, semper uiua, florum chamæmeli, rosacea an. par-tes æquales, misce, & ablue. Si uerò humidior fuerit ipsa crusta, tunc conuenit adiantum cum rosaceo illitum, aut fœnugræci decoctũ adfrictum, aut malua cum farina ordea-cea, pro cataplasmate imposita, aut melilotum cum farina fœnugræci ex uino impositum, & cicerum decocto, ipsumq; ci-cer decoctum impositum, nuces amare, commanse, & illitæ præstant. Sed si crusta ipsa tetigerit oculos, tunc animaduer-tendum est, ne oculos ipsos lædat, & lucem impediat. Vnde R. lactis optimi aliæ nutriticis, aqua rosacea an. ꝑnc. i. misce & oculos ipsos inunge, uel ablue.

MEDICA-  
MEN. RÂ-  
TIO.  
Gal. lib. 2. de  
comp. med  
secund. loc.  
cap. 9.

Gal. ibidem.

## DE ERYSIPELATE

### CAP. III.

**I**NFLAMMATIONIS Nonnulla sunt species, & differentia, inter quas, ea quam Græci εἰσωσθηδὴς & Latini

DEFINIT.  
MORBI.  
Gal lib. 2. ad  
Glauc. cap. 4

CAUSA.

SIGNA.

Paul. eg. lib.  
4. cap. 11.  
PRŒGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

Gal. lib. 13.  
met. med. c. 8  
MEDICA-  
MENT. RA-  
TIO.

Latini ignem sacrum uocant, numeratur, quæ nihil aliud est, quam ex sanguine, & flaua bile, calidioribus, quàm oportet, mixta fluxio, uel ex sanguine quidem, sed feruescente, & tenuissimo, secundum substantiam, de qua, & præcipue de ea, quæ capiti infantis accidit, hoc capite agere decreuimus; causam ut plurimum trahente à mala uictus ratione nutricis præterita. Et signa sumuntur aliquandò ex febre, sed semper ex ipsa affecta parte, quæ enim colore rubra, tactu calida, & tumefacta esse percipitur, et tactu sanguis ipsius partis facile subterfugit, & rursus illabitur. Quapropter ignorandum non est erysipelata, quæ caput inuadunt esse difficilis curationis, proinde nisi efficaciore subueniatur adminiculo, languentes interdum suffocant. Igitur uictus ratio nutrici instituenda est, declinans ad frigidum, & humidum, tam in ære, quàm in alijs rebus, non naturalibus, ab exercitatione uacet, somni sint solito breuiores, quotidie aluus deijciat, uel sponte, uel arte, tam in nutrice, quàm in infante. Caueat nutrix à uino, à cibis salsis, ab aromatibus, ab alijs, à cæpis, à porris, à raphano, ab oleribus, & seminibus calidis, & uaporosis, à leguminibus, à carnibus crassioribus, à fructibus fugacibus, quoniam facili putrescunt, & conuertuntur in bilem. Bibat aquam cum ordeo coctam, uel iura carniū, comedat carnes pullorum, gallinaceorum, uitulorum, hædorum, ueruecum, et auium terrestrium, & similia; inter olera comedere poterit lactucam, blitum, spinachiam, maluam, endiuiam, atriplicem, & acetosam. Inter fructus, poma, & pyra cocta. Curatio uerò, ut ostendit indicatio, refrigeratione perficitur, nam in erysipelate refrigerationis indicatio magis urget, quàm uacuatio



nis, cum ijs, quæ influentem materiam calidam ui frigoris re-  
 tundunt. Nihilominus si lac nutricis erit causa ipsius mor-  
 bi, tunc nutrici exhibeatur bolus hic casie, hora una ante ci-  
 bum; R. casie extractæ drac. viij. s. diacatholicon drac. ij. s.  
 misce, & cum saccharo f. b. & eo die, in quo sumit cassiam,  
 alia nutrix lactet infantem, Verum si alius, in infante astri-  
 cta sit (prout sæpe propter febrem contigit) suppositorium ex  
 melle, & hiera, & sale factum imposito, uel fiat clyster hoc  
 modo. R. maluarum, matrû uolarum, mercurialis, bliti, an.  
 M. i. bulliant omnia in s. q. aquæ ad consumptionem tertiæ  
 partis. Postea coletur, ex qua colatura. R. ꝑnc. vi. uel  
 octo, secundum ætatem, olei uiolati ꝑnc. ij. mellis rosati ꝑnc.  
 i. uitelli unius oui, sacchari ꝑnc. s. salis drac. s. misceantur  
 omnia simul, postea uesica porcina imponantur, & cum pen-  
 na anseris, ab utraq; parte incisa, & una parte collo ipsius ue-  
 sicæ adalligata, fiat clyster: uel alius soluenda est. prout à no-  
 bis in præcedenti capite, auctoritate Auicennæ, declaratum  
 est, cum terebinthina, aut melle, deinde ad localia, & auxi-  
 lia materiam fluentem reprimentia, deueniendum est.  
 Quapropter R. succi solatri, semper uiuæ, portulacæ, lactu-  
 cæ, plantaginis, psyllij, aquæ rosacæ, an. partes æquales misce,  
 postea panniculi linei in ipsis succis madefacti superponantur  
 loco affecto: uel R. infrigidantis galeni ꝑnc. s. unguenti albi  
 drag. ij. camphoræ puluerizatæ. scrup. s. aceti albi, olei rosa-  
 ti, omphacini an. ꝑnc. s. unguenti rosati, Mes. aquæ rosacæ,  
 an. drag. i. s. misce, & omnia in mortario plumbeo benè du-  
 cantur, & s. a. fiat linimentum, uel R. albuminis unius oui  
 lithargyrj, subtilissime contriti drac. ij. unguenti rosati mes.

Gal. lib. 1. de  
simpl. med.  
fac. cap. 6.

Gal. lib. 14.  
met. med. c. 3.

unc. 5. aceti drac. iij. aqua rosaceæ drac. i. 3. misce. & simul  
omnia conquassentur. & panniculi infusi applicentur loco af-  
fecto, et sæpè reiterentur, uel sic ceratum humidum ex aqua  
frigida subactum, accurateq; madefactum calido affectui im-  
ponas, protinus. n. frigefacies, sed frigefacere oportet, quousq;  
color ruber mutetur. Etenim quod exquisitum, & purum  
Erysipelas est, statim hoc facto quiescit.

### DE HERPETE EXQUISITA.

DEFIN.  
MOREI.

Gallib. 2. ad  
Glauc. c. 11.

CAUSAE.

SIGNA.

PROGNO-  
STICA.

Gallib. 14.  
met. med. ca.  
17.

VI CTVS  
RATIO.

MEDICA-  
MENT. RA-  
TIO.

**S**I Flaua bilis sola & exquisita, & non alio coniuncta hu-  
more infantis, aliqua capitis, uel alterius membri pars af-  
ficiatur, morbus sit, qui à Græcis *εἰς ἡν*, & à latinis simpli-  
citer sine additione Herpes uocatur, & cum affectio ipsa ge-  
neretur ex ipsa flaua bile exsiccata, uel à mala uictus ratione  
præterita, uel ab aere ambiente, uel à prædominio: signa erunt  
pustula colore citrino, & forma rotunda, quæ ueluti serpentes  
serpendo egrediuntur. Et quia affectio hæc prouenit, ut di-  
ctum est, à materia calida, & differt ab erysipelate humoris  
tenuitate, quoniam est admodum tenuis, qui herpetem exci-  
tat, propterea à ea uictus ratio conuenit, quæ ad frigidum, &  
humidum nergit, ueluti descripta est præcedenti capite de ery-  
sipelate, ad quod redeat, si quis scire uult. Deinde prius nutri-  
cis corpore purgato aliquo medicamento, quod flauam edu-  
cat bilem, à qua sumitur indicatio istius morbi, quem admo-  
dum descriptum est capite præcedenti, ad residuum ipsius cu-  
rationis deueniendum est, quod perficitur ijs, quæ si particule

laborati imponuntur influentem humorem ipsum reprimunt,  
 & repellunt, sed antequam localia applicentur, hic diligenter  
 animaduertendum est, si infans est in etate annorum duorum,  
 uel circa, hac enim etate tuto exhibere ipsi infanti poteris reu-  
 barbarum exigua quantitate, & si opus fuerit, R. reubarba-  
 ri electi, & mundi, gran. xv. spice gran. ij. infundantur per  
 horas octo in iure pulli, postea fiat fortis expressio, cui adde sac-  
 chari optimi drac. iij. predicti iuris q. s. misce, & f. p. & detur  
 infanti per horas quinque ante cibum, mane; uel R. reubarbari ele-  
 cti, & mundi, contriti gran. xv. sacchari rosati ꝛnc. s. mi-  
 sce, & f. b. At si infans ratione etatis, aut pharmaci qualita-  
 te, ea suscipere non ualeat, sufficiat tibi, uel cum sero lactis, uel  
 cum pauco puluere reubarbari, in iure pulli, uel cum pasculis,  
 cum ipso reubarbaro preparatis, uel cum emulsione lactis, nutri-  
 cis eo die, in quo ipsa nutrix holum cassie sumpsit, uentrem  
 aliquo modo soluisse, uel urinam, cum seminibus melonum,  
 ordei, & similibus citasse. Nam in herpete uero, quoniam te-  
 nuis humor est, qui id uitium creat, abunde est etiam aluum  
 leuiter soluisse, uel urinas pro ea, quæ id modice efficiunt, ci-  
 tasse. Mox ad localia deueniendum est, ut R. capreolo-  
 rum uitis, plantaginis, foliorum rubi, portulacæ an. M. s.  
 incidantur grosso modo, deinde bulliant omnia in s. q. aquæ,  
 postea contundantur, quibus adde olei rosati omphacini, re-  
 sinæ an. ꝛnc. s. farina ordei, unguenti rosati Mesue, an. ꝛnc.  
 s. misce, & fiat cataplasma, & loco affecto, prius abrafo, si  
 est in capite, & succo arantiarum abluto, apponito, & rei-  
 teretur, uel R. olei rosati omphacini ꝛnc. ij. sulphuris ni-  
 gri drac. iij. misce, & mortario plumbeo bene ducantur, &

Gal. lib. 14.  
 med. cap. 17.

simul immisceantur, & adde unguēti in frigidantis gal. vnc. i. misce, & s. a. fiat linimentum, & adhibeatur; uel R. mellis vnc. i. aquæ quæ è uitis caudice, sua sponte, aut ignis u. expressus exsudat. vnc. ij. misce, & inungito.

## DE HERPETE EXEDENTE.

### CAP. V.

Gal. lib. 3. ad  
Glauc. c. 2.

CAUSA.

SIGNA.  
PROGNO-  
STICA.

Gal. lib. 14.  
met. medic.  
cap. 17.

**A**FFECTIO. Quæ herpes exedens a Latinis, & a Græcis <sup>ἐξέδων</sup> uocatur differt ab herpete exquisita, nam exquisita a tenui, & ipsa a crassiori, & acriori bile ortū ducit, nec non differt etiā alio modo, Exquisita. n. per cutē tātūmodo afficit, excedens uerò & cutem, & subcutaneam carnem ulcerat, & exedit, à qua differentia, cum nomen sit consequens rei, denominatur excedens, causa tām in exedente, quam in exquisita communis est, scilicet bilis flaua, at in hoc morbo crassior est, et acrior, signa manifesta sunt, propter exulceratā cutem, & carnem, sed ulcera ipsa, & postula, cum interdum sint profundiores, diuturniores etiā fiunt, & si sanantur, sine totius corporis purgatione, denuò renascuntur, uel ad bubonem ducuntur, ut exemplo citato per Galenum manifestè apparent, ubi dicit, Romæ mulier quædam illustris, cum herpetem in malleolo haberet, primum quidem medicamento, quod algam recipit, est usa, hoc cum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, uelut ex desquamatis, cui, cum deinde superpositum medicamentum est, rursus illi continua est exulcerata, idq. ita assidue perrexit, donec ad genu exulceratio perueniret, cum inrerim quiduis

quiduis potius pati, quàm medicamento, quòd bilem traheret, purgari uellet. Itaq; etiam, quod fieri in talibus assuevit, quoniam pleriq; culpant nò culpanda, damnato ex alga medicamento, aliud admoueri iussit, deinceps igitur eo, quod ex san-dice componitur, utebatur, ut uerò id quoq; quod exulceratum iam fuerat, sanauit, quod uerò nunc exulcerabatur non inhibuit, sed iam ad bubones, usq; uitium accenderat, ipsa necessitate coacta, serũ se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur clanculum minimum scationie inuitam purgaui-mus, ac sanauimus. A quo excitati exemplo, laudamus, antequam ad localia deueniatur, ut corpora, tam nutricis, quàm infantis modo, & forma, qua declaratum est, capite precedenti, de exquisita, purgètur. Præterea uictus ratio nutrici præscribenda est, prout capite de crysipelate dictum est, exceptis fructibus, & oleribus omnibus, quoniam propter cras-sitiem, & acrimoniam ipsius materie, peccantis ab ijs, quæ simul cum humiditate infrigidant, cauendum est. Et ad eundem modum obseruandum in curatione, quippè hic mor-bus ea non fert medicamenta, quæ præter id, quod refrigerat, etiam humectant, sed sola admittit refrigerantia, quæ etiam ualde exsiccant, ueluti *R. florum malorum punicorum M. i. galle utriusq; drac. iij. mirrhæ, thuris, aloes an. drac. i. alu-minis fissi, radicis, aristolochiæ rotundæ, an. drac. ij. calamin-thæ drac. s. conterenda conterantur, postea addè unguenti ro-sati, mesuæ, ꝛnc. i. aquæ mellis q. s. misce, et in mortario be-nè ducantur. s. a. ad formam linimenti, uel *R. pulueris bo-liarmeni orientalis, terræ lemnie an. drac. ij. aquæ rosacæ, aceti an. drac. iij. albuminis unius oui, omnia simul in morta-**

PURGA-TIO.

VICTUS RATIO.

MEDICA-MEN. RA-TIO.

Paul. 1. lib.  
14. cap. 20.

Gall. lib. 14.  
met. med. ca.  
17.

SVTCIV  
VLTAR

riò benè agitentur, postea panniculos madefactos in dicto li-  
nimento loco affecto superpone, & sæpe reiteretur, uel R. se-  
minis lini arefacti, & in puluerem resoluti, lana ueteris suc-  
cida, & illotæ in olla prius combusta, mox in puluerem resolu-  
ta an. unc. s. uini astringentis, & aquæ rosacæ an. q. s. ad dis-  
soluendum misce, & pluma bis, uel ter in die madefacta in  
prædicto liquore illiniatur locus affectus, uel cretam cimoliæ,  
folani succo dilutam inungito, uel spumæ argenti trientem, &  
porri cremoris cyathos septem, betæq; succi tantundem leui-  
gata, illimito. Vel medicamentum, quod ex sandice compo-  
nitur, apponito.

DE HERPETE MILIARI.  
CAP. VI.

**E**TSI quædam istorum herpetum genera magis in alijs  
partibus corporis, quàm in capite accidunt, & ut pluri-  
mum contingant; nihilominus ut omnes earum curationes, si-  
mil inueniri possint, hic de omnibus pertractare decreui singu-  
las ordine descripturus Miliaris. Igitur herpes est ægritudo,  
quæ à græcis uocatur *εἰρησ*, quoniã habet similitu-  
dinẽ milij, & ueluti Centhris serpentis serpere uidetur, oritur  
tamen ab ipsa bile flaua, quæ parum cum pituita habet admi-  
stionis. Vacuabis namq; inquit Galenus eum, qui redundat  
humorem; ceterum aliquandò medicamento, quod flauã pur-  
gat bilem, sæpe eo, quod nigram, modo eo, quod mista est fa-  
cultatis, quod scilicet bilem simul, & pituitam educat, uelut  
in alio herpetum genere, quem à similitudine, quam ha-  
bet

DEFINIT.  
MORBI.

CAUSA.

Gal. 14. met.  
med. cap. 17.

bet cum milio, cenchriam Græci appellant. Quippè is non  
 protinus ulcus facit, quemadmodum alter, sed admodum exi-  
 guas pustulas ad speciem milij, quæ ipsæ interposito spatio in  
 ulcus conuertuntur, adeo non sine ratione, quibusdam visum  
 est, in eiusmodi uitio bili esse aliquid pituitæ admistum, unde  
 perficitur indicatio. Propterea cum pustula ipsæ abeunt in  
 ulcus morbus fit diuturnior, & si curetur antequam fiat ul-  
 cus, à principio, citò curatur. Nutrici igitur, & infanti, si per  
 ætatem licet, uictus ratio eodem modo, quo in capite de erysipe-  
 late statutum est, instituat. Iniungendum uerò, & conco-  
 quendum est in ferculis semper parum mentæ, petroselin, aut  
 fœniculi, & cauendum est a fructibus, & ab alijs in frigidan-  
 tibus oleribus. Nam in herpete, in superficie hærente mitis-  
 sima adhibeamus, miliaribus uerò magis discussoria. Qua-  
 re neq; lactucam, neq; semperuium, neq; quicquam aliud re-  
 frigerans adhibemus; Attamen bibere poterit aquam co-  
 ctam, cum cinamomo, aut seminibus coriandrorum, uel iu-  
 ra carniū. Quæ uerò pertinent ad curationem, nunc absol-  
 uenda sunt. In primis à nutrice medicamento, quod mista  
 est facultatis, utendum est, scilicet, quod bilem simul, & pi-  
 tuitam educat; Quapropter per horam unam ante cibum,  
 sumat bolum istum, R. electuarij lenitiui, diacatholicon an-  
 drac. v. agarici preparati drac. ij. misce, & cum saccharo f. b.  
 uel R. syrupi rosati solutiui ꝑnc. iij. s. agarici preparati drac. ij.  
 aquæ cichoreæ q. s. ad dissoluendum misce, & f. p. postea per  
 dies quinque, quotidie mane, sumat syrupum hunc, R. syrupi  
 acetosi simplicis ꝑnc. i. oxymellis simpl. ꝑnc. s. aquarum en-  
 diuæ, cichoreæ, boraginis, an. ꝑnc. i. misce pro uno syrupo, &  
 sic

SIGNA.

PROGNO-  
STICA.VICTVS  
RATIO.Actius lib  
14. cap. 60.2177A  
od. 952.42RATIO  
MEDICA-  
MEN.

Galibid.



sic pro alijs, deinde sumptis quinq; syrupis, herpete adhuc per-  
 seuerante, sumat in sequenti die in diluculo per horas sex an-  
 te cibum, infrascripta medicinam, R. reubarbari electi, &  
 mundi drac. i. spice grana iij. infundatur reubarb. s. a. in ui-  
 no albo per horas octo, postea f. fortis expressio, cui adde syru-  
 pi rosati solutiu i unc. iij. agarici preparati drac. i. s. decoctio-  
 nis florum, & fructuum cordialium q. s. ad dissoluendum mi-  
 sce, & fiat p. uel alio modo in forma pilularum, R. pilularu  
 ex agarico, mesue scrup. ij. s. ex rabarbaro agregatiuarum an.  
 scrup. i. misce, & reformetur, cum syrupo uiolato p. v. & inau-  
 rentur. At eo die, quo sumit medicinam solutiuam, ut di-  
 ctum est a principio, non lactet infantem. Verum si infans  
 sit annorum duorum, uel circa, tuto exhibere ei poterit rabar-  
 barum eo modo, quo declarauimus capite precedenti, uel drac.  
 i. agarici preparati cum panatella, aut saccharo rosato, ad-  
 misti per horas tres ante prandium. Ultimo loco, corpore sic  
 prius purgato, mox ea, quae influentem humorem reprimunt,  
 & exsiccant, loco affecto infantis imponenda sunt. Nam  
 in principio facta purgatione, pampinos uitis, rubiq;, aut poly-  
 goni, aut plantaginis folia imponemus. Postea uero his  
 etiam lenticulam, & mel, & polentam miscebimus. Prae-  
 terea R. pulueris acatie, myrrhae, thuris, sulpharis an. drac. ij.  
 & cum succo plantaginis q. s. ad incorporandum in mortario  
 plumbeo, misce donec reducatur ad formam linimenti, & ex  
 eo saepe in die pars affecta liniatur, uel R. sandalorum, corti-  
 cum granatorum, boli armeni orientalis an. drac. ij. mace-  
 rentur omnia per horas octo, in s. q. aceti albi, postea ab aceto  
 separentur, & in mortario plumbeo, bene agitentur, & con-  
 tundan

Actius lib.  
14. cap. 60.

OTAR  
RATO  
MEDIC  
-A. MEN

ADU. LO



tundantur, & adde aqua rosacea q. s. misce, & f. linimentū,  
de quo sape, cum penna illine. Vel R. plumbi recrementi,  
floris eris, sulphuris, citrini adusti. an. drac. ij. conterantur  
omnia, postea adde succi baccarum myrti unc. s. uini astring-  
gentis, q. s. ad immiscendum misce, & in mortario s. a. fiat  
linimentum, & ulcere conatibani da crube theatrop. oil. x. m.

bididira

OTTA R  
ADICEM  
NAM

D E M A C H O R I B V S.

C A P I T V L V I I I.

**C**um Vnde scuta quaedam in capitis cute infantis acci-  
dunt, ex quibus continae fluit viscida, & glutinosa sa-  
nies, & valde tenuibus foraminibus eroduntur, graece αχoges,  
& latine teste Plinio manantia ulcera, & a nonnullis etiam  
à tinearum in uestibus similitudine, dicuntur tineae. Causa  
istius affectionis, est nitrosa & salsa pituita, sententia quidem  
mea est, mistio humoris biliosi, cum ipsa pituita, id quod ma-  
nifeste apparet ex ipsorum ulcusculorum colore croceo,  
& viridi, & pruritu mordicantium, scalpendiq; ardorem in-  
citantium. Et si statim non curetur hic morbus, cum inue-  
teratus fuerit, in deciduum capillitium currit, & in alopecia,  
& ophiasim, & ad exulcerationem in cute usq; ad carnem fa-  
cile uertitur. Propterea statim ad curationem properandū  
est. Et quod attinet ad victus rationem, aer ad siccum, &  
frigidum potius declinans eligatur, Nutrix solis, & ignis  
estus euitet, in cibo omnia acria, acetosa, salsa, et omnia, quae  
facile conuertuntur in bilem, ut olera, & fructus omnes, &  
praecipue fugaces, & dimittat omne, quod habet dulcedinem

DEFIN.  
MORBI.  
Gal. lib. 1. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 8.

CAUSA.  
Paul. egid.  
lib. 3. cap. 3.  
SIGNA.

PROGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

Auic. lib. 4.  
F. 7. trac. 3. c.  
2.  
Paul. ibidem

L super

Auicibid.

superfluam, aut amaritudinē, aut acuitatem. & utatur me-  
lioris succi cibo, & facilis concoctionis, & insipido sit conten-  
ta; Exercitationi incumbat assuetæ, somni solito breuiores  
sint, & diurnum post cibum omninò euitet, quotidie aluus a

RATIO.  
MEDICA-  
MEN.

facibus, uel sponte, uel clysterē communi purgetur: Curā diue-  
rò ratio, quemadmodum ab indicatione istius morbi sumitur  
exsiccatione, discussione, & refrigeratione perficitur, hoc pa-  
cto per horam unam antè cibum nutritrix sumat, uel bolum,

Gal. ibidem

uel potionem descriptam in præcedenti capite, de herpete mi-  
liari, & si etiam influat amplius humor, prohibendus primū  
est ipsorum influxus per capitis euacuationem, atq; potius cor-  
poris purgationem, modo, quo in præcedēti capite, à nobis de-  
scriptum est. At uerò si parua affectio existat, sola localia,

& partialia appellata remedia, citra totius corporis euacua-  
tionem suffecerint. sed hoc intellige, aut in nutrice, aut in a-

dultis: Purgatio enim in infantibus, ut à principio dictum  
est, ualde timenda est. Verum si infans erit ætatis annorum

duorum, uel ultra, non absurdum erit ei exhibere rabarbari.

electi, contriti, scrup. s. uel cum iure pulli, uel cum saccharo

rosato, aut cum passulis s. a. præparati, uel agarici præparati

drac. i. cum saccharo rosato; sed antequā ad localia deuenias,

prius capilli abrafo capite, tollantur, postea bis, aut ter ex li-

xiuio calido, in quo prius ebullita sit myrtus, aut rubus, aut

lens, aut lupini amari, aut asparagi radix, aut bryoniæ, locum

affectum ablue, & fove, Mox R. succi baccarum myrti, fo-

liorum rubi, plantaginis, salicis, & polygoni an. ꝑ. unc. s. misce,

& illine; Et omnia quæ facultate sua incidant, discutiant,  
& repellant, conueniunt, uelut est acetum, quod exquisi-

re acidum sit, in quo nulla penitus vini qualitas appareat. Hoc ipso sanè, pharmaca, metallica, appellata, modo hoc, modo aliud imbues, achoribusq; ex eis medeberis. Sed animaduertendum, quòd semper à leuioribus, & imbecillioribus incipere præstat; præsertim in infantibus, & cum dolor simul in ipsis achoribus adest. Rectè enim Galenus inquit, Apollonius in primo de parabilibus, ad achoras sic scripsit. Rosaceo oleo caput illine; deinde post hoc betæ succum similiter illine. Tertio deinceps testudinis sanguinem eodem modo adhibe. Quartò laurino oleo caput illine; Et quinto crocino unguento inunge. Ex his sanè primum debilissimum est pueris, & mulierculis teneræ carnis in principio affectionis utile existens; concoquit enim, & discutit, ac moderatè repellit; at uero testudinis sanguis, curiosum, & superuacaneum est pharmacum; Laurinum autem fortiter calefacit, & discutit, opusq; habet corporis totius, & capitis euacuatione, quo discutiat humores, achoras facientes. Ego uerò sæpè expertus sum subscriptum unguentum, quo nonnullos infantes curauim, inungendo tantummodò ac tertio die in tertium achoras ipsis, R. pulueris rosarū, pulueris bryoniæ, fimi colūbini, æris uiridis. sulphuris an. drac. ij. olei iūiperi q. s. misce, et omnia simul in mortario benè terātur, donec reducātur ad formam unguenti. Prodest etiam sænigræci decoctū affricitū, malua cum uino, & farina ordacea subacta. Itē melilotū cū farina sænigræci, & uino impositū. Verūm si sanies ex ipsis achoribus, ualdè adhuc abūdauerit, tūc R. terræ lēniæ, cimoliæ, et samie, pōpholygis, spodij, spumæ argēti, cadmiæ an. dr. i. terātur oīa subtilissimè, postea adde olei rosacei omphacini q. s. misce, et

diffinitio A.  
et. q. d. p.

Gal. libid. cir  
ca med.

AC. 13  
A. 12

BR. 13  
A. 12

JO. 13  
A. 12

Aetius lib.  
4. cap. 22.

illinc. vel R. spuma argenti, ceruse utriusq. bessem. seminis  
erice, thuris, utriusq. drac. iij. uino, & oleo raphanino terito,  
ac utere. Vel R. acacie fulue unc. i. laudani trientem,  
mirrhæ, sextantē opij drac. i. aqua palustri excipe, & forma  
pastillos, & utere assidue, quod si ex his morbus non quiescat,  
medicamentum ex charta siccum, aceto dilutum, illinendū,  
uel ex sola charta exusta, & aceto diluta, illinendum.

DEFINIT.  
MORBI.

**Q**UIDAM Morbus etiam in infantibus inuenitur  
achori similis, maioribus tamen faraminibus, in qui-  
bus sanies mellis similis instar faui continetur, propterea à la-  
tinis cerium, seu fauum dicitur, Greci uerò χηγανον uocant.  
Causa istius affectionis, una cum achoribus est. Signa circa  
ulcera, hoc modo, innotescunt; squammæ apparent, cum im-  
menso pruritu, & quod fluit instar mellis est. Et pars progno-  
stica habet eandem rationem, quam ea, quæ ex achoribus de-  
clarata est. Curatio etiam similis est, nihilominus caput de-  
radendum, & ex decocto maioranæ, chamæmeli, mentastri,  
stachados, & thymbræ, quotidie abluendum est, postea cum  
unguento hic descripto inungendum. R. lithargyrj, ceruse, an-  
unc. s. sulphuris, hydrargiri an. drac. ij. olei rosacei, drac. iij.  
aceti drac. ij. omnia simul in mortario commisceatur, donec  
suscipiant formam unguentis, quo bis in die, mane, et sero post  
supra scriptam ablutionem inungatur.

CAUSA  
SIGNA.

PROGNO-  
STICA.

RATIO  
MEDICA-  
MEN.

archibonitau non dicitur. Et tunc non est. Ma bonitau qui oitau  
 in. uocauit. h. uocauit. C A P. VIII. tunc h. uocauit. uocauit.

**S**ed Achores, aut faui male, aut tardè curentur, aliquan-  
 do accidit infantibus morbus ille, qui dicitur tineæ, quem  
 etsi multi sub nomine ipsorum achorum à tinearum in ue-  
 stibus similitudine, etiam comprehendere arbitrantur, nihilomi-  
 nus, mea, quidem sententia, differt tineæ nostræ ab achoribus,  
 quia achores sunt capitis ulcera (ut capite proprio dictum est)  
 manantia, & tenuissimis foraminibus, cutem perforantia,  
 ex quibus sanies effluit glutinosa. Et tineæ non solum ul-  
 cerat, sed cum fetore, & crustis, & capillorum deciduo de-  
 turpat caput, & totum aspectum, Ex Græcis nullum uidi,  
 qui hoc nomine morbum ipsum descriptum habeat, forsan  
 sub achoribus eum cōplectentibus, ex Arabibus uerò Aui-  
 cenna (ni fallor) nomine sabasati sicci eundem explanauit;  
 Et Auenzoar duobus capitibus scripsit de tineæ, & de achoribus  
 humidis. Causa ut plurimum ab humore melancholico  
 originem trahit; stimulantibus aut excitantibus achoribus ip-  
 sis, aut mala uictus ratione, aut contagione. Signa satis no-  
 ta sunt, ut dictum est superius. Et quia tineæ ipsa dupliciter  
 diuiditur, Una, quæ est mitis, & recens, Altera uerò quæ est  
 antiqua contumax, & rebellis, quæ mitis, & recens est, facile  
 curatur, & contingere potest lac sugentibus infantibus; anti-  
 qua uerò cum sit difficilis curationis, & infantibus lacte alē-  
 dis haud quaquam contingat, nobis prætermittenda est, &  
 de mitiore agendum, quæ etiam nisi rectè curetur, sepe in le-  
 pram, & pediculorum abundantiam terminatur. Victus

DEFINIT.  
MORBI.

CAUSA.

SIGNA.

PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO

ratio

Auic. lib. 4.  
F. 7. trac. 3. c.  
8.

ratio instituenda est in omnibus sex rebus; non naturalibus, uergens potius ad humidum, & calidum, quàm ad siccum, et frigidum, ut morbi indicatio nobis ostendit; Nutrix uel infans, si quid comedit, omnia euitet, quæ dulcia sunt, quales dactyli, & omnia acria, acuta, salsa, crassa, & nimis calida. Comedat panem benè fermētātū, carnes uitulinas, hœdinas, & aues terrestres, cum pauco aceto paratas; Confert enim, ac acetum solum noxiū est. Bibat uinum album, tenue, & aquosum. Aluus quotidie deiciat, uel spontè, uel arte, ita ut dictum est, à principio, euitet uigilias noctis, somnū diurnum, & animi perturbationes, exercitationi incumbat.

RATIO.  
MEDICA-  
MENT.

Deinde causa curationis istius morbi in primis ad euacuationem materiæ peccantis deueniendum est. In nutrice igitur euacuanda est, cum exhibitione electuarij lenitiui, & reubarbari; & in infante, cum agarico, uel reubarbaro, eo modo, qui declaratus est in capite de achoribus, ad quod reuertatur. Postea sic peracta euacuatione, capilli in primis à capite auellantur, mox ex puluere nitro, & sepia an. ꝑ. unc. i. fricetur totum caput; Deinde de tertio in tertium, ex decocto in capite præcedēti descripto, abluatur, adeo ut una die, fricetur, & depiletur, & altera abluatur caput, & post eius exsiccationem oleo amygdalarum dulcium, aut nucum inunge, & si opus fuerit, cum fortioribus inungere, unguento descripto in capite præcedenti inungito.

## D E S Y R I A S I.

## C A P. X.

**C**IRCA Cerebrum, seu membranas ipsum cerebrum amplectentes, quarum, interior pia, exterior uero dura, mater uocatur, in infantibus oriri solet affectio, quæ à Plinio ardor capitis uocatur, & à Græcis *εγκεφαλις* nominatur, quamuis Aetius dicat, syriasm ipsam esse in infantibus partium cerebri, & membranarum inflammationem, & Auenenna morbum hunc erysipelatam esse arbitratus est, sed quomodocumque sit originem, seu causam trahit à bile flaua, ut indicant signa, quæ sunt sincipitis dolor, & inflammatio à cauitate cuius syriasis appellata est, *εγκεφαλον* enim græcè fossa, seu corpus cauum dicitur; Nec non inter signa etiam istius morbi inseparabilia sunt, oculorum cauitas, cum rubore, & pallor in facie, febris ardens, corporis siccitas, et prostratus appetitus. Et ut plurimum morbus ipse triduo interficere solet. Verum si temporis illius spatium superauerit, tunc salutis spem procul dubio habere poterit. Quibus enim cerebrum sphacelatum, id est corruptum est, iij. tribus pereunt diebus. Si uero hos euaserint, sani fiunt, et uelox in eo mors est, quia, et morbus grauisissimus, et pars principalis maxime est affecta. Curatio uero huius ægritudinis perficitur ea uictus ratione, purgatione, & medicamentorum localium administratione, quæ in capite de erysipelate fufius descripta est, ad quod se referat. Verumtamen si aliquid iniungere licet, fiat ut indicatio nobis ostendit, frigidis, et humidis, prout est succus melonis, citrulli, cucurbitæ, cucumeris, et portulacæ, uel leniamus, & mediocriter friges faciamus caput *coriandri*

Plinius lib.  
20. cap. 3.  
Aetius lib.  
4. cap. 13.

Auic. lib. 3.  
F. 1. trac. 3.  
cap. 5.  
DE FIN.  
MORBI.  
CAUSA.  
Aetius ibid.  
SIGNA.

Auic. ibid.  
PROGNO-  
STICA.

Hip. lib. 7.  
aphor. 50.

Gal. ibid. in  
com.

VI CTVS  
RATIO

MEDICA-  
RATIO.

Aetius ibid.



riandri succo cum rosaceo humectantes; sed & totum corpus ex hoc illinatur, aut cucurbita ramenta sincipiti impone, aut uitis folia, aut portulacam, cum rosaceo tusam, aut heliotropij scorpiuri succo sinciput illine, aut oui luteum, cum rosaceo concutito, & sincipiti illinito, & assidue permutato.

## DE INFLATIONE CAPITIS AB AQUA

EXTRA CRANEUM.

CAP. XI.

DESCRIP-  
TIO  
MORE.

SIGNA.

CAUSAE.

**I**NFLATUR caput in infantibus, ut plurimum, paulo ante natis, adeo ut interdum caput ferre non posse uideantur: quem morbum κεφαλῆς ἐμφυσίατις greco sermone, & latino, capitis inflationem esse dicimus. Et generatur aliquando, uel ab aqua præter naturam in ipso capite coaceruata, uel à flatuosa materia, & cum sit ab aqua, ægritudinem ipsam *Greci* υδροκεφαλῶν uocant, latini aquam in capite congregatam, de qua nunc primum pertractare uolentes opera pretium est, ut ante omnia affectio ipsa bifariam diuidatur; Aqua enim ipsa duplici modo, uel intra cranium generatur, pro ut in sequenti capite declarabimus, uel extra. Si extra, cause tunc erunt, ut plurimum cum obstetrix errat, & comprimit caput, & separat ipsum, & aperiuntur orificia uenarum, & currit ad illud, quod est sub cute, sanguis aquosus; Et quandoq; sunt humores alij, ab humiditatibus aquosis. Vel etiam, mea quidem sententia, fieri poterit ob incuriam nutricis, aliquo ictu, uel casu, uel alio modo, in nutriendo, uel capite pannis inuoluendo, ultra modum stringentibus, uel lædētibus, unde commissuræ aperiuntur, & exprimitur aquositas illa, quæ

Anic. lib. 3.  
trac. 3. cap.  
11.

ALIAE  
CAUSAE.



in cerebro uiget ad exteriora cranej inter cutem, & cranium,  
 & sic caput inflatur. Signa satis innotescunt; inflatio enim  
 cutis capitis adeò extenditur, ut uidere ultrà ipsam aquam  
 possumus, & grauitas extra craneum sentitur, quam infans  
 facile explicaret, si uerbis exprimere posset, & facile tactui ce-  
 dit inflatio ipsa, infantis assiduus eiulatus, & uigiliæ. Obser-  
 uandum uerò est, ne infans ipse ægrotus spasmodum incidat,  
 mortem enim portendit. Victus ratio nutrici instituat, SIGNA.  
 hoc pacto, aer eligatur uergens ad siccum, & calidum, & si  
 opus fuerit cum igne, et odoribus in cubiculo alteretur, exer-  
 ceat se quotidie mane, & uesperè horam unam antè cibū,  
 & frictionibus indulgeat, caput suum, & pariter caput in-  
 fantis pectinet, uentrem ab excrementis euacuet, uel sponte,  
 uel arte, uigiliæ sint longiores solito, somni breuiores; & post  
 cibum, diurnum somnum omninò euitet, utatur cibus boni  
 succi, & facilis concoctionis, exsiccantibus, asis, uel fixis, ue-  
 luti sunt carnes columborum, & omnium auium terrestriū,  
 uitulorum, & hædorum. Panem biscoctum cum semini-  
 bus anisorum, & pauco sale subactum comedat. Vinum  
 paucarum uirium bibat, sed satis maturum, & sitim toleret,  
 parum bibendo. Euitet fructus omnes, præter nuces, amyg-  
 dalas, & auellanas, & etiam omnia olera, præter saluiam,  
 maioranam, & ocymum. Euitet legumina, & omnia fla-  
 tuosa, unctiosa, & humida. Indicatio istius curationis duo  
 bus modis perficitur, uno cum localibus exterius adhibitis ad  
 caput infantis, altero incisione per chirurgiam; quæ applican-  
 tur exterius, debent habere facultatem exsiccandi humidi-  
 tatem, & cerebrum corroborandi ueluti, R olei chamæme-  
PROGNO-  
STICA.  
VICTUS  
RATIO  
MEDICA-  
MENT.  
RATIO;

ANOT

DOCTO  
A. 1511

a.

Gal. lib. r.  
ephor. 21.

lini, de lilio, an. ꝑ. ꝑ. succi maioranæ, drac. iij. pulueris thuris, sulphuris an. ꝑ. ꝑ. misce, & bis in die, manè, & serò, caput infantis calide inunge; postea pannum ex lana calidum superpone, & per dies quinq; quotidie inungatur; Deinde urgente morbo applicetur hoc cataplasma; R. styracis, olibani, sarcocolle, gummi arabici an. ꝑ. ꝑ. liquefiant in uino albo styptico q. s. deinde adde farina fænigræci, fabarum, seminum lini an. ꝑ. ꝑ. olei anethini ꝑ. ꝑ. misce, & s. a. fiat cataplasma, quod super linteolum extensum superponatur capiti, & ligetur. Vel alio modo R. pulueris florum chamæmeli, thymi, calamenti, origani, serpilli, gallarum cupressi an. drac. ij. nucis muscatæ, gariophylorum, cinnamomi, croci, corticum citri, macis an. ꝑ. ꝑ. cere liquefactæ ꝑ. ꝑ. succi maioranæ ꝑ. ꝑ. misce; s. a. & fiat emplastrum, & calidum applicetur; sternutamenta etiam præstant, uel cum puluere seminis sinapis, aut piperis, uel cum puluere ranunculi, aut hellebori albi, uel cyclamini, moderate in naribus infusis. Per chirurgiã uerò aqua ipsa extrahi debet, hoc pacto; In primis in ipso infante, uentre exonerato, uel adhibito suppositoio, uel clystere communi, fiat incisio cutis capitis in ea parte, uel secundum latitudinem, uel longitudinem, ubi magis propendet materia, ut facilius exeat; nam ad quem locum uergit natura, eo ducere, & educere humorem noxium, conuenit. Verùm cum sit incisio ipsa, omni diligentia illud attendendum est, nè semel uno, & eodem tempore, tota aqua ipsa extrahatur. Etenim simul cum ipsa exeunt spiritus uitales, & uires resoluntur. Propterea paulatim, duorum, uel trium dierum interuallo, euacuanda est. Et statim post incisionem, panniculi inferius

ferius descripto linimento infusi ponantur supra ipsam incisionem, R. olei rosati completi, chamæmelini, uini nigri styptici an. ꝑ. unc. ij. omnia bene simul misceantur, & utere. Vel R. olei rosati omphacini, olei hyperici an. ꝑ. unc. ij. misce, & cum ligatura satis forti, & stricta, caput post incisionem, ligetur, & sic procedatur usq. ad consolidationem, et perfectam resolutionem morbi; Et si opus fuerit, in dictis oleis addantur pulueris myrrhæ, & thuris q.s. quoniam exsiccant; Extrahitur etiam alio modo aqua ipsa, ad mouendo moderate caustica medicamenta ad occipitium, uel ad sinciput, secundum exigentiam loci affecti, & si in incisione caro nimis tardare uideatur eius generationem, os eius leniter radatur.

Auc. ibidem

# DE INFLATIONE CAPITIS AB AQUA INTRA CRANIUM.

CAP. XII.

**C**ONGREGATIO Aquæ, ut dicunt latini intra Cranium, & Græci υδροκεφαλον, τὸς κρανιον causam trahit, aliquando à positura infantis in utero matris, ex qua cum caput propendeat, & omne graue deorsum tendat, substantia illa aquea ex suppressione menstruum retenta, facile ad ipsum caput defluit, & ibi facile retinetur, cum ob capacitatem ipsius loci affecti, tum etiam propter naturam ipsius cerebri humidam, & augetur propter malam uictus rationem matris humidam præteritam, seu uaporosam, dum in utero ferabatur infans. Signa

DESCRIP-  
TIO  
MORB.

CAUSA.

SIGNA.

nobis innotescunt propter tumorem, quia non adeo magnus est, ut quod extra cranium est, & uigilias, et ploratus, & grauedinem, quæ sentitur interius, et quia oculi claudi non possunt, assidue lachrymantes, intuentesque, aperti quasi semper in unum locum. Propterea hic morbus difficulter suscipit curationem, & periculum mortis imminet, tum propter cerebri uicinitatem, tum propter infantis uirium imbecillitatem. Quamobrem indicatio istius curationis, superat humani ingenij uires, & potestatem hominis, nihilominus exsiccationibus, calefactionibus, & cerebrum corroborantibus perficitur. Quapropter uictus ratio conuenit, quæ præcedenti capitulo descripta est. Medicamentorum uero remedia supra caput, & infra aures, & nares applicanda sunt, ueluti R. limaciarum cum testis earum numero 30. maioranæ M.i. contundantur omnia simul, postea adde pulueris camphoræ, croci an. drac. s. & cum oleo chamæmelino q.s. misce, & f. emplastrum, & calidum capiti apponatur, & non remoueat, donec per se cadat, deinde R. pulueris sulphuris, thuris an. drac. i. pulueris sagapeni, euforby an. scrup. s. olei chamæmelini amygd. amararū, de beben, de lilio an. drac. s. misce omnia simul, & quotidie manè semel tantum, tres, uel quatuor guttæ istius liquoris ad summum imponantur auribus. Postea R. pulueris nucis myristicæ, quam muscatam uocant, charyophylorū an. scrup. i. pulueris cubebarum, caphoræ, radice acori, corticis thuris an. drac. s. aquæ maioranæ, absinthij an. drac. iij. misce, et postea quadam penna in utranque partem narium immissa insuffletur, corroborando sæpè cerebrum odoribus optimis, ueluti musco, ambra, & camphora, & eo modo perseueretur quotidie,

Aulic. lib. 2.  
trac. 4.  
cap. 11.

VICTVS  
RATIO.

RATIO  
MEDICA-  
MEN.

10225  
011  
BRON

AP 10

usq; ad resolutionem materiae, cuius si spacio dierum quindecim, uel uiginti, non fiat ipsa resolutio, tunc ad incisionem, & perforationem ossis cranei deueniendum erit, & in hoc adhibenda est per peritum chirurgicum maxima diligentia, in facienda perforatione, in ea parte, in qua saepius caput inclinare uideatur, Et cum facta fuerit perforatio, cauendum est, ne aeris frigiditas, uel humiditas caput infantis laedat, immò semper calidum conseruandum est. & aqua post perforationem extrahi debet, paulatim pluribus uicibus, ne uirtus infantis facile succumbat, & cum panniculis madefactis in oleo chamemelino, & inelle rosato super incisionem, & perforationē positis curetur, donec tota aqua extracta fuerit, postea ad consolidationem incisionis, secundum praecepta artis deueniendum erit.

## DE INFLATIONE CAPITIS A FLATU.

### C A P. XIII.

**I**NFLATIO Capitis à flatu, ut dicunt Latini, & Graeci κεφαλῆς ἐμφυσία, est affectio, quae ut tympanites in uentre à spiritu flatuoso generatur, ita & ipsa, uel à mala lactis nutriticis, uel a loci, uel ab aeris ambientis qualitate praeterita, fit. Spiritus enim flatuosus sub cute aliquando, interdum sub membranis ossa, uel musculos ambientibus, collectus in inflationem producit. Etenim dum calor imbecillis est, sub multa humiditate cruda, & uiscida contentus, & suppressus, cum exsuperare eum nequeat, propter eius imbecillitatem, suturas infringit, dilatatq; & foras erumpit. Propterea à infla-

DEFINIT.  
MORBI.

CAUSAE.

Paul. egin.  
lib. 4. cap. 28.

STIGMA.

Aulic. lib. 3.  
P. 1. trac. 3. c.  
11.

PROGNO-  
STICA.  
VICTVS  
RATIO

Paul. lib. 4.  
cap. 28.  
RATIO  
MEDICA-  
MEN.

tio ipsius capitis, uigilie, dolores, & fletus præter consuetudi-  
nem sunt istius agritudinis signa. Verum si alui fluor super-  
uenerit malum, ita & febris; Propterea timendum est, &  
tempestiuè ad curandum deueniendum. Victus ratio institua-  
tur nutrici, quemadmodum instituta est in capite de inflatio-  
ne ab aqua extra cranium, & si quid iniungendum est, mea  
quidem sententia, tantum obsonia, & fercula parari debent  
cum pipere parumper fracto, uel cinamomo, origano, apio, sal-  
uia, fœniculo, cymino, & similibus. Indicatio autem curatio-  
nis perficitur, ijs, quæ raritatem ipsius cutis capitis inducere,  
uel crasfiorem spiritum extenuare ualent; ueluti R. olei cha-  
mæmelini lib. s. seminum rutæ, apij, anisorum, cymini an. dr.  
iij. bulliant omnia simul, postea panniculos madefactos ipso  
oleo capiti superpone. Deinde R. origani castorei, cymini con-  
triti an. grana i. lactis nutricis q. s. ad dissoluendum misce,  
& infanti tribue, Et in auribus oleum de been, amygdalarum  
amararum, & anethinum an. partes æquales infunde quoti-  
diè manè, & serò. In nares uerò aquam maioranæ immitte,  
cataplasma quoq; præscriptum in capite ab aqua extra cra-  
nium apponito, & sic perseverato usq; ad resolutionem ipsius  
flatus.

## DE TERRIBILI SOMNO.

CAP. XIII.

DESCRIPT.  
MORE.

Aulic. lib. 1. f.  
3. doc. 1. c. 3.  
circa finem.

**A**CCIDIT aliquandò in infantibus dormientibus affe-  
ctio quædã quæ à latinis dicitur terribilis somnus, & à  
Græcis *νύκτωρ δειματοειδής*, uel *δειματοειδής* & causa istius

morbi, est nimia repletio lactis, aut cibi, in uentriculo facta, & ijs infantibus præsertim, qui sunt natura edaciores, quando loca ad uentriculum pertinentia, sensu quidem uigeant, sed imbecilla existant, cibus uerò corrumpitur. Nos si quidem obseruauimus non in infantibus solum, sed etiam in ætate prouectis, terribiles fieri per somnos imaginationes. Signa nota sunt in somno; exterefacti enim sine mora in pauorem, & clamorem aliquandò incidunt. In uigilia uerò calor præter naturam in stomacho accumulatur, & ex ore infantis odor fetidus exire percipitur. Quod si hoc uitium perseveret periculum est, ne incidat in epilepsiam. Indicatio uerò istius morbi perficitur, nutrici exhibendo melioris succi, & facilioris concoctionis solito, cibum. Et lac infanti in minori quantitate solito, prohibendo, cum ipse infans habet repletionem lactis in stomacho, ne dormiat quousq; lac descendat, nec non quotidie exhibendo infanti ipsi, ieiuno stomacho, mellis puri, & in melius despumati, per tres dies continuos, cocleare semis pro qualibet uice, Abstergit enim mel stomachum à lacte, & expellit ad exteriora. Præterea si opus fuerit, alio non deiciente, fiant suppositoria ex simplici melle in principio, postea adde salis gemmæ q.s. & injiciantur, quoniã ad inferiora lac corruptum trahunt.

CAUSA.

Gallib. 1. 2.  
phor. 24. in  
comm.

SIGNA.

IUNCTVS  
RATIO.

Auc. ibidem

## D E V I G I L I I S.

CAP. XV.

**E**TSI modum et rationem de somno infantibus conciliando, capite proprio, libro secundo huiusce artis, abude docuimus; nihilomi



Hip. lib. 7.  
Aphor. 67.  
Gal. lib. 3.  
Aphor. 24.

DESCR.  
PTIO  
MORE.

CAUSA.

SIGNA.

PROGNO.  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

MEDICAM.  
RATIO.  
Auc. lib. 1.  
E. 3. doc. l. c.  
3.

bilominus, quia ipsis infantibus insuetæ uigiliæ ad eò intensæ  
accidunt, ut nec positio papillæ mamillarum in ore ipsorum,  
nec motus, seu agitatio in cunis, nec uocis modulatio, nec inuo-  
lucrum exquisita mundities iuuent, & tollant uigilias ip-  
sas, quia omninò modum excedunt, & præter naturam  
sunt, & rationem morbi assequi uidentur. Somnus enim,  
& uigilia utraq; modum excedentia morbus. Vi-  
gilia uerò haud quaquam ipsis sunt assuetæ, ut qui maiori par-  
te temporis dormiant, nisi fortè ob ipsam passionem fieri in-  
fantibus uigilias opinemur, quoniam somni abundantia ipsis  
maximè secundum naturam inest. Verum quia affectio ip-  
sa diurno, & nocturno tempore perseverat, latino potius excu-  
biæ, quàm uigiliæ, & græco sermone *παρανοχίας* uocantur, &  
originem trahunt à nimia copia lactis, in uentriculo sumpti,  
cum nimia etià assumendi auiditate. Quapropter stoma-  
chus oppressus, ita, ut digerere, & concoquere non possit, trans-  
mittit uapores crudos ad caput, qui uigilias, & pauores promo-  
cant. Signa manifesta sunt, uigiliæ scilicet, & ploratus; Et  
quia in longis uigilijs biliosior redditur sanguis, & magis exsic-  
catur corpus. Propterea timendum de febre hectica. Aer  
igitur eligatur obscurus, potius ad calidum, & humidum, quàm  
ad siccum, & frigidum uergens. Nutrix utatur in cibo ijs,  
quæ somnum inducunt, ueluti lactuca, summmitatibus papa-  
ueris albi, & seminibus, & decoctionibus earum, et similibus,  
& uescatur melioris succi, & facilioris concoctionis cibis.  
Deinde, morbo perseverante, si opus fuerit, R. corticum papa-  
ueris albi subtiliter cōtriti, unguenti populeonis an. drac. ij. olei  
rosati, lactis nutricis an. q. s. misce, & s. a. f. linimentum,

& ex



Ex eo circa tempora, frontem, & commissuram coronalē  
 infanti inūge, uel R pulueris subtilissimi papaueris albi, amo  
 mi, aloes an. drac. ij. olei de lactuca, papauerini, an. q. s. ad dis  
 soluendum, & incorporandum misce, et s. a. fiat linimentum,  
 & locis prædictis inunge. Quidam uerò etiā exhibent opia  
 ta, prout de requie nicolai scrup. i. dissolutum cum lacte nu  
 tricis, sed animaduertant studiosi, quod in omnibus homini  
 bus humidum cerebrum est, at in infantibus humidissimū;  
 propterea periculum est, ne exhibendo eis opiata, incurrant in  
 epilepsiam, uel apoplexiam. Igitur melius, uel tutius est, ut  
 nutrix bene regatur, alterando lac frigidis, & humidis, &  
 idem pro cibo exhibendo ipsi infanti tanta quantitate, quan  
 tam stomachus ferre possit, & concoquere, inungendo, ut su  
 pra statutum est, quoniam sic tutò, & incunde curabitur.

## D E E P I L E P S I A.

## C A P. X V I.

SI infanti lac sugenti, detentio repentina mentis, & sen  
 suum omnium contigerit, morbus ille, latine dicitur comi  
 tialis, seu regius, Græcè autem *ἑπιληψία*, cuius causa duplex  
 est, uel ex intemperie ingenita cerebri frigida, & humida;  
 Epilepsia enim plurimum accidit pueris ob eorum humidita  
 tes, uel ex aliqua externa, & accidentali causa, ueluti ex ca  
 su, & ab humore frigido, & crasso, à mala uictus ratione  
 præterita, genito. Signa sunt mentis detentio repentina, ut  
 dictum est supra, sine sensuum motu; cum spuma ab ore pro  
 fluente; Et quibuscunq; morbi comitiales fiunt, ante puberta

DEFINIT.  
 MORBI.  
 CAUSA.  
 Auic. lib. 3.  
 trac. 5. F. 1.  
 cap. 8.

Gal. lib. 2. a.  
 phor. 45. in  
 comm.

SIGNA,

Hip. lib. 5.  
 aphor. 45.

PROGNO-  
STICA.VICTVS  
RATIO.Hip.lib.1.a-  
phor.45.MEDICA-  
MEN-  
RATIOMEDICA-  
MEN-  
RATIO

tem, mutationem accipiunt; quibuscunq; autē uigesimo quin-  
to anno fiunt commoriuntur. Propterea in infantibus, si re-  
cte curentur, bene est sperandum. Vnde aer in primis om-  
nino de uno in alium locum mutetur, & mutatio fiat ad sic-  
cum, & calidum, ut ipsius Hip. doctrinam obseruemus, di-  
centem. Quicunq; iuuenes morbo comitiali laborant, muta-  
tione maxime etatis, & temporum, & locorum, & uictuū  
quoq; liberantur. Nutrix igitur utatur cibo melioris suc-  
ci, & facilis concoctionis, in quo comedere inter olera po-  
terit betonicam, boraginem, saluiam, maioranam, petro-  
selinum, & fœniculum, & flores betonicæ, boragi-  
nis, & saluie, & semina pœoniæ; inter aromata nuces mu-  
scatas, gariophyllos, zingiberum, cardamomum; inter fru-  
ctus pyra cocta, amygdalas, & auellanas, & mala cydonia.  
Comedat carnes uitulorum, hædorum, & auium terrestriu,  
ut perdicum, turdorum, alaudarum, phasianorum, et similia;  
comedat panem bene fermētatum, & satis coctum; Bibat  
aquam mellis, cum saluia decoctam; Euitet omnia alia ole-  
ra, et uinū, et acria, et caseosa, lacticinia, alliu, raphanū, porrū,  
capā, legumina, cibos ex pasta confectos, carnes bubulas, ouil-  
las, & suillas, & pisces omnes, non comedat ante digestionē  
& fugiat cruditates, tā in ipsa nutrice, quā in infante; Et  
animaduertendū est, ne lac uitiatum sit, quod curari debet, se-  
cundū eius uitiū, eo modo, quo, suo loco declaratum est, in pri-  
mo libro istius artis, qui legēdus est scire uolenti. Infans uerò,  
ut indicatio istius curationis obseruetur, dum est in paroxys-  
mo excitetur suffumigijs ex plurimis, uel ex ruta, uel ex gal-  
bano, uel assa fætida, uel fricationibus. Postea tēpore quie-  
tis,

is, quotidie, mane, ieiuno stomacho ei exhibeatur scrup. s. istius electuarij, uel etiam scrup. i. secundum ætatis fortitudinem ipsius infantis; deinde statim admoueatur ipse infans mammillis nutriticis, & earum papilla in ore, eius ponatur, ut simul cum lacte, deglutiat ipsum electuarium; quod sic conficito. R. granorum pæoniæ, subtilissimè contritorum, pulueris cardamomi an. scrup. s. nucis myristicæ, quam muscatam uocant, mithridatici electi drac. ij. mellis optimè despumati, parum misce, & fiat electuarium; postea super commissurâ coronalem ponatur aliquantulum istius pulueris; R. seminū pæoniæ scrup. iij. nucis myristicæ, cardamomi, gariophyllorum an. scrup. i. rosarum rubearum, coralliorum rubeorum, myrtillorum an. drag. i. misce & fiat puluis subtilissimus, & renouetur super caput infantis, tertio quoq; die, & quando secundus ponitur puluis, remoueatur primus. Vel R. olei sesamini ꝑnc. i. s. sacchari candidissimi ꝑnc. i. contriti misce, quotidie sepe post somnum de eo, ad lambendum, præbe co- cleare unum, nec non post balneum, & fricationes, manè quo- tidie corpus ipsius infantis inungatur oleo chamæmelino ca- lido. Præterea Albertus Magnus laudat smaragdum, col- lo alligari ad arcendum proprietate occulta comitalem mor- bum. Laudo etiam ut collo suspendatur radix pæoniæ; nam de ipsa loquens Gal. inquit; Equidem uidi puel- lum quandoq; octo totis mensibus morbo comitali li- berum, ex quo hanc radicem gestauit, ac postea fortè fortuna cū, quod à collo suspensum erat, decidisset, protinus denuò conuulsione correptum, rursusq; suspen- so in locum illius alio inculpate postea egisse, porro

DEFINIT.  
MORS.C. 11. l. 1. a. 2.  
C. 11. l. 1. a. 2.  
C. 11. l. 1. a. 2.Alb. Mag.  
de minerali-  
bus lib. 2.  
trac. 2. cap.  
17.  
Gal. lib. 6.  
8 simpl med  
fac. cap. de  
glycistida.

nissum est mihi satius esse rursum, id collo detrachere, certioris experientiae gratia, id cum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est.

## DE PARALYSI.

## CAP. XVII.

DEFINIT.  
MORB.

**A**FFECTVS ille, qui motum uoluntarium, & sensum in aliqua corporis parte, non autem in totum offendit; & impedit, & hoc consentientibus, & patientibus musculis, & nervis; A Latinis dicitur neruorum resolutio, & Graece *παραλύσις*, & causa, ut plurimum in infantibus est humor lentus, & crassus resoluens neruos, & aliquando accidit propter casum ex compressione cerebri, & ex forti ligatura,

Gal. lib. de  
atra bile c. 5  
circa finem.  
CAUSA.

SIGNA.

uel ex aliqua percussione, uel contusione. Verum ubi sensus, & motus uoluntarius impeditur, & urina (quae naturaliter ad laetis proprietatem trahit) ut plurimum uiridis, & tenax, cruda, et pellucida percipitur, sunt huius aegritudinis manifesta signa. Et si paralysis cito non curetur, & annu pertransit, contrahitur habitus morbi, & ac proinde immedicabilis; Et si membrum paralyticum extenuetur, aut minoretur, malum, quia non nutritur; superueniente uero febre, aut tremore, bonum quia tunc fit expulsio, & consumptio, seu resolutio materiae peccantis. Victus ratio statuenda est, eo modo, quo instituta est in capite praecedenti, de epilepsia, cum cibis assis, aridisq. Mox nutrix sumat quotidie mane sy-

PROGNO-  
STICA.

Ausc. lib. 3.  
F. 2. cap. de  
para.

VICTVS  
RATIO.

RATIO

rupum

rupum istum, per dies septem continuos. R. oximellis simpli MEDICA-  
MEN.  
cis, mellis rosati colati, syrupi de betonica an. ꝯnc. s. aquarum  
betonicae, saluiae an. ꝯnc. s. misce pro syrupo; deinde post syru-  
posumat pilulas de agarico, Mesue scrup. iij. cum syrupo de  
stachade reformatas. Infanti autem ante balneum, quotidie  
manè iunctura paralytica inungantur ex oleis de costo, &  
de castoreo, & exhibeatur ei etiam scrup. s. pro qualibet uice,  
quotidie post balneum, per dies tres cōtinuos, & quinq; si opus  
fuerit, istius electuarij, cum lacte, eo modo, quo descriptum  
est, precedenti capite, in sermone de morbo comitiali. R. pul-  
ueris mentastri, rosarum, cinamomi, masticeis, mei, phu, seu ua-  
lerianae, ameos, doronici, zedoariae, gariophyllorum an. scrup. i.  
sandalorum, ligni aloes an. drac. i. misce, & cum melle opti-  
mè despumato q. s. fiat s. a. electuarium; Nec non ablutio  
crurum infantis ex lixiuij decocto cum baccis lauri, & gra-  
nis peoniae confert.

## D E C O N V V L S I O N E.

CAP. XVIII.

**C**um Nervorum, & musculorum citrà uoluntatem, uel MORE DE-  
FINIT.  
in toto corpore, uel in parte, ad suam originem fit contra-  
ctio, seu retractio, morbus ille à Latinis conuulsio uocatur, et Gal. lib. 4.  
aphor. 57. in  
comm.  
à Græcis σπασμος, & tres sunt species conuulsionum, quæ  
græco sermone dicuntur σπασμοτόνος, una idest tensio ad po-  
steriora κνισσοτόνος, altera idest tensio ad anteriora; & ter-  
tia τετανος, idest aequalis tensio. Et quia conuulsionēs fa-  
cile infantibus accidunt, & præcipuè ijs, qui iam dentire in-  
cipiunt;

Hip. lib. 3. a-  
phor. 25.  
Gal. ibidem  
in comm.

CAUSAE.  
Gal. lib. 4.  
aphor. 37. in  
comm.

cipiunt; Propterea de ea agere operæ pretium est, quæ originem, & causam, uel à repletionem, uel ab inanitione, trahit; omnes enim conuulsiones secundum ipsum Hip. fiunt, uel ex repletionem, uel euacuationem partium, uidelicet neruorum, quæ admodum chordis sæpè rumpi, ex repletionem contingit, & ex inanitionem propter siccitatem; ueluti si ad ignem neruosa corpora admoueantur, uiolenter exsiccantur, & contrahuntur, ita & neruis humanis euenire solet. Verum ea conuulsio, quæ in infantibus erit, ob repletionem excitatur, uel ex deprauationem concoctionis, quæ tum ex dolore, & putrefactionem dentium, tum ex nimia attractionem lactis ad nutritionem generatur, uel etiam ex imbecillitate neruorum, quæ humorum redundantiam facile trahit, & illis sæpè contingit corpus crassum, & humidum, & dura alius. Propterea facile conuulsionibus capiuntur. Signa sunt ista; si tensio erit ad posteriora scapulis, caput adnectere uidebitur, si ad anteriora, in hoc, collum in anteriorem trahitur, & in posteriori partem trahi non potest; si ab æqualitate, collum, & malæ & contrahuntur, & dentes utrinque herere apparebunt, addo ut neque annuere, neque renuere ceruix possit, sed immobilis cum reliquo corpore existat. Si à siccitate, uel inanitionem fiat conuulsio, signa sunt macies totius corporis, uel aliqua purgatio uiolenta præterita, conuulsiones enim ex inanitionem, post sudores multos, uel uomitus, uel deiectiones, uel sanguinis eruptiones, uel mediam, uel uigilias, uel motiones tum multas, tum uehementes fiunt. Nec non potissimum conuulsiones futuræ cognoscuntur, si partes in uultu peruertantur, aut dentes strideant, aut oculi crebro moueantur, ac peruertantur,

SIGNA.

Gal. lib. por  
rhet. 3. com.  
69

Gal. lib. 3.  
prognost.  
com. 34.

tur, sed in pueris sufficit, si tantummodo uigilent, si admodum metuant, si mente lugeant, ac aluus non deiciat. Prædicendum uerò est, infantes à conuulsione sicca non facile corripì, propter abundantiam humiditatis, & si ab ipsa capiuntur, facile curantur, propter humiditatem, & facilitatem mutationis naturæ ad habitum. In febribus autem, letales sunt conuulsiones, non letales uerò, quæ febres antecedunt. Propterea in primis si conuulsio à repletionem ducit, aer eligatur uergens ad calidum, & siccum, uel à natura, uel ab arte, igne alteratus; nutritrix fugiat animi perturbationes, otium, & quietem; Exerceat se bis in die secundum consuetudinem, manè, & serò ante cibum, aluus exoneranda est à fæcibus quotidie sponte, uel alternis diebus, arte, clystere communi. Somnus non æternus sit breuior solito, & fugiat diurnum post cibum, & uigilias superfluas, cibus deinde sit leuior solito, & caueat ab omni cibo frigido, unctioso, & humido, & difficilis concoctionis. comedat panem bene fermentatum, & biscoctum, & carnes potius assatas, quàm elixas, uitulorum, hædorum, turdorum phasianorum, perdicum, & omnium auium terrestrium, & similibus, bibat aquam cum melle coctam, & caueat à uino, inter olera comedere poterit mentam, saluiam, petroselinum, & caueat ab omnibus alijs oleribus; inter fructus mala cydonia comedat, & nuces, & auellanas; Et seruata indicatione morbi, quæ perficitur, si in ipsa nutrice erit humorum præcipue humidorum, & frigidorum abundantia, & fiat eorum purgatio hoc pacto, per

PROGNOSTICA.

Gal. lib. 4. aphor. 57. in comm.

VICTVS RATIO

MEDICAM. RATIO.

septem



septem dies continuos, sumat inferius scriptum syrupum, R. syrupi de stechade, mellis rosati colati, oximellis simplicis, an. ꝑ. unc. s. aquarum saluie, maioranae an. unc. i. s. misce pro syrupo, deinde post assumptionem syruporum, statim in die sequenti manè per horas quatuor ante cibum, capiat infra scriptas pilulas, R. pilularum ex agarico, mesue, scrup. iij. misce, & cum syrupo de stechade reformentur pilulae ꝑ. & in aurentur, & in die, quo sumit pilulas ipsas, alia nutrix lactet infan-tem. Et ipse infans balneetur in mane, & præcipue cū parte conuulsa, antequam lactet, ex aqua calida, decocta cum helitropio; mox post ablutionem, irino oleo, aut cyprinio, aut sicyonio calido inungatur affecta pars. Vel etiam alio modo, cum pinguedine ceruina calida, aut ursina, aut uulpina inungatur; Vel alio modo, R. olei moschellini ꝑ. unc. s. butyri dr. ij. terebinthinae ceræ an. ꝑ. unc. s. pulueris mastiches, styracis, mirrhe an. drac. iij. misce, & omnia in mortario bene agitentur, & s. a. f. linimentum. Verum si conuulsio prouenerit à siccitate, uel inanitione tunc aer debet potius uergere ad humidum, & temperate calidum, quàm ad siccum, & frigidum; Et uictus ratio in omnibus sex rebus non naturalibus, eo modo institui debet, & breuiter indicatio curationis uniuersa in humectando, & restaurando infan-tem consistit, Et si nutrix uel paucum, uel uitiatum lac habet, si fieri possit, alia lactet infan-tem; Mutatio enim ipsius lactis in isto casu mirum in modum confert. Sin autem nutrix curetur, & ei succurratur, secundum qualitatem indigentiae, prout à nobis ostensum est, primo libro huiusce artis, ad quem se referat. Mox infans quotidie balneetur ex lacte uaccino, aut ouillo tepido, aut cū aqua



aqua decocta cum folijs salicis, ordeo, uiolis, & rosas, & in ipsum balneum mora sit brevis, propter debilitatem uirtutis, et statim post balneum membra conuulsa ex oleo rosaceo, aut amygdalarum dulcium liniatur, ne humiditas impressa exalet, & hoc continetur, donec sanitas recuperetur.

## DE OCULORVM SUFFUSIONE.

## CAP. XVIII.

**O**CULORVM affectio illa, quæ in infantibus, latino sermone, suffusio uocatur, & græcè γλαυκωμα dicitur, nihil aliud est, quam crystallini humoris in casum colorem mutatio, & morbus ipse infantibus accidit, ob oculorum eorum imbecillitatem, respectu aliarum ætatum, duobus modis, uno, ex abundantia, & uariatione humorum, in eis contentorum, & adhuc concoctione carentium, et tunc albescunt oculi ipsi, color enim uariatur, ex uariatione humorum, & humores uariantur de ætate in ætatem. Quapropter in infantibus, crescente concoctione, oculi uirescunt, & glauci fiunt, sicut planta, nam in principio cum nascitur non est apparentis tinctura; immò declinat ad albedinem; deinde ipsa cum digestionem fit uiridis, & propter hanc causam, sunt oculi infantium glauci, & uarij, & huius quidem glaucedo fit secundum humiditatem; Altero modo, ex siccitate immodica prouenit, humiditatem ipsorum oculorum exsiccante, et in tenebrosam colorem oculos ipsos uertente, sed prout testatur Hip. Glaucedo à siccitate proueniens, in senioribus, ut plurimum, accidit, & hoc propter immodicam eorum siccitatem. Verum glaucedo,

Actius lib. 7.  
cap. 51.  
DEFINIT.  
MORB.

Actius lib. 3.  
F. 3. tr. 2. cap.  
34.

CAUSA.

Hip. lib. 3. 2.  
phor. 31.

AL. I AB  
CAUSAE.

SIGNA.

PROGNO-  
STICA  
Aet. ibid.VICTVS  
RATIO.Aer. lib. 7. de  
resol. ocul.  
cap. 1.MEDICA  
RATIO.

que à uarietate humorum, & redundantia in infantibus fit, ab aliqua agitudine præterita, uel à mala uictus ratione, uel ab immodico fletu excitatur, cuius signa sunt albedo, aut uiriditas, aut color glaucus in oculo, & difficultas in uisu. Prædicere autem licet glaucedinem ex siccitate prouenientem, incurabilem esse. Aliam uerò à redundantia, & uarietate humorum, de qua nunc scribere statuiamus in principio curationem suscipere. Victus ratio igitur instituat, ad calidum, & siccum uergens, eo modo, quo in capite, de epilepsia, nutriti, statutum est; Indicatio autem curationis perficitur, si in omnibus sex rebus non naturalibus, tam nutriti ipsa, quam infans caueant ab humidis, & frigidis, & in ferculis fœniculum, & post cibum etiam semina eius comedant. discuti enim, et uisum roborat, Et si oculi infantis, solo oleo antiquo sublinantur. Pro uiribus deambulare, etiam lentè fricare totum corpus infantis confert. Abstinere à balneo per aliquot dies præstat infantem, ne augeatur humiditas. Præstat etiam ex experientia, adurere auellanam, & in puluerem redactam, cum oleo permiscere, & uerticem infantis inungere, & similiter puluis corticum auellandarum confert. Vel fiat collyrium istud, R. acaciæ drac. i. pulueris gallarum scrup. i. misce, & cum aqua florum papaueris rufi q. s. fiat collyrium s. a. uel R. aloes drac. i. pompholygis lot. & dr. s. aquarum eufragiæ, rosarum, fœniculi an. ꝑnc. i. misce, & ex eo fiat destillatio in oculis, nam ex eo etiam sæpè lippitudinem sanauit, testis est IOHANNES FRATA Iuuenis nobilis Veronensis, lepidis moribus præditus, & musis amicus, qui postquā in Gymnasio ticinensi lippitudine correptus fuisset

set, & Veronā cōualefcēdi causa rediisset; hoc solo collyrio, post  
debitā totius corporis purgationē, à me curatus fœliciter con-  
ualuit; cōfert etiam succus bengi, & succus corticum grana-  
torum.

## D E S T R A B I S M O .

## C A P . X X .

**Q**UANDO Infantium oculi, cernere uolentes, distorti  
apparent, uel prout dicitur, in obliquum, detorq uetur;  
græcō sermone, uocatur hæc affectio στραβισμος, & à Lati-  
nis strabisimus; ij uero: qui habent oculos distortos, græcè di-  
cuntur στραβος οφθαλμοειδής, & affectio ipsa modò ab hu-  
miditate, modò à siccitate musculorum bulbum mouētium,  
generatur. Signa, si ab humiditate oriatur affectio, erunt ca-  
piofa, narium, oculorum, & palati destillatio, et aurities alui;  
si à siccitate, ut à febre, uel cōuulsione, aut epilepsia præterita,  
uel præsentanea, uel ab aliqua adustione faciei prout in qua-  
dam filia mea unius anni euenit, quæ igne, casu facie combu-  
sta, per aliquot dies, post sanationem, cum strabisimo, uel distor-  
tione oculorum aspiciebat. quæ postea oleo tantum modò ro-  
faceo emollita, aliquoties fœliciter conualuit. Strabisimus au-  
tem, seu strabositas, quæ est à generatione non sanatur, nisi in  
habitu corporis infantis ualde humido; Et si recens est facile  
curatur; si est ab humiditate uictus ratio in omnibus sex re-  
bus non naturalibus instituatur, potius uergens ad calidum,  
et siccum, quā ad frigidum, & humidū, unde sumitur istius  
morbi indicatio: frigidum enim inimicum est neruis. Mox

MORB.  
DESCRIP-  
TIO

CAUSAE.  
Paul. lib. 3. c.  
de ocularijs  
22  
Auic. lib. 3.  
F. 1. tract. 3.  
cap. 28.  
SIGNA.

Ant. ibidem  
PROG-  
NOSTICA.

VICTVS  
RATIO.

RATIO  
MEDICA-  
MEN.

nutrici per horas quatuor ante cibum, exhibeatur pilule istae.  
*R. pilularum cochiarum, agarici præparati an. scrup. ij. misce, & cum melle rosato reformentur pilule v. & in aurentur.* Die uero sequenti oculi infantis fomententur ex decoctione rerum, & herbarum anodynarum, cum spongia, deinde inungantur oleo chamæmelino calido, simul cum paucis croceo misto. Si uero à siccitate provenit, contrario modo indicatio non monet, cum humidis enim, & calefacientibus moderatè instituaturs uictus ratio; Si ab aliqua ægitudine per consensum, ueluti à conuulsione suboriaturs strabismus, tunc animaduertant studiosi, quod ipsa ægitudine soluta, sanabiturs etià strabismus ipse. Et si per adustionem oleo rosaceo tantummodo, uel è luteis ouorum illinendæ sunt partes oculorum, & sanabiturs. Verum si à generatione erit strabismus, tunc transferatur infans quotidie in locum obscurum, in quo accendatur lucerna, & ponatur in parte opposita strabismi, adeò ut infans labores semper in eam cernendo. Prætereà ligetur filum rubrum cum re, quæ opponatur parti strabismi, aut suspèdatur aliquid rubrum, apud tempus appositum, adeò ut faciliter uideat illud, uel apponatur larua, seu persona fronti ipsius infantis, adeò ut rectè per eam aspiciat. Ad punctiorem autem, & ardorem oculorum. *R. albuminis unius oui, aquæ rosacæ, olei rosacæ, an. vnc. i. misce, & omnia simul benè agitenturs, & inunge; nec non albumen tantum oui, & aqua rosacea sola mirum in modum præstat.*

Quic. ibidem

## DE PALPEBRARVM CRASSITIE, ET

PILORVM CASV. CAP. XXI.

**C**um infantis præter naturam cooperturæ, seu palpebræ oculi crasse fiunt cum aliqua caliditate, & rubedine; ca-  
 suq; pilorum, arabice id uocatur silac, & græco nomine dici-  
 tur σιλωσις causa est humor crassus, & salsus, ptilosis enim  
 palpebrarum est in callum indurata crassities rubēs, quā ma-  
 gna ex parte capillorum defluuium comitatur; & quandoq;  
 accidit cooperturæ oculi infantis silac ex fletu; Nec noc silac  
 quidem est crassities in palpebris proueniēs à materia grossa,  
 mala, corrosina, salsa, baurachia, propter quam rubere fiunt pal-  
 pebræ, & cadunt pili palpebrarum, & adducit ulcerationem  
 partium, quibus fixi sunt pili palpebrarum, & sequitur eam  
 corruptio oculi, & plurimum accidit successione ophthalmiæ,  
 & quia hæc affectio inuenitur aliquandò recens, aliquandò  
 inueterata. Propterea in infantibus non potest esse nisi re-  
 cens. Igitur uictus ratio instituatutur nutrici ad siccum, et fri-  
 gidum uergens, & calidum, & humidum fugiat, ut istius af-  
 fectionis perficiatur indicatio: caueat à uino, ab oleribus, à le-  
 guminibus, à piscibus, ab aromatibus, à salsamentis, ab allijs,  
 à cepis, à porris, à flatuosis, à crassis, unctuosus, & humidis;  
 bibat aquam coctam cū seminibus coriandrorum; comedat  
 panem benè fermentatum, & biscoctum, carnes assatas, uitu-  
 lorum, pullorum, gallinaceorum, & auium terrestrium; exer-  
 citationi incumbat; caueat à perturbationibus animi, & à  
 somno diurno, post prandium, & alius quotidie deiciat, tam  
 in ipsa, quàm in infante, uel sponte, uel arte, Et omni stu-  
 dio.

OITAN  
DESCRE  
PTIO  
MORB.Auc. lib. 2. F.  
3. doc. 1. c. 3.  
CAUSA.  
Paul. lib. 3. c.  
de ocularijs.  
22.DEFINIT.  
MORBI.  
Auc. ibidem  
Auc. lib. 3.  
F. 1. tract. 3.  
cap. 3.STIGNA  
PROGNO-  
STICA.VICTVS.  
RATIO.

RATIO  
MEDICA-  
MENT.  
Aucibidem

Paul. lib. 3.  
de ocularijs  
cap. 22. par  
te propria.

VICTVS  
RATIO.

dio; & diligentia conuenit prohibere ne infans ploret, fricationibus incumbat, et caueat à balneo; Et si lac peccatum habet in crassitie, uel aliquo alio modo, curetur, secundum artem à nobis, in primo libro, explicatam, Infantis uero palpebrarum succus solani commendatur. Nec non palpebris ipsis, quotidie post fricationem infantis, renouetur; & applicetur hoc emplastrum R. lentium decoctarum cum aqua rosacea, pulueris portulacæ an. ꝑ. i. albuminis unius oui, olei rosaces q. s. ad incorporandum misce, & s. a. fiat emplastrum, & utere; Et si tumor in palpebris euenerit, cum aliquo dolore, tunc fomentationes calidæ, ex decoctione rerum, & herbarum anodynarum cum spongia; & inunctiones ex rosaceo tantummodo præstant.

## DE PRURIGINE PALPEBRARVM.

CAP. XXII.

DESCRIP-  
T. MORE.

CAUSAE.

SIGNA.

Paul. lib. 3.  
de ocularijs  
cap. 22. par  
te propria.

VICTVS  
RATIO.

**P**ALPEBRARVM Regioni infantis contingere solet etiam quidam pruritus, ueluti scabies, quæ græci *ῥιτις* uocant; qui morbus, ex falso, nitrosoq; humore ducit originem. Signa sunt pruritus, & scabies. Et prædicere conuenit, si pruritus, & scabies ipsa (prout in infantibus, ut plurimum contigit) in sanguine, uel pituita, uel bile flaua peccant, faciliorem curationem admittere, quàm ea, quæ ex commistione atrabiliarij humoris gignuntur. Victus ratio statuenda est cum humidis, & infrigidantibus; si pruritus ab humore falso, nitrosoq; causam trahit, à quo sumitur indicatio; unde

nutritrix caueat à uino, ab omnibus oleribus, præter spinachiâ,  
 lactucam, & atriplicem, caueat ab allijs, cæpis, porris, rapha-  
 nis, salsamentis, & ab aromatibus omnibus, à crassis, uisco-  
 sis, & digestionibus duris; bibat aquam tum seminibus corian-  
 drorum coctam, aut iura carniū; comedat panem bene  
 subactum, fermentatum, & satis coctum, & carnes boni suc-  
 ci, & facili, concoctionis; exerceat se secundum consuetudi-  
 nem; caueat à somno diurno, & à perturbationibus animi;  
 alius deiciat quotidie, & infans balneetur post fricationes;  
 deinde palpebris ipsis affectis fiant medicationes istæ R. len-  
 ticulæ, & rosarum an. M. i. pulueris florum chamæmeli,  
 parietariæ, rosarum an. drac. ij. aloes drac. i. uini dulcis al-  
 bi q. s. ad incorporandum misce, & fiat cataplasma, & ad  
 palpebras adhibe. Vel R. aloes, psylli, an. drac. i. s. & li-  
 gentur in panniculo, mox infundantur in aqua q. s. perna-  
 ctum; deinde parum lento igne, simul calefiant, postea fiat  
 fortis expressio, & coletur, de qua colatura tepida, manè,  
 & serò, ablue palpebras. Quod si lachrymæ inuolunta-  
 riæ suboriantur, inunctione præmissa tolluntur, & con-  
 stringuntur. Verum si pruritus prouenerit ab aliqua mi-  
 stione, atrabiliarij humoris, uictus ratio in omnibus sex re-  
 bus non naturalibus instituat ad calidum, & humidum  
 uergens tantummodo, quoniam medicamentorum ratio præ-  
 missa conuenit.

## DE DOLORE AURIUM.

CAP. XXII.

DEFINIT.  
MORE.  
Gal.lib.3.de  
comp. med.  
foc. locc. 1.  
CAUSAE.

Auic.lib.1.F  
3.doc.1. c.3

SIGNA.

1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.

PROGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

RATIO  
MEDICA-  
MEN.

**A**URIUM etiam dolor accidit infantibus aliquando, qui græco nomine dicitur ωταλγία, & nihil aliud est, quàm tristis, at molesta auris sensatio, re de repente, ac uisio lenter simul, & uehementer imprimente facta, et generatur, aut à uentositate, aut ab humiditate, aut à frigiditate, aut ab apostemate, ueluti signa indicabunt, tùm ex loquela infantis, si loqui cæperit, tùm ut si à flatibus proueniet ab aurium sonitu, clarè, & tinnitu, & dolore tensiuo, non grauantem, percipietur, Et si ab humiditate, à commotione interna insinente, & dolose cum grauedine, & exitu ipsius humiditatis dignoscitur, & quia dolor est apud cerebrum, propterea sitim succurrendum est, nè ex fluxione humorum ob doloris causam, ad locum affectum generatur apostema; nam eo in casu periculum mortis imminet. Propterea aer eligatur ad calidum, & siccum uergens; nutrix excercitationi incubat; somnus sit consuetudine breuior; caueat à diurno post cibum, & à perturbationibus animi. Alius quotidie subducatur uel sponte, uel arte, tam in ipsa, quam in infante; caueat ab aqua, ab omnibus oleribus, à fructibus, à leguminibus, à piscibus, à uiscososis, ab humidis, à crassis, & ab omnibus flatum, & humiditatem parientibus; Bibat uinum satis maturum; panem comedat optime subactum, & coctum; carnes facili concoctionis, & boni succi, & fercula cum aromatibus cocta, quæ flatum discutiunt, prout cum pipere parumper contuso, & non contrito, uel cum cinnamomo, aut



zingibere. Postea à infantis aures à sordibus, in primis, quotidie, semper, antè medicationem, expurgentur, mox medicandus est dolor auris à uentositate, & humiditate, ut indicatio demonstrat, cum calidis, & siccantibus, ut ex licio, & origano, & sale tabarzet, scilicet albo, trium coëctorū, & ex lentibus, & myrrha, & ex seminibus colocynthidos, & sauinæ, quodcumq; eorum fuerit coquatur in oleo, et in ipsas guttatim instilletur. Et animaduertant studiosi, ut oleum non sit nimis calidū, uel frigidum, sed tepidum; & antequā instilletur, aures prius expurgentur ab alio primo oleo, & sit in parua quantitate, & non trahat multam moram in aure. Nec non quia omnis curatio per eius causæ ablationē perficitur, ablata n. causa, tollitur effectus. Itcirco si dolor à solo flatu oriatur, tunc ex cymini, anisorū, spicæ nardi, myrrhæ, ac olei chamæmelini, seu amygdalarū amaranarum, decocto guttā unam in aures infundito. Si uerò ab humiditate sola proueniat dolor, Auic. libid. m  
 lana in melle, et uino mistis, cum modico aluminis, aut croci, aut minima quantitate nitri, inungenda est, & auribus iniicienda, & est, cum sufficit, ut lana in uino pontico, aut in quo parum croci sit mistum intingatur, & in aures iniiciatur, ueluti R. uini, mellis, an. tunc. i. aluminis contriti, nitri, croci, an. drac. s. misce, et omnia simul unā leui ebullitione bulliant, in qua postea decoctione tepida, uel lanam prius infusam, et ma defactā, specillo inuolutā, auribus imponito; si uerò dolor fuerit à frigiditate aeris, ut indicatio nos docet, ex calfacientibus tū in uictus, tū in medicamentorū ratione curatur; dolor autē aurium à frigiditate, calefacientibus curabitur præsidij, ut oleo rutaceo, & laurino. Et si dolor uehemens suborietur, conce-

Gal. libid. m

Paul. ægin. lib. 3. cap. 23

Gal. lib. 3. de con. p. med. soc. loc. c. 1.

Anic. lib. 1.  
F. 4. cap. 8.  
Act. lib. 6.  
cap. 8 o.  
Paul. ægin.  
lib. 3. cap. 23

dantur, & admittantur stupefacientia medicamentis aucto-  
ritate Galeni, & Auic. & Pauli, & Actij, nihilominus  
quia in adultis (mea quidem sententia) intelligunt; Suadeo  
ut studiosi in infantibus omninò caueant à stupefacientibus,  
non .n. leue inde periculum cerebro, quod auditorio nervo vi-  
cinū est, imminet. Vtiterius si dolor fiat ex inflammatione, cū  
in infante nullum ex antiquis uiderim, qui de ipsa curatio-  
ne, uerbum ullā faciat; arguo in infantibus raro, aut nunquā  
morbum ipsum contingere, propterea de ipsa curatione hic per-  
tractare operæ pretium non est; nihilominus si casus euenierit,  
optimum ad eam pharmacum unguentum nardinum, cum  
exiguo basilico, appellato pharmaco, infunditur, cōmagenum  
quoq; aptum est, & ex adipibus pharmacū. Sed in hoc ani-  
maduertant studiosi, ut in casu apostematis, repercussiva non  
administrent, ne materia intrò petens cerebrum, offendat, &  
infantem interficiat.

Gal. lib. 3. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 1.

## DE AVRIBVS VERMINOSIS.

### CAP. XXIIII.

DESCRIP-  
TIO  
MORB.  
Anic. lib. 1. F.  
3. doc. 1. c. 7  
CAVSA.

**I**NTERDVM ex aure infantium uentriculi exeunt.  
Quapropter morbus ipse à Latinis auris uerminosa appel-  
latur; græco uerò sermone σκληροδυσ, & causa procul dubio  
est humiditas putrescēs, quæ in infantibus abundat, præsertim  
in cerebro. In etatibus enim talia contingunt paruis. & nu-  
per natis puerulis ulcera, quæ apthæ uocantur, uomitus, tusses,  
uigilia, pauores, umbilici, inflammationes, aurium humiditates,  
Et quoniā à natura aliena est expurgatio, humiditatū scili-  
cet per aures, undè mirum non est, si humiditas ipsa, eo, in lo-

Hip lib. 3. a-  
phor. 24.

Gal. ibidem  
in comm.

co facile putrescit, cum ibi fluit, & sic facile ex ipsa putredine uermiculi ipsi generantur. **SIGNA** manifesta sunt. Propterea quod in auribus ex humoribus saniosis, & mordacibus dolor excitatur: & quia aurium dolor acutus cum febre continua, ac uehementi difficilis est; periculum enim delirij, abolitio- nisq; imminet; statim deueniendum est ad curationem, quæ secundum indicationem perficitur. Quantum ad uictus ratio- nem eo modo, quo declaratum est, capite precedenti, de aurium dolore. Verum quod ad rationem medicamentorum attinet, quæ scripta sunt in ipso precedenti capite pariter conueniunt; In- digemus enim moderate exsiccantibus, & excalfacientibus; præterea cum coto prius specillo obuoluto, & sic in aure sepe immisso, tentandum est humiditatem ipsam fluentem educe- re, & exsiccare. Et si præmissa non suffecerint. R. uini stypti ci. ꝑ. ii. croci dr. i. misce. & calefiant, mox cotum intinctum in aure imponito, uel R. olei chamæmelini, amygdalarum amararum an. ꝑ. s. croci drac. i. misce, & guttam calefa- ctam in aure, cum coto immitte; Et si sanies, uel humiditas, in- star sanguinis ex auribus fluxerit, tunc R. olei de canabel, olei arini an. ꝑ. s. misce, & ex eis prius aurem à sanie, & humi- ditate exsiccata, gutta bis, aut ter in die instilletur, uel R. te- rebinthi, mellis an. ꝑ. i. misce, & in aurem immittito.

**SIGNA.**  
Gal. lib. 3. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 1  
Hip. lib. 1.  
prognost.  
tex. 15.  
**PROGNO-  
STICA.**

**VICTVS  
RATIO.**

**MEDICA-  
MEN-  
RATIO**

## DE STERNUTATIONE.

CAP. XXV.

**C**um inter ægritudines infantium numeretur, et etiã ster-  
nutatio, de ea pertractare operæ pretium est, quæ à Græcis  
uocatur *σπτησμος*, & quemadmodum tussis pulmonem expur-

Auic lib. 1.  
F. 3. doc. 1. c. 3  
**DESCRIP-  
TI. MORB.**

Gal. lib. a. de  
symp. caus.  
cap. 4.  
Gal. ibidem

Auic. ibidem

CAVSAE.

SIGNA  
Gal. lib. 5. a.  
phor. 35. in  
comm.

PROGN-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

gat, ita & sternutatio nares, et cerebrum expurgare uidetur. Sternutationes enim (si tamen ex catarrho non fiunt) maximum remedium capitis halitu repleti, sunt; nihilominus causa ipsius sternutationis est præter naturam; & Auicenna in isto casu, duplicem causam affert. Vnam ex apostemate in cerebro; Alteram uero sine apostemate, quæ, ut plurimum est à flatu, seu impetu flatuoso. Signa facile innotescunt; ideo dicendum est; sternutationem, quæ sine destillatione catarrhi est, in omnibus morbis saluberrimum signum esse, quia natura ostendit, quæ prius obstupuerat, excitari, & reuiuiscere, & propriarum meminisse motionum, & facultatum robur, & conualescentiam denotat. Quantum uero attinet ad sternutationem, quæ cum cerebri destillatione fit, sequenti capite declarabimus; Nihilominus impetu sternutationis copioso uenæ, & arteriæ aliquandò rescinduntur. Propterea à cū de apostemate cerebri iam propositum sit, cuius sternutatio, ablato apostemate ipso, tollitur, reliquum est, ut tantummodo de ipsa sternutatione à flatu, sine destillatione catarrhi, curationem perstringamus, quæ perficitur, si victus ratio instituat in omnibus sex rebus non naturalibus, ut indicatio istius affectionis demonstrare uidetur ad frigidum, & siccum uergens, & nutritrix caueat ab aere humido, & calido, à somno diurno, aluus exoneretur quotidie, exerceat se secundum consuetudinem, et in infante caueat, ne post lactationem diurno tempore, post spatium horarum duarum dormiat. Caueat à uino, & ab aromatibus, ab allys, cæpis, porris, raphanis, & à cibis salitis, grossis, uiscosiss, humidis, flatuosis, et difficilis concoctionis, & mali succi: Bibat aquam ordeaceam, comedat panem satis coctum

etum, & carnes boni succi, & facilis concoctionis, & cœna sit  
lenior prandio. Infans deinde manè ante lactationē, postquā  
ē uentre excrementa secreuit, leniter fricetur; deinde frons eius  
oleo rosaceo omphacino, simul cum unius oui luteo admisto,  
& benè conquassato inungatur; Vel R. pulueris portulacæ,  
aut eius succi, cucurbitæ, aut eius succi an. ꝛnc. s. farinæ ordei  
drac. iij. olei rosacei omphacini q. s. ad incorporandum misce,  
& f. emplastrum, & fronti applicetur; Vel R. olei de salicibus,  
de nenuphare an. ꝛnc. i. albuminis unius oui, misce, &  
panniculi infusi fronti, & temporibus applicetur; vel R. pul  
ueris rosarum, sandalorum, sanguinis draconis an. dr. i. aquæ  
rosacæ ꝛnc. ij. misce, & infusi panniculi fronti, & tempori  
bus adhibeantur. Capiti etiam irrorationem ex aqua calida,  
ante lactationem admoue, uel in utraq; parte oleum amygd  
alarum dulce infundito, & si infanti aluius astricta sit, suppo  
sitorijs ex melle, & hiera, uel sale gemma, confectis, lubrica  
fiat, & si præmissa non suffecerint, tunc R. pulueris masti  
ches, thuris, mirrhæ, sanguinis draconis an. dr. s. albuminis  
unius oui, misce, & omnia simul benè conquassentur, postea  
panniculi infundantur, & fronti applicentur, uel in utraq;  
aurē, oleū amygdalarū amararū, infundito: vel suffumigia  
ex thure, & gariophilis, uel spongia marina naribus admoue.

## DE DESTILLATIONE ET CATARRHO.

CAP. XXVI.

ET si hætenus inter approbatos scriptores, nullū inueni,  
qui de destillatione infantium scriptū aliquid reliquerit,  
nihilò

Gal. lib. 3. de  
sympt. caus.  
cap. 4.  
DEFINIT.  
MORBI.

CAUSAE.

Hip. lib. 3. a-  
phor. 5.

SIGNA.  
Paul. lib. 3.  
cap. 28.

Hip. lib. 2.  
prognost.  
tex. 49.

nilominus experiētia ductus, curationē ipsā paucis perstrin-  
gere tētabo. Propterea cū morbus ipse nihil aliud sit, quā  
superabūdantis humoris ex capite fluxio in partes subiectas,  
à Latinis dicitur destillatio à Grecis uerò ραταγγοος qui tria,  
ratione loci affecti ad quē uergit, sortitur nomina; his duobus  
carminibus à Bernardo quodam breuiter declarata.  
Dum fluit ad pectus, dicitur rheuma catarrhus,  
Ad fauces, bronchos, ad nares dico coryzam,  
Nec non, & bronchos alio modo dicitur raucedo, & coryza  
grauedo; Cause istius egritudinis, ut plurimū sunt in infanti-  
bus, aut uestimentorū, cooperitoriorum uē mutatio, aut subri-  
dijs solis, lunaeq; statio, aut (ut breuiter eas absoluā) sola muta-  
tio aeris, ut frigiditas, & caliditas, & praecipuē, si uenti men-  
dionales flauerint, sua enim qualitate caput grauant, et cere-  
brū replent, mox à caliditate, quemadmodū in collibus nix  
liquefacit sol, ita, & cerebrum extenuatur, ac dissoluitur: &  
à frigiditate cerebrum ipsum (ueluti à manu spongia aqua  
imbuta) comprimitur, & excrementa per destillationem  
ad inferiora compelluntur. Propterea in presenti capite de  
destillatione, quae ad nares, & ad palatum currit, & sternu-  
tationem excitat, & grauedo, aut coryza uocatur, nunc agere  
decreuimus; De ea uerò, quae fluit ad pectus, & iussim pro-  
cat, scribemus in sequenti libro, capite proprio. Signa quan-  
dò ex caliditate destillationem concipiunt, ijs, qui laborant,  
sunt haec, particulae incalescunt, acris, tenuisq; humor, tum  
per nares, tum per os descendit facies rubescit, & nasus. Et  
qui ex frigiditate ijs frons, & caput undiq; distēditur, me-  
tusq; atmoides dicti clauduntur, & in principio saepe sternu-  
ratio

satione corripuntur. Prædicendum est deinde grauedines, & sternutamenta per omnes morbos, qui in pulmone fatigēt præire, & subsequi malum esse; cerebri enim malam intemperiem, et capitis repletionem denotant, ex quibus facile in scortumiam, & uertiginem egrotantes incidunt. Et desumpta indicatione istius aegritudinis ab ipsis signis, si destillatio fuerit à materia calida, tunc uictus ratio instituaturs ad frigidum, & siccu uergens, prout institutum est capite præcedenti; de sternutatione. Si uero fuerit ab intemperie frigida uictus ratio in sex rebus non naturalibus statuenda est ad calidum, et siccu uergens, uitando tam in aere, quàm in cibo, & potu, somno, & uigilia, ea omnia, quæ infrigidant, & humectant; exercitationi incumbat, & alius tam in nutrice, quàm in infante, quotidie deiciat. Quantum uero ad curationem, opus naturæ relinquendum est: nam si rectè uictus ratio instituaturs, facillime morbus ipse curationem in infantibus admittit, & haud quaquà destillatio, aut sternutatio in similibus (nisi aliud indicetur) est constringenda. Verum enim uero post concoctionem ipsius catarrhi, quem, cessante destillatione, percipies, tutò exhibere infanti poteris, ad expurgandum caput, & pectus dr. i. agarici præparati, aut in paruis pilulis cū melle, aut saccharo rosato, exhibitis.

PROGNO-  
STICA.VICTVS  
RATIO.PROG-  
STICA.VICTVS  
RATIO.PROG-  
STICA.MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

## DE RIMIS LABIORVM.

CAP. XXVII.

DE Rimis papillarum mammarum nutricis iā scriptū est in primo libro, quæ γαρδαλ, seu ἀρκευδαλ græce

uocantur. & eandem causam habent à siccitate cum ijs, quæ labijs contingunt; nihilominus differunt in hoc, quòd post coryzam, seu grauedinem, propter narium uicinitatem, ex fluxione, & destillatione catarrhi acuti, & calidi, rimæ ipsæ in labijs excitantur. Undè labia, & nares intumescunt, & scinduntur, & aliquando etiam excitantur à uentis frigidis, propter earum siccitatem. Succurrendum statim est, quoniã in fan- cum labijs sic malè affectis, cum maximo suo dolore, & difficultate lac è mammis emulgere, et papillas labijs constringere non poterit, unde malè nutrietur. Indicatio curationis autem, si causa post coryzam ortum ducat, perficitur, cum ratio uictus potius declinet ad frigidum, & humidũ, in omnibus sex rebus non naturalibus, quã ad calidũ, & siccũ. Et si labia infantis inungantur quotidie bis, uel ter cum isto sequenti unguento R. adipis gallinæ, hædi an. tunc s. succi pomorum dulciũ tunc, iij. farinæ ordei drac. ij. olei rosacei q. s. ad incorporandum misce, & s. a. fiat linimentum. Verum si causa à sola siccitate, ut à uentis ortum ducat, tunc ratio uictus, et medicamentorum, quæ descripta, & constituta est libro primo, capite de rimis papillarum mammarum, nutricis, conuenit, ad quod ueniendum est.

DE GINGIVARVM PRVRIGINE EX  
DENTIVM PRODUCTIONE.  
CAP. XXVIII.

**I**N Infantium dentitione, quæ prorumpentibus dētibus fit, circa mensem ferè septimum, uel undecimum, ut à nobis declaratum est libro secundo huiusce artis, affectio fit, quæ



à Latinis dentitio, uel dentium productio; & à Grecis dicitur *οδοντοφυια*, & nihil aliud est, quàm gingiuarum mordicatio, & acuitas, & bifariam diuiditur. Vna, quæ dicitur gingiuarum prurigo à Latinis, & à Grecis *οδαξιγμος*, & nihil aliud est, quàm pruritus quidam cum exigua quadam molestia. Altera uerò est ipsa dentitio dolorifica cum mordicatione, & gingiuarum acuitate. Causa est acuitas dentiũ, quæ pungit gingiuas, propter pruriginem in gingiuis, haud quaquã dentes adhuc apparent; in dentitione uerò dolorifica, et tumor, & dentes aliquandò apparent. Et periculum est ne infantes ipsi incurrant, in febres, conuulsiones, & alui profluvia. Et maxime cum caninos edunt dentes, qui uulgò ab oculis uocantur, ualde timendum est; In proverbio enim dici solet. Donec ab oculis non sunt editi dentes, de filiis genitores non sunt gaudentes. Et infantibus, quibus in dentitione aluus ualde lubrica est, & bene concoquunt, minus conuelluntur, quàm quibus modice. Et quibus in dentitione febris acuta accedit parum conuelluntur; Et quicunq; dentientes pinguiore manent, & altiore somno utuntur, periculum est ne conuulsione corripiantur. At non omnes in dentitione conuulsi moriuntur; sed multi etiam seruantur. Qui hyeme dentiunt si in ijs cetera alioqui rectè se habent, liberantur; qui cum tusficula dentiunt, tardius dentes producant. Et si ipsa dentitio tarda est, magis dolet, breuiori uerò tempore minus. Propterea tentanda est, omni studio, ut breuior, et facilis fiat, hoc pacto; Si nutritrix uescatur cibo melioris succi, & faciliore concoctionis solito; et in alijs rebus non naturalibus, si uictus ratio uergat ad calidũ, & humidum, deijciente quotidie aluui; Et si à balneo subla-

Auic. lib. 1.  
F. 3. doc. 1. c.  
3.  
DEFINIT.  
MORBI.  
Hip. lib. 3. aphor. 25.  
Gal. ibidem, in comm.

CAUSA.

SIGNA.  
Hip. ibidem  
PROGNOSTICA.

Hip. de dentitione.

VICTVS  
RATIO.  
Auic. ibidem  
Paul. ibidem

MEDICA.  
RATIO.

tus infans gingivæ digitis assidua fricatione premantur; Et ex adipe gallinæ, & leporino cerebro inungantur. Et fomentationibus ex decoctione rerū, et herbarum anodynarum, tum spongia infusa fomententur, uel ex oleo liquefacto cū modica cera inungantur, aut melle, butyro admisto. Ad tollendam uerò dolorificam pruriginem, seu dentitionem, cauendum est ne infans comedat res duras, & nutriendus est uberiori cibo, ut facilius natura ab uberiore nutrimento iuuata dentes producat, quotidie balneandus est, & urgente dolore ex oleo duci calido irrorationem in eius capite infundere, conuenit, & fomentationem ad maxillas ex uino albo calido cum spongia, & in aures instillandum est oleum chamæmelinū, & amygdalarum dulcium, tepidum; caro etiam salsamenti ueteris lenit. Cerebrum etiam leporis attritum, & esum utile esse dicimus, pueris dentientibus, capite uidelicet toto elixo, ut fieri solet. Et si dolor uehementior fiat, tunc liniantur gingivæ dolentes ex succo solatri, cum oleo rosaceo calefacto. A proprietate etiam ibidem cōmendat Auicenna lac caninum, et Mesues medullam caballinam.

Gal. lib. 11. §  
simpl. med.  
fac. t. pro-  
prio.

Anic. lib. 3. §  
7. c. 16.

DE GINGIVARUM ABSCCESSIBUS EX  
DENTIVM PRODVCTIONE.  
CAP. XXVIII.

DESCR.  
PT. MORE.

CAVSÆ.

Gal. lib. 7.  
aphor. 25. in  
comm.

**A**NTEQUAM oriantur infantium denticuli, quandoque tubercula quedā in gingivis iuxta dentes nascuntur, quæ Græci *εργασίδες* uocāt, & hæc accidunt facile infantibus, ob alimen-  
tari cruditatē, qua ualdē abūdant propter dolores, et uigilias, à quibus cōtinuē uexātur in generatione dentium, tūm quia

neruſe partes nondum ſatis ualide ſunt, tūc etiam propter  
eorum crasſitiem, & aluos duras, & inditia oculis manife-  
ſta ſunt, & facile ſuppurantur abſceſſus ipſi, niſi ſoluātur,  
ſtatim adhibitis opportunis remedijs. Indicatio curationis per-  
ficitur circa uictus rationē, quemadmodū inſtituta eſt capite  
præcedenti de prurigine gingiuarū. Verū circa rationē medi-  
camentorū, præſtat in primis, quotidie ſemel tantū, in mane,  
ſtomacho ieiuno, infantē fricare, & balneare, & caput eius  
mox ex decoctione iſta calida irrorare. R. florum chama-  
meli, meliloti, pulegij, anethi, thymi, roſarū, maiorana an. M.  
i. bulliāt omnia in ſ. q. aquæ cōmunis uſq; ad tertias, poſtea cō-  
letur, & uſu ſeruetur, & ex ipſa irroretur; reſoluit enim hu-  
mores deſcendentes ad gingiuas, & confortat cerebrū. Dein-  
de bis, aut ter in die gingiua molliter digitiſ a nutrice cōpri-  
mātur, ut tuberculorū humiditas ex cōpreſſione facilius diſcu-  
tiatur. Poſtea R. olei chamæmelini, mellis, terebinthinæ an.  
drac. ij. omnia ſimul miſceantur, & ſ. a. fiat linimentum, ex  
quo calefacto, gingiua, et tendines inungantur; etenim ex oleo  
chamæmelino, lenitur dolor, ex melle fit abſterſio, & ex ſicca-  
tio humorum, & ex terebinthina fit reſolutio.

PROGNO-  
STICA.VICTVS  
RATIO.MEDIC.  
RATIO.

# DE SUPERFLUA CARNE EX DENTITIONE ORTA. CAP. XXX.

**E**X Cauſis dentitionis prædictis in capitibus præcedenti-  
bus, in extremo molari dēte, infantibus oriri ſolet etiam  
pauca quædā caro ſuperflua, quæ græcè uocatur *επωλιδ* ex qua  
interdū excitātur dolores, et febres, & inflammatio ipſius lo-  
ti affecti. Propterea cum ſigna apparuerint tū ex carne ipſa

CAUSAE  
DESCRIP-  
TIO  
MORE  
PROGNO-  
STICA.

SIGNA.

MEDICA.  
RATIO.

excreſcente, tūc ex fluxione humoris copioſa ad os, tūc uisus ratio nutrice in omnibus ſex rebus nō naturalibus eſt ſtatuenda eo modo, quo in capite de prurigine oſtenſum eſt, & caueat à uino, & cibus ſit conſuetudine leuior, & faciliſ coctōnis, & melioris ſucci. Curationem autem ſecundum medicamentorum, & indicationis rationē perſtringere oportet, hoc pacto, R. amyli drac. ij. aquæ roſacæ ꝛnc. i. pulueris iragacanthæ drac. i. miſce, et ex eis caro ipſa leniter fricetur, lentes decoctas infanti etiam ad maſticandum exhibe, & ex ipſis lentibus excorticatis fiat etiam cataplaſma, et circa maxillas apponatur, ex linimento etiam ex ipſis lentibus, parato in mortario, gingiuas inunge; nam exſiccatur, & prohibet excreſcentiam carnis, & generationem ueſicularum, quæ ſæpius oriri ſolent eo tempore; Vel alio modo, R. uini granatorum, ſucci cidoniorum, diamoron an. dr. ij. & ex eis gingiuas frica, Vel R. ſucci portulacæ, plantaginis, lactucæ, diamoron an. drac. ij. miſce, & frica.

## DE VESICVLIS GINGIVARVM.

### CAP. XXXI.

MORBI  
DESCR.  
PTIO.  
CAUSAE.  
SIGNA.  
PROGNO-  
STICA.  
VICTVS  
RATIO.

**S**I veſicula, quæ græcè dicitur *κυστιδιον*, pariter oriatur in gingiuis infantium, ex cauſis prædictis, capitibus prædictis de dentitione, cum ſigna ſatis innotescant, et affectio ſit facilis curationis, ad curationem ipſam breuiter deueniendum eſt, quæ perſicitur quantum ad uictus rationem, eo modo, quo oſtenſum eſt, capite de prurigine, quantum uerò ad medicamentorum rationem, etiam eo modo, quo declaratum eſt capite præcedenti de carne ſuperflua ex dentitione. Verum enim

enim uerò præter ipsa remedia, ista sic curationi inungito R. fa-  
 rinæ milij drac. ij. pulueris rosarum rubearum drac. i. aquæ  
 rosacæ, olei omphacini an. drac. i. s. sacchari albisimi drac. ij.  
 misce pro linimento & f. inunctio uesiculæ. Vel R. pulue-  
 ris myrrhæ, croci an. dr. i. mellis drac. ij. misce, & inunge;  
 nam exsiccat, & abstergit. Si uerò oriatur uesicula ex de-  
 fectu lactis corrupti nutricis, quod perspicies exploratione, se-  
 cundum huiusce artis primi libri institutionem, qui legendus  
 est, tunc lac uel purificetur, uel alia nutrix lactet infan-  
 tem.

RATIO  
MEDICA-  
MEN.

# DE DOLORE DENTIS.

## C A P. XXXII.

**E**T SI aliqui, cum dens sit os, sensum habere negant; &  
 ex consequentia fieri non posse, ut ipse afficiatur dolore;  
 nihilominus Gal. affirmat, dentes inter ossa euidentem sen-  
 tiendi, uim habere, & confirmat in semetipso, se manifestè se-  
 sisse, non dolentem modò, sed etiam pulsantem dentem, quem  
 admodum carnosæ partes inflammatione uexatæ consueue-  
 runt, & cum post dentium generationē ex superflua, & cru-  
 da humiditate mordicante, & à cerebro destillante, uel etiā  
 ab intemperie calida, aut ab aere, aut ab intemperie frigida,  
 aut à mora in locis frigidis, aut à lactis defectu, ueluti à con-  
 gelatione, dentis dolor aliquando in infantibus accidit. Pro-  
 pterea de ipso dolore pertractare hic nihil absurdum esse arbi-  
 tratus sum, qui græcè uocantur αλγος οδοντος cui comitan-  
 tur (si dolor erit ab humiditate, & si infantes ipsi loquela nō  
 sunt præditi) ploratus, uigiliæ, & sæpè manuum adpissio ad

Gal. lib. 5. de  
usu part. c. 2.  
Gal. de ossi-  
bus cap. 5.  
Idē lib. 5. de  
comp. medi.  
sec. loc. c. 8

CAUSAE.

DESCRI-  
PT. MORB.

SIGNA.

OCTAV  
ATMGal.lib.2.de  
comp.med.  
sec.loc.c.1.  
PROGNO-  
STIC.VICTVS  
RATIO.  
Gal.lib.5.de  
comp.med.  
sec.loc.c.8MEDICA-  
MENT.  
RATIO.PROCE  
STOMACH

LACON

os, & fluxio copiosa humiditatis ex ore, quæ si in caliditate peccauerit, tunc facies erit rubra, & totum corpus præter consuetudinem calidum; Et si in frigiditate exceßerit, nec facies rubram, nec caliditatem ipsam perspicies. Curatio istius doloris spernenda non est, cum inter maximos dolores numeretur dolor ipse, ex quo facile excitantur febres, conuulsiones, & alui duræ, & cruditates. Ratio igitur uictus statuenda est nutritici; si ab humiditate frigida, dolor sit, secundum ipsam indicationem; quæ uergat in omnibus sex rebus non naturalibus ad siccum, & calidum, & cibus sit uberior; nam dentium tenuitas ob alimenti inopiam, curari non potest; Caveat ne infans in die statim post cibum dormiat: Alius in infante quotidie excernat, si non sponte, cum suppositorijs ex melle. Sonus cocilietur in nocte longior solito, et quotidie fricetur, et mane balneetur se iuno stomacho, semel tantum; deinde ex decoctione calida herbarum anodynarum in capite de abscessibus gingivarum descripta fiat irroratio super caput infantis. Mox R. caphoræ dr. i. s. acetum iij. misce, & bulliant parum lento igne, & in infantis ore parum infunde; Vel R. opij gr. ij. aquæ ardētis unci. i. & cum coto super specillum inuoluto, cum ipsius gutta detem dolentem tange. Vel R. origani, calamintæ, hyssopi, satureiæ, dictami, radicis tytimali, chamæleonis, eryngij, uerbasci, ueratri nigri, capparorum, & cum aceto, uel uino nigro aromatino, bulliant omnia parum, postea dentes ablue. Irrorationes etiam ex oleo chamæmelino, seu anethino, rutaceo conueniunt; Vel à proprietate (hoc autoritate Rasis) dentem hominis mortui collo infantis suspēde, & miraberis. Verum si dolor fuerit à mala interperie calida, tunc uictus ratio nutritici instituat in omnibus sex

sex rebus non naturalibus, ad frigidum uergēs, ut ex prifana, alica, lactucis, et cucurbitis, et similibus in cibo. In potu caueat à uino, & bibat iura carniū; alius quotidie deiciat, & fricetur infans; Et caueat à diurno fomno, statim post cibum, à solis radijs, ab igne, & ab omnibus calefacientibus. Medicamentorum uero ratio, hoc pacto, perficitur. Radicum haliacabi, semperuiui, portulacæ, parietariæ, glychirizæ, an. pugillum s. & omnia in s. q. aceti bulliant, postea in ore infunde, & ablu. Vel R. uiolas, cum uino decoctas, & in ore eas impone. Et si dolor augeatur, tunc folia hyoscyami, lactucæ, et semina papaueris in aceto coquito, & utere. Et animaduertendum est si adest inflammatio gingiuarum, quoniā tunc acetum non conuenit; gingiuas enim corrodit; propterea acetum ipsum, tã quā acutum, & hostilem gladium deuota proprietate autem commendat. Et uis lac asininum, & pimpinellā herbam tritam, & dentibus loco emplastri appositam. Et si lac nutricis propter eius uitium, est causa doloris, exploretur, secundum artem, deinde purificetur, et curetur, uel alia nutrix lactet infansem.

p. d. l. o. c. a.

p. d. l. o. c. a.

p. d. l. o. c. a.

Aet. lib. 2.  
cap. 17.

Actiuibidē

p. d. l. o. c. a.

## D E M A P H T H I S.

## C A P. XXXIII.

**V**LCEA quæ dā in superficie oris infantibus aliquando accidunt, quæ Græci αφοας dicunt, & Arabes alcola, quæ sunt ut plurimum in ipsis infantibus, aut à lacte nutricis uitiatō, aut non probe ab ipso infante concocto, aut ab omni humore fluente, & superabundante, ut inditia indicantur ex tactu, & uisu; ex tactu dum calor, & humor

DESCRIPT.  
MORB.

CAUSAE.

Gal. lib. 6. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 4.

SIGNA.

exci

Aulic. lib. 3.  
F. 3. cap. 23.

PROGNO-  
STICA.

Gal. ibidem

A. d. H. 10 A.

C. 402

ibidem

VICTVS  
RATIO.

excitantur, ex uisu propter colorem. Nam album scilicet al-  
cola, est phlegmaticum, & salsum, citrinum, cholericum ni-  
grū, melancholicū, & rubrum sanguineū. Vlcus cholerici est  
uehementis inflammationis; sed omnibus malignius, & ma-  
gis letale est melancholicū, cuius crustæ nigrescunt. Aphæ  
in oris superficie uelociter dilatantur, & in temporibus plu-  
uiosis, & in febribus pestilentialibus multiplicantur; Et in  
infantibus aphæ ipsæ, (de quibus institutum nostrum est  
scribere) facile curantur. Ulcera ipsa sunt diuturniora, atq[ue]  
egre solubilia, & in progressu temporis putredinosi quidpiam  
acquirunt, quæ à medicis noma appellatur. Propterea in  
primis explorandū est lac, eo modo, quo in primo libro huiusce  
artis à nobis satis explicatum est, & cognita qualitate peccan-  
te, ea est in nutrice curanda, & interea per aliam nutrice sa-  
lubriorem lactetur infans. Deinde eligatur aer ad siccum,  
& frigidum uergens. nutrix exerceat se mane, & sero, una  
hora ante cibum, caueat à somno diurno, post prædium, alius  
sit lubrica, uel sponte, uel arte, & precipue in infante quotidie  
excernat. Caueat in cibo ab omnibus oleis, usq[ue] ad oleum de  
oliuis. Caueat etiam ab aromatibus, ab acris, à salitis, à  
brasica, capparibus, lacticiuijs, caseo, melongijs, nucibus, auel-  
lanis, raphanis, allijs, cepis, & porris, & ab omnibus, quæ ui-  
tiosos succos generare possunt. uescatur cibo leui, boni succi, et  
facilis concoctionis, Et si infans febricitat, caueat à uino, et bi-  
bat iura pulli, uel aquam cum seminibus coriandrorum co-  
ctam. at si non febricitat bibat uinum dilutum, in ferculis  
uerò lentem, mala cydonia, pyra, sorba, et corna ex fructibus  
cocta; ex oleribus uerò lactucam, solanum, portulacā, & endi-  
uiam.



uiam permiscere, & manducare conuenit. Et si malè con-  
coquit infans, nutrix procuret, ut ipsa primò cibum digerat,  
quod aſequetur, si cibis facilis concoctionis, & boni succi nu-  
trietur; & si post prandium, spatium temporis horarum no-  
uum saltem, ante cœnam transferit, postea stomachus infan-  
tis inungatur, oleis istis calidis R. olei de absinthio, de masti-  
che, de menta, de cydoneis an. partes æquales misce, & inun-  
ge. sacculus etiam ex absinthio, menta, chamæmelo, pulegio,  
abrotano, & rosis siccis, stomacho adhibitis præstat. Et ani-  
maduertendum est, nè lac emulgeat infans stomacho repleto,  
sed semper post digestionem, quæ facile in ipsis infantibus fiet  
per spatium horarum quinq, uel sex. Ad locum affectum  
uero, si aphthæ rubræ fuerint, ut indicatio nobis ostendit con-  
ueniunt ea medicamenta, quæ facultatem habent moderate  
adstringendi, & infrigidandi, ueluti sunt infraſcripta, R.  
diamoron, succi rosarum portulacæ, plantaginis, an. drac. iij.  
farinæ ordei drac. ij. misce, & omnia simul bene conquaſen-  
tur, postea aphthas illine, Vel R. uini granatorum, succi sem-  
peruiuæ, iuleb uiolati an. ꝑnc. s. pulueris rosarum rubrarum,  
lentium, rhu, an. dr. i. misce, & illine, Vel R. rubi, rosarum,  
balaustiorum, santalorum an. M. s. aluminis drac. ij. & om-  
nia in s. q. aquæ bulliant usq, ad tertias, cuius decoctionis R.  
ꝑnc. ij. syrupi myrtini ꝑnc. s. misce, & utitor. Verùm si mor-  
bus his peractis, non declinet, sed augeatur, addere poteris mel-  
lis rosati ꝑnc. i. unguenti ægyptiaci drac. ij. Et si aphthæ ip-  
sæ fuerint colore albæ, tunc, quia à pituita proueniunt. R. suc-  
ci lyquiritiæ, thuris, myrrhæ, nucis cupressi, mastiches, corti-  
cum granatorum, foliorum myrti, rosarum an. M. s. bulliāt

MEDIC.  
RATIO.  
Galibidem.

R omnia

omnia in s. q. aquæ ad tertias, postea coletur, cuius decoctio-  
nis R. ꝑ. ꝑ. mellis rosati ꝑ. i. misce, & ex ipsa illinan-  
tur. Si colore flauæ aphthæ uideantur, tunc solano, & semper  
uiuæ succo, aut decoctione ipsorum cum diâmoron, misce, &  
illinantur. Verum si liuidæ fuerint aphthæ, id, quod raris-  
simè, aut nunquam in infantibus euenit, nam ætas ipsa in  
calore temperata est, in humiditate uerò non nihil excedens,

Propterea difficulter ab isto melancholico morbo infantes  
si corripuntur: nihilominus si contigerit, tunc R. passularum,  
enucleatarum, fumiterræ, boraginis, epithimi, rosarum an.  
M. s. bulliant omnia in s. q. uini albi astringentis, usq. ad ter-  
tias, poste à coletur, cuius decoctionis R. ꝑ. unc. ij. mellis despu-  
mati ꝑ. unc. i. misce, & illinantur; uel R. pulueris florum cha-  
mæmeli, anethi, epithimi, fœnugræci, rosarum, an. drac. ij. mel-  
lis rosati ꝑ. unc. i. s. misce, & utitor.

DE INCISIONE FILETI SVB LINGVA  
INFANTIS. CA P. XXXIII.

DESCRIP.  
PT. MORB.  
DEFINIT.

### CAVSAR

Actius lib. 8.  
cap. 36.  
SIGNA.

**DESCRIP-  
TIO MORBI.  
DEFINITIO.** **S**i infans non expeditè loqui poterit, propter id, quod un-  
guis filetum uocat non incisum, quod nihil aliud est, quam  
vinculum nervosum, quod nisi in ipsa teneritudine curetur,  
præpedimentum loquæ parit; hoc genus morbi latine fibrarum  
linguæ colligamen, & græcè ἀγκυλωσις dicitur. Et ge-  
neratur à natiuitate, natura diminuta; Et aliquandò etiam  
generatur ab aliqua cicatrice, aut ulcere, de quo non erit ora-  
tio nostra. Qui laborant hoc morbo à natiuitate habent mē-  
branas inferiores, quibus lingua innititur, duriores, et mutile

2nd

à natura productas; & principio tardè in sermonem prorumpunt, ubi uerò loqui cœperint, citrà obstaculum, & satis festinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolatione nominum, & uerborum, quorum alias difficilis pronuntiatio existit, ueluti in quibus R. aut L. aut K. literæ frequenter occurrunt. Eximitur autem hæc affectio per solam chirurgiam, illo instrumento chirurgico, quod à Græcis ἀγκυλοτόμον uocatur, sed mea quidem sententia in infantibus modò natis melius est eam sensim dissuere, quàm repente præcidere; Et dein dès statim soluta lingua, exertanda, & super illinendum est rodomeli. & quando uolueris incidere linguam sursum attollere ad palatum oportet, et si membranæ ipsæ causa curuitatis existant, in curuo uncino eas apprehensas, & extensas excindere, animaduersione habita, ne simul subiacentes uenas dissecemus. Ab opere autem patrato, aqua frigida, aut posca os collunt, postea inspergatur, manna, thures, imponanturq; linamenta conuulsa; sequentibus uerò diebus curetur ulcus collutione aquæ mulsæ, aut illutione unguenti ægyptij, linamentis conuulsis, simul impositis. Sed hoc intelligendum est (ut arbitror) in adultis potius, quàm in lactentibus infantibus. Obstetrices uerò probæ statim post ortum infantis, solent hunc morbum numuli acie, aut unguibus, digitisue disseccare, & hoc tutius est.

PROGNOSTICA.

Actius ibide

CVRATIO.

Actius ibide

VENIV

## DE RANUNCULO.

## CAP. XXXV.

**V**ENARVM tumor ad inflàmationis similitudinē sub lingua infantibus maximè cōtigere solet, et adeò crescit,

Paul. lib. 5.  
cap. 16.  
MORBI  
DESCRIPT.

Auic. lib. 3. p.  
6. c. 17.  
CAUSA.

SIGNA.

PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

Aet. lib. 8.  
cap. 37.

RATIO  
MEDICA-  
MENT.

ac si noua lingua oriretur; Vnde à nōnullis affectio hæc, glādi-  
la uocatur, græcè uerò Βατγαχος dicitur, ab Arabibus uerò,  
ut ab Auicenna ranula dicitur; quoniam ut ipse inquit, est  
similis rane. Et causa eius est humiditas uiscosa, à capite  
descendens. Ex colore simili ranae, & tumore superficiei ue-  
narum lingue cognoscitur. Et in infantibus facillè curatur  
hic morbus; Ex mutatione enim, & prædominio humorū per  
singulas ætates exsiccatur copia humiditatis, et sic ablata cau-  
sa tollitur, secundum naturam, affectus. In adultis uerò lin-  
guæ grauedo, ab ortu, per aliquot annos perdurās difficillimè,  
uel nunquā curatur. Victus ratio debet institui uergens ad  
siccum, & calidum, ut indicatio demonstrat. Curatio uerò  
istius ægritudinis, ab Aetio duplici modo instituta uidetur;  
uno in perfectæ ætatis hominibus, sectione uenæ, & alijs re-  
medijs, quæ apud eum leguntur; altero in infantibus collatio-  
nibus tantum, quarum ratio est ista, R. salis ammoniaci cō-  
triti, gallarum contritarum an. drac. ij misce, & locus affe-  
ctus cum eo puluere, & cum saluie folijs sæpè fricetur. Vel  
R. pulueris origani, pulueris corticum granatorum, ammonia-  
ci, salis an. drac. i. s. misce, & utitor. Vel R. floris æris, traga-  
canthæ, aluminis an. drac. i. s. misce, & omnia conterantur,  
& diu fricetur (adhibito ipso puluere) locus affectus.



OMNIBONI FERRARI

MEDICI AC PHILOSOPHI

DE ARTE MEDICA

INFANTIVM,

LIBER QVARTVS.

PRÆFATIO.



*V*M huius artis partem, quæ ad mor-  
borum curationes pertinet, nimiam ma-  
gnitudinem, respectu aliarum, sortitu-  
ram esse iudicauerim, tum etiam, ut  
facilius studiosi ad ipsius artis singu-  
larum partium cognitionem perueni-  
re ualeant, eam (aliorum approbato-  
rum scriptorum insequutus exemplum) in duos libros diui-  
dendam putauit; quorum in primo agnitudines capitis in se-  
cundo omnes alias residui totius corporis complexus sunt. Et  
quia infantes multi a septimo mense, aut paulò post, uel secū-  
dum consuetudines regionum, uel propter necessitatem, man-  
ducare aliquid incipiunt. Propterea ubi curationem aliquā  
in hoc opere descriptam, nutrici tantummodo uictus rationem  
insti

instituentem inuenerint; & præter lactis emulsionem eo in morbo etiam aliquid infantem māducantem; operæpretium est, ut tunc etiam ipsi infanti instituant, in omnibus sex rebus non naturalibus uictus rationem, secundum qualitatem nutritici præscriptam, & loci, temporis, ætatis, et naturæ ipsius uires. Præterea etsi multæ agritudines, ueluti sunt tonsillarum inflammationes, & asthma, & illæ quæ descriptæ sunt ab Hip. lib. 3. aphor. 26. & aliæ nonnullæ, magis in tertia etate, quæ est inter dentitionem, et pubertatem; & extēditur usq; ad duodecimum, & tertiumdecimum annum, quàm in lactentibus infantibus contingere solent; nihilominus de ipsis etiam scribere statui, ne quid in hoc deficere ars nostra uideatur, & studiosi omnia in hoc uno opere simul colligata habere possint.

Hip. lib. 3. a-  
phor. 26.

Gal. ibidem  
in comm.

DE TONSILLARVM COLUMELLÆQ;  
INFLAMMATIONE. CAP. I.

Hip lib. 3. a-  
phor. 26.

Gal. ibidem

DEFINIT.  
MORB.

CAUSA.

SIGNA.

**Q**UANTOQUAM in infantibus lactentibus, secundum ipsius Hip. sententiam, affectio ipsa tonsillarum cōtingere non solet, sed tantummodò in tertia etate, ut expositum fuit à Galeno; tamen rationibus citatis, capite precedenti, excitatus, & ab experientia ductus, eius curationem perstringere uolui. Tonsillæ igitur sunt locorum ad isthmum attinentium inflammationes, et græcè τσαγιότις uocantur, quæ proueniunt in ijs infantibus ex influxu à capite humorum crudorum, ad ipsas partes gutturis; Dig noscuntur facile per uisum; si quis enim aperto plurimum ore toto linguam depri-  
mat, apostemia, & ulcera apparebunt; difficultas, præter hæc  
deglu

deglutiendi adest. dolor etiam, & interdum febris, unde ex ipso morbo hæc sumuntur præagia. In infantibus raro accidit hic affectus, nisi cum ceruicis uertebrae affecte loco excidunt, quo in casu infantibus illis, seu medicamentum non recipientibus, ac tanquam deploratis manum admoliri non oportet. At si tumor fiat in collo, bonum, foras enim morbus deducitur ueruntamen fauces, dolentes tenues, cū quadā difficultate strangulantes uelociter exitium afferunt, qui enim, nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit, & plurimū doloris infert, ac spirationis difficultatem; hæc enim eodem die, & secundo, & tertio, & quarto strangulat. Indicatio autem istius curationis perficitur, si circa sex res nō naturales, administrentur ea, quæ habet facultatem sistendi fluxionem, & humiditatē exsiccādi. Quapropter tū in aere, motu, & quiete, somno, & uigilia, cibo, et potu; quā in repletione, et inanitione, & accidentibus animæ, nutritrix eodē modo, quo statutū est in capite de sternutatione, cū destillatione catarrhi ab intēperie calida, regatur, ad quod se referat. Deindē infantis alius, primò, ut præscriptū est in ipso capite, ex suppositorijs ex melle, & sale gēma, & colocyntida, si opus fuerit, ducēda, et proritāda est, ex quibus humores facilius descēdūt postea circa initiū cum gargarismis ex diamorō, et aqua ordeī succurrendū est; sed quia infantes ipsi uti gargarismis minimē sciūt, propter illius ætatis imbecillitatē, Propterea uel cū coto specillo adalligato illinēda, uel lingēda est gula, aut irrorāda est, locogargarismi: Cōueniunt etiā pro gargarismo diacariō, diameū, uel rob nucū, uel syrupus papauerinus, diatragacāthū, et tragacātha simplex. Verū circa statum mel rosaceum in gargarismis

Paul. lib. 1.  
cap. 27.  
PROGNO-  
STIC.

Hip. lib. 6.  
aphor. 37.

Hip. lib. 2.  
proreth.  
tex. 53.

INDICATIO  
VICTVS  
RATIO.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Gal. lib. 6. de  
comp. med.  
sec. loc. t. 3.

Paul. lib. 3.  
cap. 26. v.

Paul. lib. 3.  
cap. 26. v.

gargarismis iniungendum est, ad adiuvandam maturationem, & ficus, & passulæ iniungendæ sunt. Communiter enim cum tonsillis, tum columella inflammatis, aut exulceratis, in principio convenit quies, inedia; & consequens dieta; gargarismi simplices leniter astringentes, in vigore morbi alius subducantur; gargarismi ex decocto ficuum, aut ptyssanæ succo, in quo passulæ sint coctæ. Si uero tonsillæ ad suppurationem uenturæ, gargarismi fient ex decocto ficuum, aut aqua mulsæ calida. Solent etiam mulierculæ ad exsiccandam humiditatem cerebri, apponere in capite infantis stuppam canabis calidam conexam. At si in febricula tonsillæ, & columella inflammantur, gargarizationes cum furfarum, aut rosarum, aut palmarum, aut myxarum, aut lentium decocto competunt, & etiam succus mali punici dulcis cum corticibus contritus parte vi. cum mellis parte i. simul ad mellis usque crassitudinem decoquantur, & inungantur commendo; similiter cinerem sylvestrium hirundinarum à proprietate; nec non lanis succidis collum utiliter protegimus, siue irrigationibus olei olinarum, aut fomentationibus ex oleo chamæmelino, ad sedandum dolorem, & digerendum locum affectum, sæpe fouemus; Cataplasmatibus etiam utimur confectis ex ipso cinere, & luto nidorum hirundinum, & rosis contritis, & floribus chamæmeli, & pinguedine gallinæ, & polenta ordeacea, uel simpliciter lanam succidam, oleo chamæmelino intinctam apponimus.



DE TUSSI EX DESTILLATIONE.

C A P . I I .

CUM nostrum consilium sit, uel prout nos docuit experientia, uel authoritas aliquorum approbatorum scriptorum, de morbis, qui latentibus infantibus contingunt, pertrahere. Propterea cum ego sepius nonnullos infantes tussilaborantes curauerim, & cum Hip. dicat, in etatibus autem talia contingunt paruis, & nuper natis puerulis, uris ulcera, (quæ aphibæ uocantur) uermis, tussis, uigiliae, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates. Igitur de ipsa tussirationabiliter animum ad scribendum duximus, quæ nihil aliud est, quàm uehementissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrimè foras erumpens impetu suo extrahit, exploditq; excrementa meatum ipsius obstruentia, quæ Græci appellant Βίχας; huiusce autem morbi causa est in ipsis infantibus, ut plurimum, humor à capite, ad asperam arteriam destillans ab aeris frigiditate, caliditate uè excitatus congregatusq; : infantes enim in utero materno assuefacti ad aeris caliditatem, demum in lucem producentes, gelidi aeris causa prouocantur ad destillationem, ut dictum est capite proprio lib. iij. uel importuna lactis ingurgitatio ad ipsam asperam arteriam descendens, uel lumbrici stomachum infestantes, et tussiculam paruam excitantes; Et ex signis, istis percipies, an tussis à destillatione frigida proueniat; uidelicet si circa fauces aderit uiscosa pituita, uel superflua humiditas; Et si aderit pallor in facie infantis, sine siti, & si iuuatur a calidis. Verum si fuerit à destillatione catarrhi calidi, tunc erit ru-

Hip. lib. 3.

aphor. 44.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

cap. 4.

</

bor in facie, sitis; Et à frigidis subleuari uidebitur. Et se pro-  
 uenerit ab importuna lactis ingurgitatione, cum infans lactis  
 emulsionē incipit, tūc tussis excitatur, & cessante emulsione,  
 exiguo temporis spatio, tussis cessat; At si à lumbricis sto-  
 machum infestantibus proueniat, non inuenies in faucibus  
 humiditatem; nec pituitosum excrementum, & tussis parua  
 erit, quæ plerunq; perducit ad sputū sanguinis. At qui gib-  
 bi ex anhelitu, aut tussi efficiuntur, antè pubertatē intereūt.  
 Et interdum ex uehementi, & inueterata tussi ducuntur in-  
 fantes ad phthisim, & hecticam, & ad herniam. Curatio ue-  
 rò cum tribus indicationibus diuidatur; una est, quæ ad lum-  
 bricos; altera, quæ ad lactis ingurgitationē; tertia, quæ ad ipsā  
 destillationē pertinet; Ea, quæ à lumbricis causam trahit in  
 capite proprio de lūbricis, in isto libro absoluetur, et declarabi-  
 tur; Et ea, quæ ab ingurgitatione lactis uiolēta generatur, cu-  
 rabitur; si nutrix summa cū diligentia lac exhibuerit infan-  
 ti, adeo non ut in superflua quantitate pro qualibet uice ipse  
 infans lac emulgeat; & tempore, quo optima in stomacho  
 concoctio facta sit. Reliquum est, ut de tussi, quæ ab ipsa  
 destillatione fit, uerba faciam, & bifariam diuidatur, uel ab  
 intēperie frigida, uel à calida. Quoniam si ab intemperie fri-  
 gida prouenit, tunc aer eligatur ad calidū, & siccum uergens,  
 & nutrix exerceat se quotidie, hora una, antè cibū, caueat à  
 somno diurno post cibum, & infans pariteri statim post lactis  
 emulsionem in die non dormiat, & somnus sit breuior solito,  
 & dormiat capite eleuato; nam supinum dormire, malū est;  
 Alius sit lubrica; & præcipue in infante, cum suppositorijs  
 soluenda est, si opus fuerit; Caueat à uino, replet enim caput.

Auic. lib. 3  
 F. 10. cap. 4.

PROGNO-  
 STIC.

Hip lib. 6. 2.  
 phor. 46.

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

eb. 5. 1. 160

VICTVS  
 RATIO.

eb. 5. 1. 160

& prouocat destillationem; caueat etiam in cibo ab acetosis,  
 salitis, oleribus, alijs, cæpis, porris, & raphanis, à fructibus, à  
 leguminibus, à piscibus, à carnibus bubulis, ouillis, grossis,  
 humidis, uiscosis, crassis et ijs, quæ sunt difficilis concoctionis,  
 & mali succi. Deinde quotidie secundum consuetudinē fri-  
 cetur, & balneetur infans, et quia expedit, ut in primis, quod  
 fluit, & tusim generat, prohibeamus, postea, quod fluxū est  
 euacuemus. Propterea ad prohibendum, & diuertendū, con-  
 ueniunt fricationes, & balnea, ad tollendum uerò quod flu-  
 xum est, laudo, prout ego fœliciter sapissimè expertus sum, ut  
 infanti manē, & serò, & præcipue cum tussis eum infestat,  
 exhibeatur cochleare unum, uel duo olei amygdalarū dulciū  
 recentis admisti, cum s. q. pulueris sacchari candidi, aperit in-  
 uentrem soluit, tusim emollit, & leniter sine nocumento pi-  
 tuitam educit; mox ad corroborandū cerebrū, & resoluendā  
 materiā illā crudā destillationē facientē, ablutiones capiti in-  
 fantis ex ista decoctione facere poterunt R. chamæmeli, me-  
 liloti, baccharis, maioranæ, rosarum, an. M. i. misce, & omnia  
 diligenter in lineo panniculo, postea bulliant in s. q. lixiuij dul-  
 cis usq; ad tertias, & ablue, & post ablutionem cum pannicu-  
 lis calidis caput, exiccetur, nec non pectus, & totus thorax  
 inungatur ex isto linimento calido R. olei amygdalarum dul-  
 cium, unguenti pectoralis, butyri ueteris, an. ꝑ. unc. s. misce, &  
 inunge. Exhiberi etiam poterit sæpè in die modicum ex in-  
 fra scripto electuario R. mellis optimi despumati, olei amyg-  
 dalarū dulciū, succi liquiritiæ an. dr. iij. pulueris myrrhæ, tra-  
 gacanthæ, galbani an. scrup. s. misce, et f. electuariū, et utere, et  
 præcipue cum tussis infestat; Et si fuerit difficultas anhe-

MEDICA-  
 MENT.  
 RATIO.

litus, pulvis seminum lini cum oleo amygdalarum dulcium  
 recenti admisceatur, & præbeatur infanti. Verum si tussis  
 generetur à destillatione catarrhi calidi, tunc aer potius adfri-  
 gidum uergat, quàm ad calidum, & nutrix, & infans recte  
 se habeant in sex rebus non naturalibus, prout supra præceptum  
 est; Et caueat ab omnibus supra statutis, & prohibitis; Nec  
 non ab omnibus, quæ rationem habent calefaciendi, prout ab  
 igne, à sole, à uentis, ab aere nocturno, et similibus; capitis etiã  
 ablutionibus, et nihil capiti infantis superponatur: fricationes,  
 & balnea quotidie fiant, lingua infantis, mane ante lactatio-  
 nem, molliter comprimatur, ut facilius euomat; nam uomi-  
 tione mirum in modum pituitam euacuabit, & deinde ea ho-  
 ra, qua magis tussis infestat, infanti tribuatur ex oleo amy-  
 gdalarum dulc. & saccharo candido in puluerem resolutum, ut  
 dictum est, cochleare unum, uel duo ad lambendum, uel R.  
 sacchari penediati dr. ij. syrupi iuiubini ꝑnc. s. misce, & cū  
 tussit ad lambendum detur, nam momento tussim ipsam se-  
 dat, & emollit; Vel R. sacchari candidi contriti dr. ij. aqua  
 uiolatæ ꝑnc. i. succi lyquiriitæ drac. s. misce, & da ad lambē-  
 dum. Pectus pariter ex oleo amygdalarum dulcium, tantū  
 calido mungatur manè, & serò. Vel si erit infans ætatis an-  
 norum duorum, uel circa, tunc R. seminum cucurbitæ, cucu-  
 meris, melonum, citrulli, lactucæ, endiuie, scariolæ, portulacæ  
 an. scrup. i. contendantur omnia, & ex eis s. a. cum aqua  
 uiolarum fiat lac, in quo dissolue lochsani, & experti ꝑnc. i.  
 conferuæ uiolarum, rosarum an. drac. i. rob granatorum, mu-  
 sorum, rob de ribes, oximellis simplicis an. drac. s. misce, & co-  
 letur, & ex eo ad lambendum sepe detur; Ego etiam sepe  
 fæli

feliciter in destillatione expertus sum ( dummodo lac nutriti-  
uiatum non sit ) lac eius tantum cum puluere sacchari can-  
didi admistum infanti, cum tussis infestat, quæ leniter emol-  
lit, & sedat.

DE ASTHMATE.

CAP. III.

**C**UM Infanti adierit modica respirandi difficultas, hic  
affectus à Græcis uocatur *Ασθμα* & cum uehemen-  
tior sit, & spirare æger sine anhelitu, & sono non potest, tunc  
uocatur *ασπυ*; si uero accidat in spirando, ut non nisi recta  
ceruice spiritus trahatur, tunc *ορθοσπυ*, nominatur; Vnde  
sic definitur sicca orthopnoea ea est spirandi difficultas, quæ  
sine sputis, uel tussi usq; adeo uehemens, ut inclinari citra suffo-  
cationem, qui ita afficitur, non possit. Sed multe sunt spiran-  
di difficultates, tamen solam illam Hip. consuevit asthma  
nominare, in qua contingit satis crebrum anhelitum fieri, quæ  
Auic. inter ægitudines infantium uocauit anhelitus mali-  
tiam, & ipse Hip. dixit loquens de ipsis infantium ægri-  
tudinibus, Cum uero iam magis adoleuerint, crebri anhelitus, quos  
Græci asthmata uocant. De qua anhelitus crebritate, seu  
asthmatis specie sola à nobis pertractare decretum est, insequen-  
tibus iudicium ipsius Hip. & Auic. qui in infantibus de  
omnibus alijs speciebus, tanquam superfluis, scribere præter-  
miserunt; Et quæ prouenit à materia crassa, à capite descen-  
dente, cum in pulmonis bronchijs fuerit infarcta, & excita-  
tur à caliditate, uel frigiditate aeris extranea, à casu, à per-  
cussione, à nimia agitatione, à fumo, & à malis uaporibus, &

odo

DESCR-  
PTIO  
MORB.

Gal. lib. 4.  
de uic. rat.  
acu. com. 28

Gal. lib. 6.  
aphor. 46 in  
comm.

Auic. lib. 2.  
E. 3. doc. 1.  
cap. 3

Hip. lib. 3.  
aphor. 26.

CAUSA.  
Gal. lib. 7. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 6.

odoribus. Et cognoscitur ex anhelatione frequenti, & spirandi difficultate, & quia interdum materia faciens asthma est, (prout dictum est) in pulmone infarcta, & aliquando in aspera arteria, si erit in pulmone, tunc aderit gravitas pectoris, creatus, tus sis laboriosa, & difficultas anhelitus. Si uero erit in aspera arteria, sonus aderit, qui est ueluti in dormientibus oregmō in respirando, et tus sis, et creatus facilis erit. Haec affectio in febre intermittēte, leihale; Et qui gibbi ex asthma te, aut tus si sunt, antē pubertatē moriuntur, et asthma in senioribus forsā nō sanatur, et iuuenibus, ut plurimum, est difficilis, & longa. Verū curandi indicatio, prima est electio aeris tēperatæ caliditatis, & siccitatis; postea nutritrix, & infans recte se habeant, in omnibus sex rebus non naturalibus; Et caueant ab omnibus tā in cibo, quā in potu; quæ descripta sunt capite præcedenti de tus si, nec nō caueāt a malis uaporibus, & odoribus a fumo: Bibat nutritrix decoctionē pectoralis, quæ hoc modo paratur R. ordeï mundi, passularum enucleatarum, lyquiritiæ rasæ, capillorum ueneris, uiolarum an. M. iuiubarū, num. xij. ficuū num. x. bulliant omnia in s. q. aque pluuiæ, usq; ad consumptionem tertiæ partis, postea coletur, et usui seruetur. Deinde primū infantis aures, collū, et linguae radix inungatur quotidie ex oleo oliuarū, uel ex oleo amygdalarum dulcium, & pectus pariter inungatur, cum inunctione in capite præcedēti de tus si, descripta; quibus inunctionibus facile concoquuntur, & interceptiuntur cruditates illæ superflue, quæ tam per adenes descēdunt, quā quæ in pectore sunt. Præterea Auic. commendat, ut cōprimendo linguam infantis uomicū excitemus; ex quo summum beneficium assertur infanti;

STGNA.

Auic. lib. 1.

Fr. 1. doc. 1.

cap. 3.

PROGNO-

STIC.

Hip. lib. 4.

aphor. 50.

Hip. lib. 6.

aphor. 46.

Auic. lib. 3.

Fr. 10 cap. de

fig. asthma-

tist.

VI CT VS

RATIO.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

Auic. libidem

MEDICA-

ENT

ATIO..

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

A. 1. 1. 1.

Auic. libidem

infanti; cōmendat etiam, ut in ore ad lauandum, & absterge-  
dum linguam uuulam, & colli regionem aqua calida irrore-  
tur; demum laudat hunc lābitium R. seminis lini in pulue-  
rem resoluti ꝑnc.s. mellis crudi ꝑnc.i. misce, & f. s. a. lam-  
bitium, de quo ad quantitatem unius fabæ infanti pro quā-  
libet uice exhibeatur, & si opus fuerit, cymini contriti, parū  
iniungito; Cuminum enim ipsum humores pituitosos uiscidos  
incidit, & asthmaticis confert. Vel R. loboc de pino, diaprasi,  
diapapaueris, syrupi de hyssopo an. drac. ij. misce, & utitor, in  
quantitate unius fabæ, Oregmon uerò, qui in dormientibus  
infantibus asthmaticis contingit, nil aliud est, quā pectoris so-  
nitus; curatur pariter eo modo, quo supra dictum est, de ipso  
asthmate: At non ille curatur oregmō, qui prouenit à perip-  
neumonia præcipue, & ab alijs morbis, quoniam est indicatiū  
proximæ mortis: Fæliciter etiam curatur sonus, siue oregmon  
in asthmate, si sæpe infanti exhibeatur huius electuarij pro  
qualibet uice quantitas unius fabæ R. conseruæ nimphææ, ro-  
sarū an. dr. ij. manus christi, trochisorū de cāphora, diarhodon  
an. dr. s. electuarij de gemmis frigidi scrup. ij. syrupi de hyssop-  
o q. s. ad incorporandum misce, & f. s. a. lambitium.

.AKOT3

Auic. ibidem

ib. t. III. c. 13

ib. t. III. c. 13

ib. t. III. c. 13

ib. t. III. c. 13

## DE STOMACHI DEBILITATE.

### CAP. IIII.

STOMACHI imbecillitas in infantibus, quæ nihil aliud est,  
Squā ipsius uentriculi uirtus, in coquendo minime functio-  
nem suam obire potens, ut plurimum à mala lactis quali-  
tate, uel à corruptione aeris generatur, uel etiam fit

DEFINIT.  
MORE.  
Auic. lib. 3. F.  
13. trac. 2. c. 4.  
Gal. lib. 8. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 3.  
CAVSAB.

ex



## SIGNA.

Galenus

Gall. lib. 1. de  
loc. aff. c. 4PROGNO-  
STIC.VI CTVS  
RATIO.Aulic. lib. 1. F  
3 doc. 1. c. 3

ex copiosa humiditate in ipso sinu, & uentriculi spatio, sine ui-  
tio contenta, & hoc præcipue, in infantibus, qui copiosa humi-  
ditate abundant, et affectio ipsa græcè *υποτακτος* uel *αυτην*  
*σημα* uocatur. Signa si à mala qualitate lactis nutritici  
proueniat, ex uisu, et experientia apparebunt, si periculū fiat,  
& lac exploretur, prout à nobis ostensum est in primo libro  
huiusce artis, qui legendus est, ut rota res facilius intelligatur.  
Apparebunt, postea si ab aeris corruptione, uel à copiosa hu-  
miditate prouenient signa ipsa, non tam ex difficultate dige-  
stionis, alui constrictione, & grauitate, et cibi fastidio, quæ ex  
ructibus acidis, & aliquando ex nausea, & uomitione. Quod  
si humor quispiam in ipsis uentriculi tunicis cōtineatur, nau-  
sea quidem uexabit. Et quia ex hac affectione aliquandi  
sequuntur diuersæ egritudines, & præcipue, quæ à crudita-  
te proueniunt, propterea statim succurrendum est. Et si à la-  
ctis qualitate originem trahat, alia nutrix lactet infantem;  
Et prima curetur, secundum indigentiam ipsius lactis. Ipse  
nutrici uerò, quæ nutrit infantem, prout sumitur ex ipsa in-  
dicatione in sex rebus non naturalibus uictus ratio institua-  
tur ad calidum, & siccum uergens; Et si alius infantis natu-  
raliter non excernit, quotidie subducenda est suppositorijs ex  
melle, & sale gemma compositis. Deinde stomachus infantis  
ex musco, cum aqua rosacea, uel myrti admisto inungatur,  
roborat enim ipsum stomachum, & suauissimè etiam corro-  
borat cerebrum; nec non exhibere poteris aliquantulū ex isto  
electuario, quotidie stomacho ieiuno, R. succi cydoniorum,  
succi mentæ an. ꝑ. unc. ij. s. sacchari ꝑ. unc. iij. misce, & parum  
bulliant; postea adde pulueris caryophyllorum, cinamomi, ga-  
lange



langæ, mastiches an. scrup. s. misce, & s. a. f. electuarium, et utere. Vel alio modo R. succi cydoniorum clarificati ꝑnc. iij. gallie, muscatæ, zingiberis, mentæ, mirrhæ an. scrup. s. conterantur omnia subtiliter, & cum saccharo q. s. misce, & f. lambitium, de quo sæpè sumat quotidie, uel R. specierum aromatici rosati, specierum aromatici caryophyllati, secundum descriptionem Mesuæ, specierum diacymini an. dr. i. saccharo, & aqua rosacea an. q. s. misce, & lento igne s. a. f. confectio in rotulis unius dragmæ pro qualibet rotula, ex quibus quotidie stomacho ieiuno unam suscipiat infans; poteris etiam quotidie manè stomachū infantis inungere ex oleo de absynthio, uel ex masticeis, uel ex menta; & si opus fuerit etiam ex caryophyllis, & de nuce moscata; sacculi etiam parari solent ex rosis siccis, menta, absynthio, chamæmeli, abrotano, pulegio, calamento, & stomacho adhiberi, qui ualdè concoctionem adiuuant, & uentriculum ipsum corroborant.

## D E V O M I T V.

## C A P. V.

CUM stomachus expellit per os ea, quæ noxia sunt, tunc dicitur uomitus, græcè autem, *ῥεωτος* & differt uomitus à nausea; Nausea enim præcedit ipsum uomitum, & nihil aliud est, quàm quidam conatus ad uomitionem, quæ græcè dicitur *ναυτία*. Vomitus uerò est affectus uentris superioris, uel multitudine grauati, uel ciborum, excrementorum uel qualitatem non ferentis, similis diarrheis. Vomitus autem infantibus fieri par est, propter lactis, quod assumunt multitudinem.

DESCR.  
PTIO  
MORB.DEFINIT.  
NAUSAE:Gal. lib. 3. de  
nat. fac. c. 15  
DEFINIT.  
MORB.Gal. lib. 3.  
aphor. 24. in  
comm.  
CAUSAE.

dinem. Et præter ipsam causam, fit etiam propter imbecillitatem ipsius stomachi, uel propter aeris corruptionem, uel mali odoris, et semper uomitionem præcedit, ut dictum est, nauſea, subuersio, tremor labiorum, & hypochondriorum tensio.

Auic. lib. 3.  
F. 10. trac. 5

Et si multæ differentiæ enumerari poterint à diuersis causis excitatis; nihilominus cum à Galeno in ipsis infantibus, una tantum enarrata sit causa, quæ est à multitudine lactis; et ea, quæ est ab imbecillitate uentriculi, propter humiditatis multitudinem, iam satis in præcedenti capite declarata, & præscripta sit, & ea, quæ fit, uel ab aere, uel à malo odore, mutatione tantum curatur. Reliquum est, ut ego quoque auctoritatem ipsius Gal. sequens, de ipsa tantummodò uerba faciam. Quæ cum proueniat ex copiosa lactis assumptione,

SIGNA.  
Hip. lib. 7.  
aphor. 3.

PROGNO-  
STIC.

Auic. lib. 4.  
F. 2. trac. 1.  
cap. 29

Hip. lib. 2.  
prognost. c.  
7. tex. 38.  
VI CT VS  
RATIO.

Auic. lib. 1.  
F. 3. doc. 1. c.  
31.  
MEDIC.  
RATIO.

apparebit circa stomochum tensio, & grauitas, & post uomitionem subleuabitur infans; à uomitu enim singultus, & oculorum rubor, malum, & uomitus colore albus, aquosus, citrinus, & rubrus uehementer, & obscurus, est malus, et deterior est, qui est sicut flos æris, & niger; Et cui succedit spasmus interficit statim, Vomitio autem utilisissima est, quando est, pituitosa, & bile permista. Curatio, quantum ad victus rationem, ut indicatio ostendit, instituatur, magis uergens ad calidum, & siccum, quàm ad humidum, & frigidum; Et nutrix uescatur cibis boni succi, & facilis concoctionis, & multitudinem lactis infanti interdicat. Et aluus infantis quotidie excernat, uel sponte, uel arte, cum supposituris prædictis, capite præcedenti, & pluribus alijs in locis. Deinde nutrix caryophillos mastice, & in os infantis decenter immittat, & sic pariter cinnamomum, commendan-

tur etiam emplastra. cum medicamentis debiliter uomitum  
 constringentibus. prout, R. pulueris rosarum rubeorum, sanda-  
 lorum rubeorum, granorum myrti, mentae an. ꝑ. unc. s. olei cydo-  
 niorum, de mastiche an. partes aequales q. s. misce, & f. empla-  
 strum. Verum quia aliquando contingit, propter assiduam vo-  
 mitionem, lac ipsum putrefieri; propterea, ea, quae excernuntur  
 conspicienda, et odoranda sunt. Etenim si odor acidus sit, tunc  
 R. thuris contriti, pulueris rutae, mentae; an. scrup. s. syrupi de  
 rosis siccis ꝑ. unc. s. misce, & infanti ad lambendum praebe; con-  
 uenit etiam admiscere cum ipso syrupo parum ex pulueribus  
 cymini, & sumachij, & infanti exhibere; omnia etiam, quae  
 descripta sunt capite praecedenti conueniunt; uel si opus fuerit,  
 R. pulueris mastiches, ligni aloes an. drac. s. galliae, acatiae, oli-  
 bani, caryophyllorum an. scrup. i. panis usti ꝑ. unc. i. olei de me-  
 ta. uel de cydoneis q. s. ad incorporandum misce, & f. empla-  
 strum; & stomacho adhibeatur calidum.

## D E S I N G V L T V.

## C A P. VI.

Q V A N D O stomachus ex deprauatis functionibus ex-  
 pultriciis, et retentricis, quasi conuulsio oris eius, motum  
 quandam uehementem, & uolentem facit, ex quo rem, quam appetit os  
 eius, et a retetrica non secundum naturam amplectitur, infestatem ex-  
 pellere conatur; affectio ipsa a Latinis singultus, & a Graecis  
 ἀνρύπος, uel ἀνρύξ uocatur, causa traditur ab Hippocrate conuulsio  
 fit, uel ex repletione, uel inanitione, ita uero, et singultus, nihilo-  
 minus magna ex parte a plenitudine fit singultus, ut indicat pueri

DEFINIT.  
 MORB.  
 Gall. lib. 3. de  
 caus. sympt.  
 cap. 2

Hip. lib. 6. a-  
 phor. 39.  
 Gal. lib. 6. a-  
 phor. 13.  
 CAUSAE.

Gal. lib. 8. de  
comp. med.  
sec. loc. c. 3.

SIGNA.

PROGNO-  
STIC.  
Hip lib. 6. a-  
phor. 13.  
Hip. lib. 5  
aphor. 3.  
Hip. ibidem  
Hip. lib. 7.  
aphor. 3.  
Hip. ibidem

crebrò singultientes, cùm sunt repleti; rarò autem ab inanitione, Nec non Gal. ipse asserit singultum etiam fieri uidisse ex acribus, & serosis humoribus, & medicamentis stomachum mordentibus, quos ubi uomitu reiecerint, statim singultu liberantur. Qui etiam ex deuorato pharmaco, ex tribus piperis generibus constante, uel ipsomet pipere tenuiter cribrato, si statim uinum postea biberint, & præsertim calida aqua temperatum, omninò singultiunt, & subiungit. Quamuis pueris maximè ob corruptionem alimenti in uentre, aut ob eiusdem partis frigiditatem singultus accidat. Et si singultus ex repletionem fit, signa erunt motus singultus subitus, sine aliquo morbo, & post uomitionem, uel alui deiectionem, liberatio, ante cibum stomachi alleuiatio, post uerò grauedo. Si ex inanitione, diuturna alui solutio, dysenteria, febris, uel immodicus sanguinis fluor, si ab erosione stomachi ex humoribus acrioribus post concoctionem suscitatur singultus. Et si ex tribus piperibus singultire contingat; quanquam in infanti rarò, aut nunquam hoc accidat, nihilominus ex relatione uel infantis, uel nutricis, si infans loquelæ expers non sit, facile percipi poterit. At in ipsis infantibus, plerumq; post copiosam lactis emulsionem contingit, & præcipuè in ijs, quorum nutrices sunt humide, & habent corpus plethoricum, & plus, quàm oportet edunt, bibuntq;. Prognosticandum uerò est, fore ut singultus sternutatio superueniens tollat, & ubi sanguis multus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum, et ex superflua purgatione similiter conuulsio, aut singultus superueniens, malum. Item à uomitu singultus, & oculorum rubor, malum; Indicat enim, uel cerebrum, uel uentriculum pati inflammationem,

zationem, Et similiter si ab ileo singultus fiat; Et si singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus fuerit, mortem non longè abesse denuntiat. *Victus ratio* autem, si à plenitudine est singultus, ut nobis ostendit indicatio, in omnibus sex rebus non naturalibus, instituat, uergens ad calidū, & siccum, & quotidie prouidendum est infanti, omni diligentia, ut aluus excernat, uel sponte, uel arte, adhibitis supposito-rijs, aut clysterijs. Postea sternutatio cum modico puluere piperis, uel sinapis, uel castorei in naribus insufflato, excitanda est. At si opus fuerit, uiolentior motu, linguam eius aut digito comprimendo, aut pēna oleo intincta uomitus excitetur, ut materia peccans euacuetur, & cum infanti accidit singultus, tunc ei danda est nux indica cum saccharo. Vbi uerò quis ex tribus piperibus sumpserit pharmacum, & singultiat, olei amygdalarum dulc. ꝑnc. iij. uel aquam ordeī, cyathum unū sumat calidum, uel uomitum excitet. Singultus autem si à lactis mala qualitate proueniat, tunc alia nutrix lactet infantem, donec primæ lac reducat ad æqualitatem, & sanitatem. Et si ex frigidis humoribus generetur singultus, deambulationes, fricationes extremarum partium conueniunt, & somnus longior solito, & inunctiones ipsius uentriculi ex oleis de castoreo, sycionio, styrace, & mastiche, & spiritus retentio, & admotio linteorum calefactorum non rarò iuuat. Verum ubi ab inanitione ortus fuerit singultus, curabitur per alimentum conuenientis assumptionem; & balneo calido ex aqua dulci, uel ex lacte balneandus est quotidie, manè, stomacho ieiuno, & postea oleo amygdalarū dulciū inungendus; Et si per etatē licet, cibā dus est ptisana, et aquæ melonū bibēda sunt.

Aecius lib. 9  
cap. 5.

VICTVS  
RATIO.

Hip: ibidem

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Gallib. 8. de  
co mp: medi.  
secloc: 3.

Aulic lib. 1.  
F. 3. doc. 11.  
cap. 3.

Aecius ibidē

## DE COLICO SEV VENTRIS DOLORE.

## CAP. VII.

DEFINIT.  
MORB.  
Gal. lib. 11.  
met. med. 2.7

CAUSAE.

SIGNA.

Gal. lib. 2. de  
loc. affe. c. 5  
Auc. lib. 6.  
trac. 3. c. 7.

**C**V' M nihil aliud sit dolor, quā tristis sensatio, à subita  
Cac uiolenta mutatione facta, ad tactum tantummodò  
pertinens, & omnis dolor euenire soleat, aut per cōsensum, aut  
primario affectu, si in uentre infantium contingat; ut aliquā  
dò fieri uidetur, adeò ut torqueantur, et miserrimè plorent, cū  
est in toto uentre, erit in omnibus intestinis; & tunc à Græci  
uocatur αλγος γαστρικος cū uerò erit in parte, prout in crassi  
intestinis, tantummodò ab affecto loco dicitur καλινη δυσεντερια.  
Si in gracilibus intestinis, tunc uocatur uoluulus à Latinis, et  
à Græcis, ελεος, sed de ista specie morbi scribere opus nō esse  
iudicaui in hoc opere; quoniam eam in infantibus nunquam  
contingere uidi, nec auctorem approbatum de ea scribentem;  
propterea de solo colico dolore agendum esse censeo; cuius cau-  
sa, ut plurimum est in infantibus, humiditas cruda, qua ual-  
dè abundant, uel propter lactis malam qualitatem, uel propter  
imbecillitatem uentriculi, excitatam ab hypochondriorū par-  
tibus obstructis, etiam uel à balnei frigiditate, uel etiam à fri-  
giditate pedum, propter humiditatem generatur; Et aliquan-  
dò si aliquid præter lac, sumpserit in cibo, à mala ipsa quali-  
tate cibi, ueluti à fructibus fugacibus, & similibus; indicabūt  
signa ista; si cum ploratu continuè infans contorqueatur, &  
si aluus constricta sit: Et si aliquandò uomitus infestet,  
& si suis intensa, & uigilie perseuerent. Et si à cru-  
da humiditate dolor ipse excitatur, tunc uomitus, & ten-  
sio, & tormina aderunt. Verum si à flatu dolor genere-  
tur, tunc ructus plures, & flatus abundabunt, & do-  
lor

lor mobilis erit, adeò ut quandoq<sup>ue</sup> in uno, & quãdoq<sup>ue</sup> in altero loco percipiatur. Prædicere autẽ dolores cõuenit, qui cū febre affligūt circà lūbos, et inferas sedes; si præcordia attigerint, in feras sedes relinquẽtes, exitiales admodū sunt. Et quibus tormenta, et circà umbilicū labores. & lūborū dolor, qui neq<sup>ue</sup> medicamẽto, neq<sup>ue</sup> aliter soluitur, in aquā inter cutē siccā firmatur. Et dolores uētris sublimes leuiiores, qui uerò non sublimes fortiores, et in forti dolore uētris partiū extremarū frigiditas, malū, et à uētris dolore diurno suppuratio. Indicatio autem istius curationis, hoc pacto, perficitur, cū oīs dolor in genere dupliciter curā admittat. Primo in remotione eius causæ, qua ablata tollitur affectus, .s. dolor. Vel alio modo in sedatione ipsius doloris. Propterea si à lactis qualitate prouenit, ut remoueat<sup>ur</sup> ipsa causa, alia nutrix lactet infantē, donec prima secūdū artē curetur. Si uerò ab humore crudo, tunc uictus ratio instituat<sup>ur</sup> ad calidum, & siccum, uergēs in oībus sex rebus nō naturalibus, et nutrix uescatur cibis boni succi, et facilis cōcoctionis. Veruntamē quia Hip. lac dare, quibus ilia suspēsa murmurant, esse malū docet. Propterea si infans est etatis annorū duorū, uel circà, si possibile erit, per diē salē naturalē, lac non emulgeat, sed nutriatur ferculis cum pane, uitellisq<sup>ue</sup> ouorum, & oleo amygdalarum dulcium, conditis: Et statim (prout ego sepē feliciter expertus sum) exhibeant<sup>ur</sup> ipsi infanti unc. iij. olei amygdalarum dulc. recentis, per horas quatuor antē cibū: soluit. n. uentrem, & dolorē lenit: Deindē perseuerāte dolore fiāt fomētationes, hoc modo paratæ R chamæmeli, meliloti, thymi, pulegi, rosarū, an. M. i. seminum lini, anisorū, fænigreci an. drac. ij. misce, & omnia bulliant in s.q.

PROGNO-  
STIC.  
Hip. lib. 2:  
prognost. c.  
13.

Hip. lib. 4. 2-  
phor. 11.  
Hip. lib. 6  
aphor. 6.  
Hip. lib. 7  
aphor. 16  
Hip. ibidem

VICTVS  
RATIO.

Hip. lib. 5. a-  
phor. 64

RATIO  
MEDICA-  
MENT.

uini albi; mox cum spongia infusa, bis in die, per horam unā, ante cibum, & postea optimè expressa, statim calida, fomentetur ter, aut quater locus dolens; & inungatur oleis istis calidis. R. olei anethini, de ruta, de chamæmelo an. ꝯnc. s. misce, & inunge. Verùm si à flatu prouenerit dolor compertum est tantummodò cum fomentationibus præmissis dolorē ipsum sedare; sed tamen prius aliquo clystere communi aluo subducta, hunc in modum parato. R. florum chamæmeli, meliloti, thymi, maluarum an. M. i. seminum anisorum, cumini, an. drac. ij. misce, & bulliant in s. q. aquæ ad tertias. postea coletur, cuius decoctionis R. ꝯnc. vi. olei de ruta ꝯnc. ij. mellis rosati ꝯnc. ij. sacchari ꝯnc. i. salis q. s. misce, & cum parua ad scribendum penna anseris, utroq; capite reciso alligata ad collum uesticæ unius, in qua prius posita sint omnia, clystere parata penna intromittatur in anum, & s. a. f. clyster. Vel apponatur super locum dolentem cucurbitula sicca sine scarificatione, resoluit enim mirum in modum flatu omnes, & uidetur habere incantamenti similitudinem.

Gal. lib. 12.  
met. med. c. 8

D E F L U X V V E N T R I S .  
CAP. VIII.

DEFINIT.  
MORBI.

Auic. lib. 1:  
doc. 1. cap. 3

CAUSAE.

Auic. ibidem

**F**LUXVS ventris, qui dicitur græce Διάρροια est alui profluuium diuturnum, copiosum, sine phlegmone, et exulceratione, de quo intelligere uoluit Auic. cum dixit; Et ex eis, quæ infantibus accidunt est ventris solutio, & propriè cū dentes nascuntur. Et de quo nunc uerba facere, & curationem perstringere institui; cuius causa duplex est; una à materia calida; altera à frigida proueniens; quæ à calida excitatur,



ut plurimum, fit à dolore ex dentium productione suborto; à frigida uerò ab aeris ambientis qualitate, uel à multitudine humorum superflua. Infantibus enim accidit uentris solutio, cum dentes nascuntur, & quidam sunt, qui dicunt, quòd fit propter superfluitatem salitam; sed fieri potest etiam alio modo; immò propterea quod natura impedita in generando membrum, non bene digerit. Aliquandò etiam gignitur iste morbus à mala qualitate lactis serosa. **SIGNA**, si fluxus est à materia calida, excremèta erunt colore citrino intincta, & excernuntur cum aliquo acore, et sine mora. Si uerò à materia frigida, excrementa pituitosa, alba, et cum tormine excernuntur. Et si à lactis mala qualitate, experientia docebit, si periculum fiat. Prædicendum uerò est, in longis intestinorum leuitatibus, si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum esse indicat. Et omnia uentris profluvia post ægritudines acutas symptomata esse mortalia, quia corruptio nem repentinam portendit. Curatio si rectè institui debet, in primis animaduertenda sunt ea, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè; nam neq; mouere, neq; nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Et si hoc paucum fuerit, non de eo debes laborare. Tota igitur curatio nature permittenda est; ab ijs enim, quæ lædere poterant, sic per ipsum fluorem corpus expurgatur. Verùm si profluium ipsum perseveret usq; ad dies sex, uel septem ad summum spatium, & perseverantia ipsius periculosa est; aliquandò enim tormina, & febres excitat, uiresq; consumit. Propterea à transactis diebus sex, si adhuc perseveret, Si nutricis lac peccat, tunc alia lactet infantem; postea si excrementa biliosa erunt;

**SIGNA.**

**PROGNO-  
STIC.**  
Hip lib. 6. a-  
phor. 1.

Auc. lib. 3.  
F. 16. trac. 8  
cap. 2.

Hip. lib. 1.  
aphor. 20.

Auc. ibidem

VICTVS  
RATIO.

Paul. 2gin.  
lib. 1. cap. 9.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.  
Auc. ibidem

*Victus ratio nutrici instituaturs circa sex res non naturales, ad frigidum, & siccum uergens, prout indicatio nobis ostendit eo modo, quo præscriptum est in capite dealui profluvio nutricis in primo libro huiusce artis, qui legendus est; somni in infante sint longiores solito, caueat ne infans balneetur, et simplices fricationes fiant. Postea ei quotidie succurrendū est epithematis, quæ comprimendi facultate prædita sunt, cōpescere conabimur, inspergentes lanæ uel cyminum, uel anethum, uel apiū. Proderit etiā semen rosarū inferere, & in uniuersum calefacientibus arefacere; Et succurrendū erit ei embrochando uentrē eius ex semine rosæ, aut cymino, aut aniso, aut semine apij, aut uetri ipsius emplastrū superponendo, ex cymino, & rosis madefactis cū aceto, aut prout dicūt Arabes cum giaures v. z. panico decocto cū pauco aceto. Et si nō iuuerit hoc, hædi coaguli sexta pars drachmæ unius, et quod est supra cū aqua frigida dāda erit; sed cauere oportet, ne ea die, in qua coagulū sumit ipse infans, lac emulgeat ne in ipsius stomacho coaguletur, & caseus fiat. Et loco lactis nutriatur ex uitellis ouorū, et ferculo ex pane, quod Itali panatellā uocant, in iure carniū cocto; uel si hæc nō suffecerint R. papaueris, granorū myrti, libani, thuris masculi, cyperi an. drac. s. cōterantur omnia subtiliter, postea cū lacte nutricis q. s. aut syrupi de myrto misce, & infanti aliquid ex eo ad propinandū præbe. Conuenit etiā exhibere, si fieri poterit, syrupū de rosis siccis, uel de myrto, uel miuā cydoniorū cū succo mentæ, uel cū lacte nutricis, uel parū sanguinis draconis; Et uentrē quotidie inūgere præstat oleo myrtino, de cydonijs, uel mastichino. Porro si à materia frigida, pituitosaq. profluvii generetur, tunc uictus ratio institua-*

tur ad calidū, & siccū uergens, & stomacho adhibeatur saccu-  
lus ex menta, absinthio, origano, abrotano, pulegio, et rosis sic-  
cis, et pulueribus caryophyllorum, cinnamomi, olibani, galāgæ,  
et similium; inungatur etiā quotidie totus uēter, et stomachus  
ex oleis de absynthio, de spico, de myrto, et de cydonijs; Deinde  
℞. pulueris galliæ, olibani, spodij, an. drac. s. miu. e cydoniorum  
unc. i. misce. & ex eo ad labendum præbe; Vel ℞. cōfectionis  
de corneis, cōfectionis de sorbis, de mespilis an. unc. s. corallio-  
rū rub. seminum rosarum rubearum. acaciæ, hypocistidos an.  
scrup. i. misce, & cōterenda conterantur: postea cum succo cy-  
doniorum q. s. f. mixtura liquida, de qua quotidie infāti exhi-  
beatur manē, & uesperi drac. i. necnon parare poteris empla-  
strum hoc, si opus fuerit, ℞. farinae ordei, milij an. unc. ij. pul-  
ueris rosarum, thuris, croci, boli armeni, sāguinis draconis, ma-  
stiches, balaustiorum an. dr. i. s. lutei ouorum duorum, aceti  
fortissimi q. s. misce & f. emplastrum, quod calidum applice-  
tur uētri. Postremò si ex prædictis fluor non cōpescatur, tūc  
℞. acaciæ, cerusæ an. drac. i. opij grana ix. & s. a. f. supposito-  
riū, quo alui osculo intruso, statim arcere profluium uidebis.

DE D Y S E N T E R I A.

C A P. VIII.

Q V A E à Latinis difficultas intestinorum, seu tormina,  
& à Græcis δυσεντερία uocatur, nihil aliud est, quā in-  
testinorum ulceratio cum phlegmone, & cruentorum, fæciū,  
similium strigmentorum secretionem, nō sine alui intestinorūq;  
morsu, ac cruciatu, causæ plures sunt, sed in infante, aut  
ab aeris frigidityte, caliditate ue, aut à lactis acrimonia, &  
serosi

Gall. lib. finit,  
med:  
DEFINIT.  
MORB.

CAVSÆ

SIGNA.  
Gal.lib.6.de  
loc.affe. c.1

serositate, humores generante, qui postea intestina paulatim erodunt, prout bilis, & pituita salsa. Signa sunt dolor uetris, punctio, & frequens deijciendi cupiditas, in qua frustra intestinorum cernuntur, excrementa sanguinolenta, saniosa cum excoriatione, & odore fætido; at quia materia, quæ ad intestina fluit semper peccat, aut in caliditate, aut in frigiditate.

PROGNO-  
STIC.

Hip.lib.4.3.  
aphor.24

Idē aphor.  
26:

Idem lib.6  
aphor.3.

Idem lib.2.  
aphor.14.

Idem lib.7  
aphor.24

Aule. lib.16  
trac.1 c.2.

Propterea si materia erit calida, tunc excrementa erunt colore citrino, sanguinolenta, biliosa, & agritudo uehemens. Et si fuerit à frigida intemperie, tunc exhibunt excrementa uirulenta, aquositate albida, & odore grauia. Verum si ab atra bile incæperit difficultas intestinorum lethalis est; Et à difficultate intestinorum habito, si ueluti carunculae exeant lethale est, quia carnem in his concresecere, uel cicatricem induci non speramus, Et in longis difficultatibus intestinorum inedia ex fastidio, malum, & cum febre peius. Et in profluuijs alui mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat. Et à deiectione syncera difficultas intestinorum, malū; Et magna effusio sanguinis puri post dysenteriam, ualde mala; Secundum, ulcera intestinorum perducunt ad hydropem. Tertium, conuulsio, uomitus, singultus, & conturbatio rationis post dysenteriam, mortem; Quartum, qui habet dysenteriam, et apparet post eius aurem sinistram, ueluti res nigra, similis orobo, cum uehementi siti, moritur in decima; & non tardat, nec euadit. Restat ut de curatione ipsa (his peractis) uerba faciam; tamen si raro morbus hic infantibus et præcipue lactentibus contingat; nihilominus, si euenerit facta in primis experientia, si lac in causa erit, quod si erit, tunc alia nutrix (lactente infirmo) lactet ipsum infantem. Victus ratio institua

VICTVS  
RATIO.

fituatur nutritici, circa sex res non naturales, habita prius ratione, & inuestigatione indicationis, an à materia calida, an à frigida proueniat dysenteria, eo modo, quo institutum est, capite de diminutione lactis ab alui profluuio nutriticis libro primo huiusce artis. Nec non medicamentorum ratio statuenda est cum inunctionibus, emplastris, & sacculis, qui stomacho, & ventri instituti sunt in præcedenti capite. Postea consentiente ætate, si possit fieri, infanti exhibeatur reubarbari electi, & mundi, contriti scrup. i. uel scrup. s. cū saccharo rosato, uel iure pulli, aut lacte nutriticis, Deinde perseuerante morbo, si opus fuerit, sumat aliquid ipse infans ex istis Syrupis, scilicet ex rosis siccis, ex menta, ex myrto, ex cydonijs, et similibus, ita ut opus est dissolutis cum aquis plantaginis, endiuie, et similium, & si ipse infans nihil ex ipsis Syrupis sumere poterit, nutritici quotidie, si lactet ipse infans, in diluculo Syrupus exhibeatur, hoc pacto, R. Syrupi ex rosis siccis, ex myrto, miua, cydoniorum an. ꝑnc. s. aquarum plantaginis, endiuie, portulacæ an. ꝑnc. i. misce pro syrupo. Mox si opus fuerit, denuò cū fuerit facta aliqua digestio, reubarbaro contrito, materia peccans educatur. Vltimo loco excoriationem intestinorū lauare, & demum conglutinare opus est. Lauatur excoriatio clysterijs, hoc modo, paratis. R. aquæ ordeï lib. s. uitelli unius oui, sacchari rubei ꝑnc. i. misce, & f. clyster, vel R. lactis ouilli, uel uaccini, uel caprini lib. s. uel ꝑnc. viij. (aut plus, aut minus, ætatis ratione habita) plei rosati ꝑnc. ij. sacchari rub. ꝑnc. i. misce, & fiat clyster, & quotidie lauare oportet excoriationem bis, aut ter in die. Ad conglutinandum excoriationem uerò, R. iuris carniū pinguium ꝑnc. viij. albuminis duo-

MEDIC.  
RATI O:

rum ouorum, adipis renum caprarum liquefacti drac. iij. gummi arabici drac. ij. misce, & f. clyster. Nec non ut citius conglutinetur, clysteribus iniungere poteris bolum armeniā, tragacatham in puluerē redactā an. dr. i. & loco iuris carniū, lac ouillum etiā conuenit. Et si excoriatio cum ulcere iuncta sit, tūc abstergere, & mundare, & demum cōsolidare ulcus operæpretium est. Ad abstergēdum fiant clysteres ex sero lactis, uel ex decoctione fursurum frumenti, uel aqua mellis. Et ad consolidandum, in clysteribus decoctum hoc inungito R. li-tium, balaustiorum, corticum granatorum, sumachij, coriandrorum, an. partes æquales puta M. s. bulliant omnia simul lento igne in s. q. aquæ, postea s. a. f. decoctio, cuius decoctionis R. unc. viij. pulueris boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, thuris an. drac. i. binos uitellos ouorum, misce, & f. clyster, & quotidie exhibeatur, usq; ad consolidationem.

## D E T E N E S M O.

## CAP. X.

**S**EQVITVR aliquandò, sed rarò, in ipsis infantibus etiam morbus ille, qui uocatur à Græcis τενεσμος, & à latinis quibusdā tenesmus, et tinesmus, & ab alijs etiā tenasmus, ut à Plinio, qui nihil aliud est, quàm dispositio recti intestini ad partes inferiores pertinēs, in qua impetus, cupiditatēq; desidēdi plures, sed paucae excretionēs sequuntur. Causa uel est in lōganone, siue recto intestino inflāmatio, de qua mea nō erit oratio, tāquā in paruulis ipsis infantibus superflua, uel prout plurimum accidit caliditas biliosa, aut frigiditas illuc ab humiditate pituitosa, & crassa collecta, excernēdi cupiditatem indu-

cens.

Plin. lib. 28.  
cap. 14.  
Gal. lib. 5.  
nit. med.  
DEFINIT.  
MOR B.  
Paul. lib. 3  
cap. 41  
CAUSA.

Auic. lib. 3.  
F. 16. trac. 1  
cap. 16.

tens. Signa sunt desidendi cupiditas, cum conatu ad excernē-  
dum; ubi primo pingue, deinde cruentum egeritur. Et facilius  
curatur tenesmus, quod nō fit post dysenteriā. Et Paulus etiā  
asserit tenesmum per se ortum, aliquātulumq; progressum cō-  
quiescere. Vicius ratio igitur nutrici instituatur, si infans ad-  
huc lacte nutritur, si erit à materia frigida, prout signa, et ex-  
cremēta indicabunt, ad calidum, et moderatē siccū uergēs; Et  
caueat à ualdē stypticis, et cōstringētibus. Et si prouenerit à  
materia calida, biliosa, tunc uici' ratio instituatur, ad frigidū  
moderatē, et humidum uergēs, et caueat à uino; Et cum tu ci-  
bas, cibis eius sit lac recēter mulctum, decoctum, quoniā reti-  
net fluxum desuper, et lenit locum, et caueat à uino, à ualdē  
amaris, acribus, salis, acetosis, et ab oībus, quæ facē exsiccāt, et  
exasperāt. Indicatio curationis ipsius tenesmi, ueritur ad cau-  
sā ipsius morbi, et tripliciter diuiditur. Prima, prohibitio mate-  
rie imbibite in intestino. Secunda eius resolutio. Tertia est se-  
datio acuitatis materie, et malæ cōplexionis eius. Propterea  
quoad prohibitionē materie; si fuerit causa apostema calidū,  
stude in retinendo id, quod currit ad apostema; id est caue à re-  
bus calidis, & cum imminutione cibi, prout à nobis decretum  
est, immò ieiunet. Verū quod ad resolutionē attinet, si fuerit  
ex sicca, cura cum clysteribus lenitiuis, puta cum lacte uacci-  
no, aut aqua ordeī calida, cum albumine oui, aut oleo rosaceo,  
aut iure carniū simplicī, ut mollietur, aut cum cerato ex oleo  
chamæmelino, aut anethino, cū bdellio, et cera uēter molliſce-  
tur, aut cum oleo calido simplicī, in quo ponas spongiā, et appro-  
pinques loco. Quod uerò ad se dationē acuitatis materie peccā-  
tis attinet; Si fuerit causa frigus adueniēs cū potionibus, &

SIGNA.  
Auic. ibidem  
PROGNOS-  
TICA.  
Paul. ibidem

VICTVS  
RATIO.

Auic. ibidem

RATIO  
MEDICA-  
MENT.

Auic. ibidem

clysteribus calidis; prout uaporationibus cum pannis calidis, et cum sulfure, cum quo uaporabuntur anus, & coxæ, et pecten, & emunctoria, & sedeat infans super milium, & salem calefactū, & prius ambobus in panniculo positis, aut fomentetur anus, cum spongia expressa ex aqua calida, quæ prius ebullierit cum rebus anodynis, ueluti chamæmelo; pulegio, thymo, origano, calamintha, rosis, seminibus anisorum, fœnugræci, lini, postea statim post fomentationem inūgatur anus oleo chamæmelino, anethino, & de cydonijs. Vel ablatur ipse anus uino calido, & oleo omphacino mistis; aut sedeat infans in balneo aquæ calidæ, uel sedeat super terram calidam. Nutrix præterea si tenesmus excitatur à frigidis, et humidis, quotidie, manè, ieiuno stomacho, sumat cum iure carniū drac. i. istius pulueris. R. seminum anisorum, nasturcij, cumini an. drac. ij. torresiant; postea s. a. f. puluis subtilissimus, & si etiā scrup. i. cum lacte de ipso puluere infanti præbere poteris quotidie, mirum iuuabit; si tamen, ut dictum est, tenesmus erit à materia humida, & frigida, quoniam si fuerit à materia calida nocebit.

## DE ALUI CONSTRICTIONE.

## CAP. XI.

DESCRIPT  
MORB.

Auic. lib. 1.

F. 3. doc. 1. c.

3.

Hip. lib. 3. a-

phor. 25.

Gal. ibidem

in comm.

CAVSÆ.

Gal. lib. 2.

aphor. 20.

CONSTRICTIO siue astrictio alui, quæ græcè dicuntur *σπασμός* *spasmos*, accidit interdum in infantibus, et ijs præsertim pueris, qui crassissimi sunt, & aluos duras habenti causa, ut plurimum est, crassities, quæ sua frigidityte à partibus uentris, bilem, quæ deiectionem stimulat, expellit; Quapropter excrementa, sine ipsa bile ægrè excernuntur, uel etiam ge-



neratur ob longiorem solito somnum, uel si infans assuetus fuerit ad balneum, & fricationes, propter earum carentiam, uel quia si bilis aliquo modo petat ad aliquid mēbrum supra petus, adeo ut ad hepar, & ad aluum nihil fluat. Vel propter cibi maiorem, aut minorem assumptionem, quā hepatis, uiribus congruat. Vel ob retentiūæ robur excrementa exsiccans.

Signa per se satis manifesta sunt. Propterea prædicendum est, infantem ipsum ab alui siccitate, aut astrictione facile corripit, a uētris, uel stomachi, uel capitis dolore, et ab alijs diuersis agnitudinibus. Indicatio autem istius curationis perficitur, si in sex rebus non naturalibus, nutrix regatur ijs, quæ habēt facultatem calefaciendi, et humectandi. Infans igitur quotidie fricetur, & balneetur; postea succurrendum est cum supposito ijs ex stercore muris, aut ex solo melle, uehementer coctum, aut cum mentastro, aut cum radicibus ireos, sicut sunt, aut combustis, aut ad comedendū detur eis parum mellis, aut terebenthinæ, secundum quantitatem unius ticeris, & uēter eius fricandus subtiliter est oleo, aut liniatur ipsius umbilicus felle bouis, & ut dicunt Arabes buchormariem, idest cyclamino. Nec nō clysterijs ex iure carniū, uel decoctione herbarū quatuor communium, uel ex oleo dulci oliuarū, uel amygdalarū dulciū addendo, si opus fuerit, clysteribus, parum mellis rosati, & suppositorijs parum salis gemmæ, & hieræ picræ.

SIGNA.  
PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

Auic. ibidem  
MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

DE INFLATIONE VENTRIS.

CAP. XII.

**A**CCIDIT etiam infantibus morbus ille, quē uentris inflationem Latini, & Græci εμφυσμα γαστρος uocant;

DESCRIP-  
TIO  
MORB.  
CAUSAE.

X qui

Gal. lib. 3. de  
sympt. caus.  
Paul. lib. 3  
cap. 38

SIGNA.

Alexander  
Tral. li. 9. c. 2.

PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Paul. ibidem

qui prouenit à spiritu flatuoso, & calore imbecilli existente, generatur in intestinis, & peritoneo, & etiam quandoq; colligitur in uentriculo; sed ego etiam expertus sum prouenire in ipsis infantibus, quasi hydropem ab aquositate lienis, aut hepate obstruente, propter malam uictus rationē à nutrice præteritam. Et præcipue in ijs infantibus, qui comedere incipiunt uel qui antè temporis usum ab lactati sunt. Signa si ab aquositate, propter uiscerum obstructionem prouenerit, erunt tumor, tensio, & durities in hypochondrijs. Si uero à flatuosa materia uenter intumescat, tunc percussus ipse instar tympani, sonum edit; communiter autem uentris inflatio spirandi difficultatem, tumorem, grauitatem, ac uitiatum calorem inducit. Et morbum à flatu facile curatum iri prædicendum est; ab aquositate uero, & obstructione, curatio difficilis est. Victus ratio instituaturs uergens ad calidū, & siccū. Et indicatio cū aperiētibus, et emollientibus, si uiscera sunt obstructa, succurrendū esse demonstrat. Nutrix caueat ab aqua, ab oleribus, ab humidis, à leguminibus, à crassis frigidis, & duris, & à rebus flatuosis, uescatur cibis calidis, & exsiccantibus, & boni succi, & facili concoctionis. Quotidie exercitio incumbat, uitet diurnum somnum, post cibum, aliu exerceat, & præcipue in infante, uel sponte, uel arte. Et si à spiritu flatuoso prouenit, tunc curationis indicatio est corpora irritatem inducere, & attenuare ipsos medicamentis afferentibus calorem, competit elixantes oleo cymini, apij, herba rutinalis, & dauci semen & eo calido uentrem inungendo. Conuenit etiam decoctum nepetæ, admisto mellis exiguo, & piperis drachma, et uentri superpositum; sufficit etiā forus ex milio

*ho. cucurbitula uerò amplissima umbilicum undiq̃ comple-*  
*ctens sæpenumerò liberat. Fomentationes etiam, uel ex rebus*  
*anodynīs, uel ex summitatibus sambuci, & ebuli in uino al-*  
*bo ebullitis flatus discutunt, & morbum tollunt; si uerò pro-*  
*pter obstructionem lienis; aut hepatis ab humore crudo, aut*  
*aquoso inflatio facta sit; tunc in primis, si infans sit in ætate*  
*cōpetenti, paulatim à lacte dimoueat. Nā lac dare, quibus*  
*hypocondria suspensa murmurant, malū est; postea cū fomen-*  
*tationibus ex rebus anodynīs ebullitis in uino albo, quotidie*  
*manē, et uespere succurrendum est, per horā unā antē cibū, po-*  
*stea statim cum inunctionibus emolliendū est iecur, uenterq̃,*  
*et præcipuē si ipsum iecur obstructum sit ex oleo ex absynthio*  
*confecto, uel ex eupatorio, ex chamæmelo, ex spica, & simili-*  
*bus calefaciētibus moderate. Nec nō cū emplastris ex absyn-*  
*thio, chamæmelo, et rebus anodynīs, et farinis, seu pulueribus*  
*fenugraci, seminū lini, et anisorū. Lienī uerò succurrendū est*  
*cum fomentationibus prædictis ex rebus anodynīs, et radicibus*  
*capparorū, asparagorū, cetrac, cētaureæ minoris, et aceto acerrī-*  
*mo decoctis, et cū oleis ex capparibus ex lilio, ex ruta, et anethi*  
*no, et ex amygdalis amaris, et similibus, et cū emplastris de me-*  
*liloto, et ceratis ex ammoniaco, bdellio styrace, opponace, &*  
*galbano, ex adipe gallinæ, medulla ceruina, et puluerib; sco-*  
*lopēdrj, corticū capparorū, aceto dissolutis, et secundū artem*  
*paratis, & si fieri poterit, infanti præbeatur, tã propter lienis,*  
*quã propter hepatis obstructionem, aliquid reubarbari contri-*  
*ti, uel cum passulis præparati, uel cum saccharo rosato Verūm*  
*si cū passulis quotidie cochleare unum exhibeatur, si cum sac-*  
*charo ros. scrup. s. de tertio in tertium exhibeatur, secundum*

Hip. lib. 3. 4.  
 phor. 64.

exigentiam ætatis; poteris etiam cum ferculo, quod uocant panatellam exhibere drac. i. quotidie pulueris cetrac, si lien affecta sit; nam mirum in modum confert, obstructions aperiendo. Quibus rationibus medicamentorum, adultos etiam hac affectione laborantes sanavi, ut mihi testis est ANTONIVS BEFFA de Negrinis, uir nobilis Brixienſis, in studio bonarum literarum à pueritia uersatus, & uerè ad fœlicia, & elegantia carmina diuina quadam propensione natura, & ingenio fœlici pangere natus, & mei amantiſſimus, qui in Augustino eius fratre, liene laborante, hanc rationem medicamentorum (me consulente) fœliciter expertus est.

## DE LUMBRICIS.

CAP. XIII.

Hip. lib. 3. aphor. 26.

Gal. ibidem in comm.

**T**AMETSI lumbrici, qui à Græcis λυμβοι uocantur in ijs infantibus qui magis adoleuerint, ut plurimū contingāt, scilicet ijs, qui mediā habent ætatē, inter illos, qui iā dentes ediderunt, & qui sunt pubertati proximi, quoniam in ipsis tenellis infantibus (ante dentiū productionē, uel cibi solidi comestione) propter imbecillitatem caloris innati minimè, et in adultioribus materia idonea est, ad animalū talium generationē, nihilominus testor ego uerè me infantes bimos, uel circa à lūbricis sæpè uexatos uidisse, & curasse; propterea ab huiusce artis nostræ libris, curationē ipſorū reſecādā haud quaquā cēſeo. Lumbrici igitur uidentur, prout alijs animalibus proportionaliter gigni, qui non ex semine, sed ex putredine habent generationē, quēadmodū in magno mūdo, ita & in corpore humano sunt genera ipſorū; quorū unū est teretū; alterū latorū;

DESCR.  
PTIO  
MORB.  
CAUSA.  
Arist lib. 5.  
de nat. ani-  
mæ cap. 19.

ter

tertio a scaridū. *Ascarides autem sunt tenues quidā lūbrici, qui in parte præcipuè inferiori crassi intestini gignūtur. Aliud uerò genus lūbricorū est rotundorum, hoc est teretū qui in superioribus magis intestinis generātur, adeò quòd ad ipsum quādoq; uentriculum ascendunt; Multò uerò plures hi, quā ascarides gignūtur in pueris. Rarior autē lumbrici lati est generatio, qui et est lōgissimus, & sæpè per tota extenditur intestina. Verū quoniā de hoc genere nullā fecit Hip. in infantibus, tāquā superflūā mentionē, loquens de morbis ipsis infantibus contingentibus, propterea de ipsis tantum modò rotundis, siue teretibus, & ascaridibus lumbricis, non tantū ab ipsa auctoritate ipsius Hip. excitati, quantū ab experientia edocti; erit intentio nostra uerba facere, in infantibus. n. fateor ego ingenuē nūquā uidisse alterius, quā rotundæ formæ. Causa igitur istius agritudinis est putredo, quæ nascitur, ut plurimum, ex crassa, et pituitosa materia. Signa rotundorum sunt hæc, in superiore uentriculum procurrunt; proinde sequitur incredibilis morsus stomachi, uentris, & intestinorum, per os nō rarò eijciuntur, nonnullis uerò per nares, et magna quidē ex parte cum febre existunt, & cum tussi exigua, siccitate, in somno tremore, et præter cōsuetudinē excitatione, clamore, terrore, singultu, et extrā os linguæ missione, oculorum clausura, et aliquādò ta citurnitate, et cum molestia uigiliarum, et ira, et dentium fremitu, et comestione superuacanea, præsertim si infantes fuerit: quidā eorum neglecti motu, pulsūq; destituuntur, ac refrigerantur, tenuē, ac frigidum sudorē exsudant, in facie color rubrus apparet, et uariatur, prostratio appetitus, decubitus transmutat nauseabundi, multis etiā aluus descendit, corruptos cibos*

Gal lib. 14.  
met. med. c.  
15. & 18. &  
19.  
DESCRIPT  
MOR B.  
Gal lib. 3.  
aphor. 16. in  
comm.

Hip. ibidem.

CAVSÆ.

Gal. ibidem.

SIGNA.

A etius lib. 9  
cap. 39.

paul. lib. 4.  
cap. 57.

Aeti. ibidem egerens, & in modum tympani uenter eis inflatus, sonū edī,  
 Paul. ibidem & oculos quidā sanguine suffusos habent. Ascaridum uerò  
 signa sunt, uehemens pruritus in imo uentre, et quandoq; usq;  
 ad animi deliquiū, grauitas præcordiorū, & dorsi, ac assidua  
 Cal. ibidem ad egerendum irritatio, & excrementa, quæ excernūtur gra  
 uè olent, ueluti apparet in iumentis, malè cibū cōcoquentibus,  
 quorum malā concoctionem fætor indicat excrementorum.  
 Signa autē omnium lumbricorum cōmunia sunt, oris fætor,  
 deliriū, lethargus, dolor capitis, palpitatio cordis, uomitus cre  
 ber, & imbecillis pulsus, qui in infantibus ipsis creberrimus est  
 à natura, distentiones comitiales, oris spuma, tormina, et co  
 lici dolores, & interdum alui suppressio. Præſagia autē, quæ  
 ex lumbricis sumuntur, sunt hæc, lumbricos quoq; teretes eun  
 te in iudicationē morbo, descendere idoneum est; magnā autē  
 curā habere cōuenit, circa eorum curationem, præsertim tere  
 tum, nā multi nulla lumbricorum cura habita exesi ab ipsis  
 Paul. ibidem sunt, et conuulsi interierūt; alij dicunt se lumbricos uidisse,  
 qui ex inguinibus egri eruperint; Et alij etiā prout IOHAN  
 NES Baptista Caballaria, uir doctus, et in arte medica clarus  
 honorifico stipēdio publicè à Cōmuni Meduli in agro Mātua  
 no cōductus, qui asseruit mihi se lūbricos uidisse, qui ex umbi  
 lico eruperint cuiusdā infantis annorum trium, plus minus.  
 Paul. ibidem Paulus uerò inquit, circa febrium initia geniti lumbrici sub  
 sistētia ex subiecta habent corruptione, circa cōsistēdi uigorem  
 ex morbi malignitate, circa declinationem omninò ad melius  
 proficiunt. Et lumbrici in febribus, et absq; febribus fiunt mul  
 titudine, magnitudine, colore, & tēpore inuicē differētes; dete  
 riores uerò sunt maiores minoribus, multi paucis, rubri albis, et

PROGNO  
 STIC.  
 Hip. lib. 3.  
 prognost.  
 tex. 12.

Paul. lib. 4.  
 cap. 57.

Paul. ibidem  
 cap. 58.

Aetius ex He  
 rodoto lib. 9  
 cap. 39.

minetes mortuis. Et in incipientibus acutis morbis, si lumbrici  
 teretes uiui deijciuntur, pestilentes morbos indicant; inclinatis  
 autem mortui, malum, interutrumque tempus quoquo modo appareant,  
 malum est; Lumbrici etiam deiectioni sanguine conspersi, malum;  
 Et ex ipsis lumbricis frequens in infantibus anhelitus frigidus,  
 tumescere adhuc corpore, lethale, sequenti .n. die mortem pre-  
 nuntiat; sunt etiam quidam, Asaharaij fortasse autoritate per-  
 suas, qui dicunt, ascaridibus infestos breuioris uitae fore; haec  
 de prognosticis. Restat ut de curatione uerba faciam, quae, ut no-  
 bis indicatio ostendit, perficitur hoc pacto: Et primo quod ad  
 uictus ratione attinet, aer ad calidum, & siccum uergens eli-  
 gatur. Nutrix (si infans lacte nutritur) caueat à somno diur-  
 no post cibum, & nocturnus sit secundum solitum, caueat pa-  
 riter ab ocio, & exerceat se bis in die, per horam, ante cibum,  
 & secundum consuetudinem. Aluus quotidie excernat, &  
 praecipue in infante, si non sponte, cum molli balano ex melle,  
 & sale gemma parato, uel clystere communi. Animi affectus  
 omnino uitandi, sunt, cibi sint boni succi, et facilis concoctionis;  
 & in omni lubricorum genere abstinentia maxime prodest,  
 qua eorum generatio prohibetur. Sed cum infans infestatur,  
 tunc exiguo cibo, seu lacte, frequenti tamen utendum est. Ne  
 lubrici morsus inferant, comedat ipsa nutrix panem bene fermen-  
 tatum (azymus .n. lumbricos generat) et cum modico sale, &  
 feminibus anisorum bene subactum, & satis coctum, carnes  
 uitulinas, uerucinas, haedinas, & gallinaceas, & auium ter-  
 restrium; Inter olera, si non adest febris, comedere poterit in fer-  
 culis, nasturcium, betam, mentam, petroselinum, abrotanum, abstin-  
 thium, apium, sinapim, cappares, raphanum, acetosam, &  
 se

VICTVS  
 RATIO.

semina brassicae, et eruca, et oleosa conueniunt. Et si alui profluuium adsit, ex quo lumbrici magis abundare solent, tunc misceantur in cibo, et ferculis, praecipue ea, quae descripta sunt capite de alui profluuiio. Et caueat à leguminibus, nihilominus lupini conueniunt, & iura cicerum rubeorum; caueat à piscibus, à cibis dulcibus, frigidis, & ualde humidis, crassis, et uiscosis, & breuiter in uniuersum, omnia calefacientia, exsiccantia, incidentia, acria, amara, salsa, acida, & attenuantia conueniunt. In potu uinum conuenit, sed aquosum. Haec tenus de uictus ratione. Ea uero, quae ad medicamentorum rationem attinent, qua potero breuitate perstringere conabor; à suffimentis loci, ubi decumbit infans, incipiens. Ignis igitur in cubiculo succedatur, si fieri poterit, ex lignis iuniperi, aut citri, aut persici, odoramenta fiant ex coma absinthij, ruta, et folijs persici, & ex myrrha, & aloe, uel ex rosis, santalis, muscho, ambra, caryophyllis, thure, & gallia moscata. Deinde ea, quae in primis lumbricos necant, sunt exhibenda. Etenim dum uiuunt semper occasionem nocendi habent; Inter ea uero, quae miram habent uirtutem necandi lumbricos, est aloe; Et quoniam pueri aloem non admittunt, propterea instrumento quo os diuarcatur supinis, fasciola ipsis uiolenter detentis, ore distento per clysteridium quodpiam, fistula non fragili munitum, inuitis aloem quantum poterit interius transmissam injiciamus; quae quidem admiranda curandi ratio puerorum moleste aloem ferentium est; sed si fieri poterit, ut cum lacte nutricis exhibeatur aloe; uel cum oximelite simplici ad pondus diobolorum trium, cum paucopulvere cornu cerui deusti. Vel ipsi infanti praebetur

RATIO  
MEDICA-  
MENT.

Paul. lib. 4.  
cap. 57.

Paul. ibidem



si febris non adest, aut saltem si est exigua, chamamelorum,  
 uel mixariorum decoctum, & chochlearia duo olei immaturi,  
 amarissimi exhibeantur. Amara enim lumbricos enecant.  
 Et cunctis uerò tam infantibus, quàm adultis febrientibus,  
 & non febrientibus confidenter exhiberi possunt, etiam si  
 trimestres fuerint infantes. Vermes terreni in puluerem re-  
 soluti cum sapa, & si sapa non admittunt, cum hydromeli-  
 te, aut ut libet, præbeto, nihil ueritus, neq; utilitate contem-  
 pta septem numero dato, cataplasma etiam confici poterit  
 ex lupinorum farina in hydromelite decocta, imponendum  
 uentri, cui aliquando etiam bryonia, & filicis, tormentillæ  
 radices adiſciantur. Umblicus autem felle taurino expleatur,  
 aut melanthio cum lacte muliebri trito, aut absynthio, aut a-  
 brotano, aut bryonia, pinguibus, ficibus admistis, uel R pulpæ  
 colocynthidis, fellis taurini an. partes æquales misce, et cū suc-  
 co absynthij q. s. f. emplastrū, et umbilico superponatur, poteris  
 etiam dorsi spinam uniuersam ex medulla ceruina inūgere,  
 Et bouis talus uſtus, cum lacte potus, lumbricos teretes educit.  
 Ego uerò sæpè fæliciter expertus sum hunc puluerē ad pondus  
 unius drachmæ eum indifferenter exhibendo, tã infantibus,  
 quàm adultis, cū febre, & sine febre, uel cum lacte nutritis, si  
 æger lacte nutritur, uel iure pulli, uel uino albo, si uinum bibit,  
 uel cū syrupo de acetositate, aut corticib' citri potatū; qui hoc  
 modo paratur, R musci marini, seminis origani, seminis citri,  
 portulacæ, cornu cerui uſti an. dr. i. pulueris, quē lūbricorū uo-  
 cāt, semencinæ, seu corallinæ an. dr. ij. seminū mētæ, absynthij  
 an. dr. i. misce, et s. a. f. puluis subtilis. Nec nō inūgere etiā so-  
 leo nares, & tēpora, stomachū, et umbilicū infantiū ex miltbri

Acti. ibidem

Act. ibidem

Gal. de cōp.  
 theriacæ ad  
 Pisonem.

Gal. ibidem

ARVAD  
 di 160  
 1602 m

data

dato electo; uel ex theriaca, quā ille optimus simplicium medica-  
 metorum cognitor FRANCISCUS CALCEOLARIUS clarā  
 Veronæ cōposuit, adeo ut ea ad lōginquas regiones pretio tradu-  
 eta, sicuti ego testis sum a' Clariss. Medicis, Liguribus, Pedemo-  
 tanis, Bononiensibus, Matuanis, Brixianis, Trideminis, Venetis,  
 Germanis, et alijs quā plurimis assidue pro indigentibus poni-  
 tur in usum summa cū laude ipsius Calceolarij. Vel alio mo-  
 puluis miræ uirtutis ad lūbricos educēdos, tā teretes, quā asca-  
 rides, hoc modo paratur R. reubarbari, agarici, scordij an. dr. i.  
 musci marini dr. iij. corni cerui usti, seminum portulacæ an.  
 dr. i. aloes illotæ dr. iij. s. misce, & s. a. f. puluis, de quo scrup. i.  
 cū uino, uel cū iure carniū, uel cū syrupo de acetositate, aut de  
 corticibus citri infantibus innoxie exhibetur. Et si infans pa-  
 rum adoleuerit ex ipso puluere scrup. ij. ex succo mētæ, aut ab  
 synthij, pilulas tres cōficere poteris, et ipsi infanti præbere. Verū  
 si lūbrici infestāt cum alui fluore infantē, etenim cessante fluo-  
 re, ut plurimū lūbrici quiescūt; procurādum est ut aluus post  
 quartum, aut diem sextum ad summū, astringatur modis, ac  
 legibus institutis in hoc libro, capite proprio de alui fluore. Et si  
 astricta pariter fuerit aluus citāda est modo instituto, capite  
 proprio: et eodem modo, cum uomitu, singultu, et alijs sympto-  
 matibus succurrendum erit secundum proprias curationes.

### DE INFLAMMATIONE UMBILICI.

CAP. XXIII.

Cap. lib. 2. a-  
 phor. 24.  
 DESCRIPT.  
 MORB.

**C**um cōtingere interdū soleat paruis, et nuper natis pueri-  
 lis præter alias ægrotationes, etiā umbilici inflammatio,  
 quæ græcè dicitur φλεγμονή του φελου. Propterea mihi uidetur, ra-  
 tionī cōsonum esse curationē ipsius affectionis perstringere. In-  
 flāmatio igitur ipsa provenit ab incisione ipsius umbilici, reci-

CAUSA.  
 Gal. ibidem  
 in comm.

De R.

ter. n. natis infātibz accidūt, nō secus, ac si qua alia pars foret  
ulcerata, aut à dolore præcisionis, aut ab aere, aut à ligatura  
perperā facta, excitata. Indicia satis nota sūt, quoniā visu pa-  
tēt. Vnde præsagia hæc sumūtur; si recte, & statī curetur hic  
morbus facile sanabitur. Verū animaduertēdū est, ne natura,  
quæ pridē in utero matris urinā huc deferebat isti functionis  
nōdū oblita propter corrosione ipsius inflāmationis denuō lotiū  
ibi nō trāsmittat, et difficilē curationē reddat. Propterea i pri-  
mis instituat uictus ratio, uergens ad humidū, et moderatē  
calidū; nutritrix caueat à uino, ab aromatibus, ab allijs, à cæpis,  
porris, raphanis, acetosis, salsamētis, à leguminibus, à flatuosis,  
ab oleribus, præter spinachiā, atriplicē, mētā, petroselinū, lactu-  
cā, et blitū, et caueat ab ijs, quæ ualdē calefiūt, et à cibis grossis,  
et difficilis cōcoctionis, exercitationi uacet, bibat iura carniū,  
uel aquā cum seminibus coriandrorū coctā, Alius quotidie ci-  
tāda est in infante, aut spōte, aut balanis ex melle. Postea sta-  
tī debemus lenire dolorē cū emplastris, et inunctionibz hoc pa-  
cio paratis R. maluarū decoctarū et contusarum m. i. farinæ  
ordei, lupinorum, fænugræci an. drac. ij. olei rosacei, pinguedi-  
nis gallinæ, butyri an. drac. iij. misce, & s. a. f. emplastrum, et  
calidum applicetur umbilico, maturat. n. & dolorem sedat.  
Vel R. medullæ panis frumentacei tritæ unam, lactis uaccini  
q. s. misce, et lento igne parū bulliāt. Postea adde croci scrup.  
i. olei rosati ꝛnc. i. misce et f. emplastrum, calidūq; applicetur.  
Si uerò inflammatio uenerit ad suppurationem, tūc cum un-  
guento ex cerusa, et lithargyrio manu chirurgica curetur; uel  
ex isto linimento R. terebenthinæ ꝛnc. s. uitelli unius oui,  
olei rosacei ꝛnc. ij. misce, & confice linimentum, ex quo pan-

SIGNA.

PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Auic. lib. 1.  
F. 3. doc. 1  
cap. 3.

niculi linei infusi superponatur, feliciter. n. & sine dolore curant. Vel R. pulueris nardi celtici ꝛnc. s. terebinthinae ꝛnc. iij. olei sesamini, amygdalarū dulciū ꝛnc. i. misce, et f. linimentū.

ONOC

DE TUMORE SEU EMINENTIA VMBILICI.

C A P. XV.

MOR B.  
DESCRIPT  
Auic. lib. 1.  
F. 3. doc. 1.  
cap. 3.  
CAVSÆ.

SIGNA.  
PROGNO-  
STIC.

Gal lib. 11.  
met. med. c.  
21.  
ADIDEM  
TUM  
OILAR

VICTVS  
RATIO.

**A**CCIDIT etiā aliquandō in ipsis infantibus tumor ipsius umbilici citrà inflātionē, qui græcè uocatur *ομφαλις*. causa est, uel multus fletus, uel uociferatio, aut tussis, aut casus, aut materia ibidem aquosa, uel flatuosa decurrens. Signa innotescunt satis. Propterea prædicendum est affectio nem ipsam facile admittere curationē, si recte, et citò curetur, nec cum mora, plus, quàm, conuenit trahitur de necessitate ad cauterium ueniendum sit. Quapropter cū in quocunq; morbo semper adest, quod fit, et quod factum est, quod fit debemus prohibere, & quod factum est resoluerē, et euacuare; unde si causa ex ploratu infantis proueniet, ueluti ut plurimū euenit, tūc statim ad prohibendum quod fit, & ad somnum conciliandum, recurrendumq; est, ut à nobis describeum, & institutum est capite proprio, libro secundo huiusce artis, ad quem se referat lector; Et ita si à tussi oriatur pariter recurratur ad propriū capitulum in libro hoc. Ad resoluendum uerò, quod factū est, ut sumitur ex istius morbi indicatione, in sex rebus non naturalibus uictus ratio instituatur: si lacte nutritur infans nutriti, ad calidum, & siccū uergens, & caueat à rebus flatuosis, frigidis, & humidis, tam in cibo, quàm in potu, & cibis utatur boni succi, & facilis concoctionis, in quibus aliquid misceatur, quod habeat facultatem expellendi flatum cuiusmo



## DE CALCULO VESICAE

CAP. XVI.

Hip lib. 3. a.  
phor. 26.Gal. libidem  
in comm.DESCRIP-  
TIO

MORB.

Gal. libidem  
Paul. agin.  
lib. 3. c. 45.

CAUSA.

Gal. libidem

Gal. lib. 3.  
de nat. hu-  
man. tex. 13.

SIGNA.

Gal. lib. 1. 8.  
loc. affe. c. 1.Auc. lib. 3.  
F. 18. trac. 2.

cap. 16.

PROGNO-  
STIC.

Auc. libidem

Hip. lib. 1.  
aphor. 14.Gal. libidem  
in comm.

**I**N Infantibus, qui magis adoleuerint, .s. qui habent etatem mediam inter illos, qui iam dentes ediderunt, et qui sunt pu- bertati proximi, morbus ille, qui calculosus uocatur à Latinis, et à Græcis λιθιασμις, contingit, immò calculus, aut lapis ipse maximè propria passio est talium puerorum in uesica. .s. in ea .n. concreescere consuevit, propter edacitatem, ex qua non pau- cos crudos humores coaceruant, ex quibus pars crasrior unà cū urinis ad uesicam perueniēs, fit lapidum generationis materia. Accedit altera causa uehementia caliditatis. Signa lapidis in uesica sunt urina, similis aquæ, in qua subsident sabulosa quedā; laborātes assidue pudendum scalpunt, idq. uel laxum, uel intentum præter modum; postea de repente urina suppri- mitur, doloresq. in eodem loco permanentes. Quodd uerò ad præ- dictionem attinet, scire oportet in illo, in quo est sedimen areno- sum, nō facile aggregari lapidem; materia .n. non est coarctata; sic autē habeto, morbum hunc (ut inquit Auicenna) parum accidere infantibus, & mulieribus, propriè lapis in uesica, quo- niā uesica earum ad exteriora breuior, ac latior est, et pauco- rum anfractuum, quæ sentētia uera esse potest in mulieribus, quoad generationem, quia ex fluxione menstruorum facilius, quàm in uiris omnia superflua expurgantur, & calorem non adeò uehementem habent, ut materia in lapidem facile uerti possit; uera etiā esse potest, quoad expulsionem in infantibus, et mulieribus propter breuitatem meatus, & anfractuum uesi- cæ. In pueris uerò, qui habēt plurimum caloris innati, et multa humiditate abundāt; et si meatus breuiiores habent, tamē sunt

angustiores, quàm in adultis. Verùm esse potest, ut generatio calculi in uesica, sit maximè propria passio ipsorum; Et si citò non curetur, cum induratus ualde, et in lapidem redactus erit calculus, & adeò magnus, ut per collum uesicæ exire non possit, necessario deueniendum erit ad incisionem, quoniam uix eo tempore frangitur in uesica. Reliquum est, ut de curatione uerba faciam; Et primo uictus ratio secundum indicationem instituat ad calidum; et humidum uergens, et nutritrix, si infans lacte nutriatur, caueat à somno diurno post cibum, & ab otio, exercitationi incumbat; alius tàm in ipsa, quàm in infante, uel sponte, uel arte, quotidie excernat, caueat à crassis, uiscosis, flatuosis, & qui sunt difficilis concoctionis, & mali succi, cibus. Deinde quoad rationem medicamentorum in cibo, ut in ferculis, quotidie comedat ea, quæ habent uim frangendi lapidem, prout saxifragiam, cetrac, lithospermum, polygonum, flores genistæ, cinerem, uel puluerem leporis adusti, bdellium, cardamomum, balsamum, lapidè iudaicum, lapidè spongiæ, lapidem fellis bubuli, & eryngium. Postea infantes quotidie balneare præstat ex aqua calida ebullita cum chamæmelo, pulegio, origano, calamintho, anetho, fœniculo, parietaria, enula, althea, malua rosmarino, rosis, siccis, saxifragia, seminibus anisorum, sanugraci, lini, & statim à balneo abstergere, & diligenter pannis calidis exsiccare; postea pudenda, & pectinem ex oleo liliorum alborum, uel scorpionum calido inungere, & emplastrum infra scriptum pectini calidum apponere R. uitella ouorum coctorum num. x. pulueris foliorum enulæ campanæ, parietariæ, petroselini, apij, saxifragiæ, an.

VICTVS  
RATIO.MEDIC.  
RATIO.

an. drac. ij. pulueris lapidis iudaici; scorpionū ūstorum, sangui-  
 nis hirci, an. drac. i. misce, & omnia in mortario bene ducan-  
 tur; poste à cum oleo nardino, & scorpionum an. partes aqua-  
 les q.s. misce, & f. emplastrum. Infanti etiā aquam destil-  
 lationis saxifragiæ. & iringi exhibere pro potu, mirum in mo-  
 dum præstat; nec non puluerem saxifragiæ ad pondus dracs.  
 in ferculis quotidie, si aliquid, præter lac sumit, uel cum lacte  
 etiā exhibere nimirum præstat. Plura descripta sunt alia  
 remedia in cura de retentione urinæ, ad quam habeatur re-  
 gressus. Verū si lapis supramodum creuerit, adeò, ut per col-  
 lum uesiçæ exire non possit, tūc manu chirurgica amouēdas  
 est eo modo, quo docet Paulus Aegineta, qui consulēdus est.

Paul. ægin.  
 lib. 6. c. 60.

## DE VRINÆ INCONTINENTIA.

### CAP. VII.

Gal. lib. 3.  
 de usu part.  
 cap. 16

Gal. ibidem  
 & lib. 6. de  
 loc. affe. c. 3

DEFINIT.  
 MORB.

Paul. lib. 3.  
 cap. 45.  
 CAUSA.

**C**UM Musculus, qui uesiçæ collum circumambit tripli-  
 cem habeat usum, unum, ut nihil in uase urinario relin-  
 quatur; alterum, ut ori uesiçæ claudendo opituletur; tertium,  
 ut excernendorum excretionem acceleret, resolutus est, mor-  
 bus fit, qui à Latinis urinæ incontinentia, seu præter uolunta-  
 tē excretio dicitur, et laborātes morbo ipso Græci εὐουγούτος  
 uocant; morbus uerò dicitur ακαούτιος τῆς οὐγῆς, scilicet inuo-  
 luntaria urinæ excretio. Causa in infantibus, ut plurimum,  
 est frigidorum, uiscidorum, ac crassorum humorum abundan-  
 tia; aut ab aere ambiente, aut à lactis mala qualitate, aut à  
 mala intemperie ipsius infantis, aut à nimio potu, & cibo, si  
 quid præter lac sumit, aut à casu, aut à uulnere, aut à uerte-  
 bra



brarum luxatione, excitata. Signa satis innotescunt. Prædicere autem licet, si ex aliqua externa causa, musculo infrigidato, generatur morbus, celerius curatur, quam si citra manifestam causam proueniat. Qui enim urinam sine uoluntate emittunt, ob ceruicis uesicæ uulnus, aut casum, aut uertebræ luxationem superuenientibus, quæ mortem fatentur notis, nulla medicina periculo liberat; Et quantò plus eis contigit (urinæ scilicet inuoluntaria emissio) eo minus periculo sunt obnoxij. Propterea de ea incontinentia urinæ, quæ à mala intemperie frigida, & à mala uictus ratione in infantibus excitata prouenit, scribere decreuimus. Igitur si lac in causa est, alia nutrix, dum prima curatur, lactet infantem, & uictus ratio uergat ad calidum, & siccum, infans quotidie pronocet uel spontè, uel arte uentris deiectionem; caueat à somno diurno post cibum, nutrix exercitationi incumbat bis in die, ante cibum, perurbationes animi uitet, & infans aliquândo excitetur ad iram, quæ interdum in hac ægritudine cõfert; cibi sint facilis concoctionis, & boni succi, cuiusmodi sunt carnes columborum, gallinarum, perdicum, turdorum, alaudarum, & similibus, & præcipuè si assæ fuerint, et si quid comedit, ferula comedat, parata, uel cum pipere, aut amomo, cinnamomo, aut zingibere, et similibus. In iure etiã concoqui poterit parum hyssopi, sampsuchi, saluiæ, satureiæ, fœniculi, et similiũ. Verum indicatio medicamentorũ perficitur, si æger suprâ pettinem foueatur, bis in die, per horam, ante cibum, ex eneleo calido. Et si gallinæ guttur combustum, ieiuno stomacho, cum iure pulli, aut lacte præbeatur, Et pariter si drac. i. quotidie exhibeatur pulueris florum leucanthemi, uel leporis testiculi

SIGNA.  
Gal. lib. 4. &  
loc. affe. c. 4.  
PROGNO-  
STIC.  
Paul. lib. 3.  
cap. 18.

VICTVS  
RATIO.

Paul. libidem

Paul. lib. 3.  
cap. 45.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Aeti. lib. 11.  
cap. 45.

culi tosti, uel uesicæ porcinae, aut ouinae, aut pulueris calaminthæ, & myrrhæ, antè cenam, aut cum iure carniū, aut lacte, etsi non amplius lactet, cum uino odorato. Conueniunt etiam cataplasmata, & malagmata per rubefacientia, ex sinapi apparata. Nec non iniectio arenæ à sole feruifactæ, similiter confert; Et balneis etiam, tam arte cum rebus anodynīs paratis, quàm naturalibus, & maxime sulphurulentis, & bituminosis, primum calidis, postea etiam frigidis, curare conuenit: Et partium ipsarum fricationes, & exercitationes mirum præstant auxilium.

## DE RETENTIONE VRINÆ.

C A P. XVIII.

Gal. lib. 6. §  
Iocis aff. c. 3.  
DEFINIT.  
MORB.  
CAUSAE.

SIGNA.

**S**I INFANTI contingit affectio illa, quæ à Græcis <sup>ἰσχυρογικ</sup>, & à Latinis urinae retentio dicitur, nihil aliud est, quàm exacta prorsus urinae supressio, mortis periculū afferens. Causæ huius morbi multæ sunt, sed in infante, ut plurimum, sunt tres. Vna, debilitas ex pultriciis, ab intemperie frigida, adeo, ut cū circa id, quod cōtinetur cōtrahi nō potest ipsum exprimere nequeat. Secunda obstructio in inferiori meatu, à crassis humoribus facta. Et tertia à lapide in ipso meatu impacto. Et si retentio ipsius urinae satis manifesta sit, cū fletu, & infantis uigilijs, nihilominus illud attendendū ē, si à debilitate excretoriæ facultatis prouenerit, cū cōpressionē uehementi suprà pubem, et infrà umbilicū urinā excerni. Et si minus per cōpressionem urina excernatur, tunc erit signū obstructionis à materia crassa; & præcipuè si nutrix, aut infans in precedenti uictu multis cibis crassis, ac uiscidis usus fuit. Et si erit à lapide, signum est si intromissa parua fistula

Stula aenea lapidem remouendo, urina euacuetur. Prædicendum uerò est, cum lotium non eijciunt, quòd subiecta membra debiliora fiunt, & paulò post moriuntur. Propterea succurrendum est statim; Et cum primum causam morbi cognoueris, facilis erit cura; nã suppressionis urinæ causas amovere, est curationis indicatio. Si igitur ab humoribus crassis fiat, & infans lacte nutriatur, tunc alia nutrix lactet infan-  
tem, uel si cum ratione ætatis tutè fieri poterit, a lacte amouea-  
tur paulatim, sin minus, uictus ratio in omnibus sex rebus nò  
naturalibus instituat, uergens ad calidum, & siccum, tẽpe-  
rato modo, & caueat à cibis crassis, humidis, frigidis, duris,  
acribus, acetosis, a caseosis, a piscibus, a leguminibus, a pulmen-  
tis, et a similibus. Caueat a somno diurno post cibũ, exercitio  
incubat, alius deijciat quotidie uel sponte, uel arte. Deinde o-  
leo anethino calido, aut chamæmelino, aut liliorum alborum,  
aut scorpionum inungendo pubem, & pectinem illi succurri-  
tur. Fomentationes etiam ex rebus anodynis, cum parietaria,  
& uino albo ebullitis competunt, & emplastra ex rebus  
predictis, et farinis ordeï, fœnugræci, seminum lini, & oleis  
predictis. s. a. parata præstant. Balnea etiam ex decoctione re-  
rum, & herbarum anodynarũ mirum in modũ iuuant; immò  
aliquando solo balneo liberantur, etsi cum prædictis urina nò  
externatur, oleũ chamæmelinũ, aut anethinũ, aut scorpionũ,  
quod dissoluit per syringã mittendũ ē in uesicã. Et similiter si  
a debilitate expulsricis ob intẽperiem frigidã proueniat inun-  
ctiones, fomentationes, emplastra, et balnea suprã instituta cõ-  
ueniunt, Hoc unũ tamen animaduertendũ est, in oĩ genere re-  
tentionis urinæ, in uictus rōne uitare oportere urinam cientia,

PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

MEDICA  
RATIO.

ne maior, uel obstructio, uel extensio, circa uesicam, fiat, ob uirinae multitudinem. Nihilominus postquã uasa urinaria aperta, et dissoluta fuerint, laudatur puluis maxillarum luporum, piscium salitorum, & cum uino aromatico ad pondus dr. s. per tres dies continuos, ieiuno stomacho, exhibitus. Parum etiam uini decocti, cum radice filipendula, confert; Prouocat etiã à proprietate ( ut dicitur ) urina, si uirga infantis immittatur in os cucurbitae antiquae, in qua retentũ fuit oleum, prius in aqua calida calefacta, dũmodo in ipsa non ingrediatur aqua. Dicunt etiã si mittatur lapidũ acutum in ignẽ, adeo, ut ardeat, si fuerit puella, ante eam uelit, uel nolit statim minget. Verũ silapis urinam supprimat à loco excutiendus est, uel parua fistula aenea, uesicae intromissa, uel infante cubante supino, et crura eleuata sursum parum agitentur, et cõcutiantur, mox ad frangẽdum lapidem ipsum confert, Si bolus unus cardamoni, cum aqua decoctionis corticum, uel radicum lauri sumatur. Et secundum recentiores, pro secreto, exhibent puluerem istum, R. sanguinem unius leporis, & cum ꝛnc. viij. radicum saxifragiae uratur in olla rudi, et fictili, et de cinere hoc, detur cochlear medium; uel scrup. i. cum uino albo, si infans uinum bibit, sin minus cum lacte, aut iure pulli, stomacho ieiuno, quotidie; uel si sanguis hircinus s. a. preparatus eodẽ modo exhibeatur, frangit lapidem in uesica. Nec non auis, quae dicitur caudatremula, siue motacilla, ut supra in olla fictili combusta, et in puluerẽ redacta auxiliũ præbet, si modo, ut supra exhibeatur. Adhibere etiam emplastrum hoc pectini, frangit lapidem, R. amygdalarum amararũ, et dulc. an. ꝛnc. iij. terantur, postea cum resina pini, & terebinthina, et oleo scorpionum q. s. secundum

Dioscorides  
ib. i. cap. 5.

INC. M.  
OLIV.

dum artem f. emplastrum; conferunt etiam simplicia multa, prout lapis iudaicus, lapis spongiæ maris, lapis serpentis, lapis uesicæ, semen syon, saxifragia, radix graminis, radix rusci, genistæ flores, senecion, amygdala, & cubebæ, si cum ratione aratis, & temporis s. a. exhibeantur. composita uero oleum de cerasis, de granis iuniperi, & multa alia, quæ in infantibus timenda sunt prout antidotum hemagogum, electuarium dulce, lithontripton, iustinū, mithridatum, & theriaca, sed si premissa non suffecerint ad frangendū ipsum lapidem, ad sectionē transeundū erit eo modo, quo à Paulo ægineta præcipitur.

Paul. ægin.  
lib. 6. c. 60.

## DE HERNIA SEU TUMORE INGVINIS.

C. A. P. XVIII.

**A**FFECTIO ea, quæ à Latinis dicitur hernia, seu ramex, à Græcis ῥήξ uocatur, quo nomine omnes fere testiu comprehenduntur tumores, qui numero sunt octo, ut patet ex Galeno; at nos omisissis omnibus alijs tumoribus, tanquam nō necessarijs in infantibus de hernia inguinali tantū uerba faciemus, quæ nihil aliud est, quā tumor præter naturam in inguine ex distensione, aut rupituræ peritonei ortus; Et ut plurimum, generatur à frequentia fletus, eiulatusq, aut ab immoderata repletione, et forti in egerēdo expressione, cū aluus astricta est, & interdum à redundatā flatuum. Signa innotescūt, unde hæc præsagia sumuntur. Intestinorum hernia qualiscunq, fuerit, semper aquosa deterior. Pro curatione uero, in sex rebus nō naturalibus uictus ratio instituenda est, ad calidū, et siccū uergens: Aluus quotidie deiciat, uel spōte, uel arte in infante; caueat à nimia repletionē cibi, à fletu, à rebus flatuosis, à uocifera

Gal. lib. de  
tum. præter  
nat. 17. 18.

DEFINIT.  
MORB.  
Gal. ibidem  
CAUSAE.

SIGNA.  
Actus lib.  
14. c. 24.  
PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.

fera

MEDIC.  
RATIO.

feratione, a motu; Nutrix etiam lactante infante, caueat a præmissis, a rebus frigidis in cibo, a leguminibus, ab aquosis, a flatum parientibus, crassis, & crudis, & difficultum concoctionum. Ratio verò medicamentorum, quoniam Indicatio istius morbi, cum illa, quæ de tumore umbilici inscribitur, conuenit, propterea eo modo perficitur, quo statuta est in ipso capite, quod legendum est, et ex præscripto ordine ipsius procedendum.

## DE PROCIDENTIA ANI.

C A P. X X.

Auic. lib. 11.  
F. 3. doc. 1.  
cap. 3.  
DESCRIP-  
TIO  
MORBI.  
CAUSAE.

**A**LIVANDO. Accidit infanti, ut ei eueniat egressio recti intestini, siue procidentia ani, quam Græci appellant *το γοττωσι αγγου νοσσοτις τοις ανι αγγου*. Quamobrem de ipsa agere, non erit absurdum, quæ generatur, ut plurimum, a nimia ventris lubricitate, et humiditate, aut a resolutione musculorum, qui ipsum anum sursum attollunt, uel ab aliqua inflammatione ipsius ani, musculos ipsos cogente, uiolenter distendi. Signa, si ex inflammatione anus procidat, sunt dolor, tumor, & tensio ipsius ani qui cum rubore, & mucositate apparebit. Si uerò erit, sine inflammatione facilis erit cognitio; apparebit enim sine dolore, tumore, & mucositate. Et si euenierit ob lubricitatem alui præteritam, aut humiditatem, ex quibus orta fuerit imbecillitas, & resolutio neruorum, adeo ut ipsum foras prolapsum, sursum retrahere nequeant, facile signa apparebunt per relationem astantium. Et prædicere conuenit; si citrà inflammationem est affectio facilius curationem admittere. Victus ratio, ut sumitur ex ipsa indicatione, in sex rebus non naturalibus, ad calidum, & siccum uergens instituitur. Infans caueat ab omni motu inferiorum partium; & si sine

Cor. Celsus  
lib. 6. cap. 18.  
SIGNA.

Celsus ibid.

Aet. lib. 14.  
cap. 8.  
PROGNO-  
STICA.  
VICTVS  
RATIO.

sine inflammatione est, tunc paretur balneum aquæ calidæ, in quo sedeat ipse infans per modicum spatium temporis, ieiuno stomacho; & balneum ipsum prius ebullitum sit cum verbenæ, malicorio, folijs myrti, rhu, rosis, gallis, balaustijs, acacia, et hypocistide, postea statim, post ipsum balneum, digitis molli-ter, et legitime intromittatur anus. Deinde liniatur pice liquefacta, & super asperso pulvere aloes intrudatur. Vel alio modo, pulvere isto aspergatur, cum animadversione, quod astringentia, ueluti pulveres, & olea non sunt administranda, nisi ano prius intromisso. R. aloes, thuris, gallarum, myrrhæ, mastiches, anti-  
monij, sumachij, balaustiorum, an. drac. ij. & in pulvere redu-  
cantur, et misce, et utitor; Vel R. olei de myrto, de mastiche,  
de cydon. an. dr. s. misce, et inunge. Et si denuò foras anus, ex  
multa humiditate procidere tentabit, tunc decoctio balnei fiat  
in vino astringenti nigro, & decoctioni adde bdellium, pini  
corticem, pilulas cupressi, ungulam caprinam, alumen scissile. Vel  
R. gallæ omphacinæ, malicorij sicci, rhoscoriarij an. dr. ij. plumbi  
ustij. dr. iij. spumæ argenti dr. viij. & in pulvere tritum insper-  
gito. At in infantibus astringentium usum remittere oportet, et  
mitiora adhibere, ueluti ego expertus sum cum balneo loci affecti  
tatum ex uino nigro astringenti parum, prius ebullito cum rosis  
siccis, & menta; & chamæmelo, & sola inunctione post ani  
intromissionem, cum oleo mastichino, & de cydonijs; confert  
etiam urina ipsius infantis calida, statim post mictionem su-  
persusa. Et ne anus ubi repositus introfuerit, denuò foras ex-  
cidat, probe deligandus est cruribus inter se deuinctis. Si ue-  
rò anus ex inflammatione excidat, quod raro in infantibus con-  
tingit; nihilominus, tunc uictus ratio, in omnibus instituat  
urgens ad humidum, & frigidum temperate in principio,

Gal. lib. 9. de  
comp. medz  
sec. loc. c. 6.  
auctoritate  
Aesclepiadis  
Aetius ibide

Paul. lib. 3.  
cap. 6.

postea in statu ad calidum. Et caueat infans à motu, et ex-  
citatione inferiorum; deinde in principio inungendus est anus  
oleo rosaceo calido, et postea chamæmelino, et anethino, et se-  
re conuenit in balneo calido aquæ dulcis, in quo ebullitæ sin-  
prius maluæ, altheæ, et rosæ, et flores chamæmeli, et statim in-  
gere oleis prædictis. Nec non R. uitellum unius oui cocti, et  
contundantur cum tragacantha, postea cum oleo rosaceo, sy-  
porosarum an. q. s. misce. & f. linimentum s. a. fomentatio-  
nes etiã cum spongia factæ, quotidie ante cibum, ex decoctio-  
ne prædicta calida præstant, & inungere statim ut supra. Po-  
stea cum aliquantulum inflammatio remissa fuerit, anus in-  
tromittendus erit, et eundem inungere, & aspergere ex præmis-  
sis oleis, et pulueribus astringentibus, et eundem ligare præstat,  
postquã intus repositus fuerit, ut supra ne iterum exeat.

## DE INTERTRIGINE COXARVM.

### CAP. XXI.

Auic. lib. 1.  
R. 3. doc. 1  
cap. 3.  
DEFINIT.  
MORB.  
CAVSÆ.

SIGNA.

PROGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

**I**NTERTRIGO coxarum infantis, nihil aliud est, quàm  
excoriatio, seu cutis attritio, quæ Græcè uocatur *ωαγὰς*  
et causatur hæc affectio, ut plurimùm ex urinae acrimonia, aut  
deterfione excrementorum, et ut breuiter dicam, ex immu-  
ditia inuolucrum, propter nutricis incuriam suborta. Signa sa-  
tis innotescunt. Prædicendum est ex ipsa excoriatione, seu at-  
tritione facile suboriri inflammationem, seu exulcerationem, et  
dolores, & uigilias. Igitur statim ad curationem properandum  
est, quæ facile perficitur, si nutrici uictus ratio instituatnr, ad  
frigidum, & siccum uergens, & si abstineat ab ijs, quæ in cibo  
calefaciunt, ueluti ab acris, ab allijs, porris, cepis, & rapha-



nis, ab aromatibus, & salsamentis, ab amaris, & similibus;  
Et quotidie, si tam in nutrice, quàm in infante, uel sponte,  
uel arte, alius deiecerit; et si ipse infans, quotidie, reietis fri-  
cationibus, balneetur, si tempus balneandi erit, & si aqua  
balnei, ante ipsum balneum, parum prius bulliat cum uiolis,  
althea, rosis, maluis, ordeo, & furfuribus, & si statim post  
balneum abluantur partes affectæ, cū uino calido, & postea  
istò puluere inspergantur. R. spumæ argenti per se, uel cum  
myrto, sicca, trita. q. s. uel alumen in testa ustum, & tritum  
inspergatur, aut fici folia uista, ac trita cum oleo illinian-  
tur. Et caueat ne cum inunctione salita infans inungatur.  
Nec non si rosarum capita, & flores terantur, & inspergan-  
tur, conferant; uel alio modo R. plumbaginis drac. iij. galla-  
rum drac. i. s. aluminis, myrrhæ, an. dr. s. misce, & omnia  
conterantur, & cum hoc inspergantur; conferunt etiam myr-  
tus contrita, aut radix ireos, aut rosæ, aut cyperum, aut ordeï  
farina, aut lentium.

MEDICA.  
RATIO.

Aet. lib. 14.  
cap. 12.

Aet. ibidem.

Auc. ibidè.

DE PAPVLIS SEV VARIOLIS.

C A P. XXII.

**E**RUPTIONES Similes his, quæ a feruida aqua am-  
bustis emergunt, & sponte per uniuersam infantis cu-  
tem florescunt, a Græcis *ἔρυνθια*, & a Latinis papulæ, &  
pustule uocantur. Et duplices ipsæ papulæ uidentur, quædam  
enim sublimes, quædam uerò latæ. Sublimes a uulgo medi-  
corum morbilli uocantur. Et latæ, & humiles uariolæ; ge-  
nerantur ex crassis, & cuti impactis humoribus, & ubi  
densior pelliculæ superficies extiterit, propullulant morbilli,

DEFINIT.  
MORB.

Auc. lib. 1.  
F. 3. doc. 1.  
cap. 3.  
Paul. lib. 4.  
cap. 8.

CAUSAE.  
Gal. lib. 6.  
aphor. 9: in  
comm.

VACUUM  
CUTIS

SIGNA.

Hip. lib. 6.  
aphor. 9.  
Gal. ibidem  
in comm.PROGNO-  
STICA.

seu sublimiores pustulae a calidioribus, & tenuiore humore sunt, latae uero seu uariolae, a frigidioribus, & crassioribus. Neoterici ut plurimum in infantibus causam esse dicunt, sanguinis ebullitionem, superuenientem per modum putrefactionis, uel nutrimenti menstrualis reliquias, uel propter conceptum faecus tempore mensium fluxionis. Attamen omnes papulae nascuntur, natura corporis profundum expurgante. Quamobrem paucissimi uidentur, qui ad legitimam aetatem perueniant, & hunc morbum effugiant. Signa sunt febris, dolor uehemens capitis, & dorsus, difficultas spiritus, pruritus narium, & aurium, punctiones totius corporis, pādiculationes, & oscitationes crebrae, & initio morbi, facies maculas quasdam ostendit, quae, uel in morbillos tolluntur, uel in uariolas extenduntur. Sublimiores, in tumorem manifestum cutem attollunt, exulcerant, & pruritus excitant. Latae exiguum tumorem efficiunt, neque tamen exulcerant, neque etiā pruritus excitant; Quare, ob duplicem causam, latae pustulae non pruriunt; Vna, quia diffillantur in latitudinem, circū extenta; Altera, quia humor faciens ipsas minorem acrimoniam habet; Et si a sanguine proficiantur, per colorem rubrum, si a bile, per spicuum; a pituita per albedinem; a bile atra per liuorem, cum nigredine apparebunt. Et pustularum ipsarum magna ex parte infantibus, & iuuenibus, rarissime, & cum difficultate senibus, fit eruptio, & progressio istis, quorum cutis crassa, & densa existit. Difficilior autem semper latarum est exitus, quia ex crassioribus humoribus oriuntur, propterea quod magno labore cutem penetrare possunt. Quamobrem si acciderit cutis densitas, saepe intus pustulis detentis, moriuntur, ut in eruptione

prione sublimium pustularum, propter caliditatem, & tenui-  
tatem humoris ipsas facientis, qui eruptionem faciliorem red-  
dit, pauci pereunt. Et quæ ex eis pustulis sunt ulcerosæ, uel  
spissæ, sublimes, rubræ, & parvæ, cum febre, uel nigræ, mor-  
tales sunt. Veluti eæ, quæ anno 1574. per uniuersam ferè  
Italiam, in infantibus grassatæ fuerunt, adeò, ut ferè omnes  
ab earum nequitia affecti, medicina nihil proficiente, interie-  
rint. Quæ autem sunt albæ, rubræ, raræ, latæq; saniores sunt;  
Et secundum sententiam Neotericorum, qui semel a mor-  
bilis, seu uariolis corripitur, non amplius ab ipsis afficitur. In  
curatione autem cum omnes pustulæ procreentur, natura corpo-  
ris profundum expurgante, ut supra dictum est: propterea ca-  
uere oportet summa cum diligetia, ne naturæ motus impedia-  
tur: Ex indicatione igitur istius morbi: aer eligatur calidus,  
& frigidum deuitare oportet, cutem enim densat, & sic pu-  
stularum eruptiones prohibet, & infans in lectulo, aut ulnis,  
stragulis calidis ab iniuria frigiditatis aeris, cooperiatur, &  
probe muniatur, non tamen adeò calidis, ut syncope correptus  
suffocetur. Nutrix legitima fruatur diæta: caueat a fructi-  
bus oïbus recentibus; et præcipue fugacibus, quia facile putre-  
scunt: ab aromatibus, a salitis, ab acris, ab allijs, porris, cæpis,  
raphanis, ab oleribus, et ab oïbus facile calefacietibus, et putre-  
scentibus, et duræ digestionis, et mali succi, et a uino: Ex his, n.  
sanguis augetur, et humores exacuuntur, et utilissimū erit nu-  
trici dulcioribus ferculis pasci, et infantē, neq; pleniorē, neq; ni-  
mis tenui cibo ali. caueat ab animi perturbatione, et a somno  
diurno post cibū, et quotidie se exerceat, secundum consuetudi-  
nem, & alius tam in nutrice, quàm in infante, uel sponte, uel

Auic. lib. 1.  
F. 3. doc. 1.  
cap. 3.

VICTVS  
RATIO.

Paul. lib. 1  
cap. 6. §

Hip. lib. 1.  
aphor. 20.

MEDICA-  
MENT.  
RATIO.

Auic. ibidē.

arte deijciat. Verūm si natura ipsas probè excreuerit pustulas, nullo medicamento, aut alio negotio indigemus. Quae enim iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Si uerò satis non defloruerint, solemus infantes inuolucris rubris inuoluere, ut ad crebrum illius aspectum intuentes, ad exteriora, atque adeò summam cutem ferantur humores, & decoctum ficuum, uel lentium loco potius præbeatur. Vel si fieri poterit, infanti ad adiuuandam pustullarum excretionem hæc præbeatur decoctio. R. radicū apij, alaminthæ, fœniculi petroselini an. M.s. seminum anisorum, asparagorum, rusci an. dr. ij. caricarum ficuum an. numero vi. coquantur omnia in s.q. aquæ, usque ad consumptionem mediæ partis, postea coletur, & cum saccharo q.s. et adiectione syrupi acetosi. simplicis unc. iiij. misce, & s.a.f. potio, de qua detur quotidie infanti mane, & uesperi. unc. iij. aut plus, aut minus, secundum ætatis rationem. Verūm si infans, sumere decoctum ipsum non poterit, nutrici exhibeatur ad pondus unc. vi. Et ubi bene pustulæ defloruerunt, si minus periculosa sunt, dimittantur, donec maturentur, deinde curentur. Si uerò ulcerata fuerint, fiat eis unguentum ex cerusa, & accidit etiā ut necesse sit lauare eas aqua mellis, & pauco nitro, & similiter alchola; cum autem spissa fuerint, indigebunt eo, quod sit uehementius lauabuntur tunc ex aqua nitri, cum lacte mista, ideò, ut tollerari possit; quod si cutis eorum uesicabitur, uaporetur, & lauetur aqua, in qua coctæ fuerint myrtus, & rose, & squinantburn; Et. folia arboris mastiches, & tamarisci. Et quia oculis aliquando ex

isto morbo euenit affectio illa, quæ uocatur a latinis albedo, et a Græcis λευκομα. Propterea ne infans ab ipsa macula corripatur a loco pellucido, siue luminoso, atque rerum intuitu rubrarum remouendus est, oculiq; eius cum collyrio aquæ rosæ, in qua nonnihil sumachij insit, abluendi, & conseruandi sunt. Et si guttur etiam, aut ulceribus, aut erosionē afficiatur, ut euenire quandoq; solet in isto morbo succurrendū est cum succo mororum, uel diamorum, aut uino granatorū, adbibita aqua ordeī, gargarizando. At si in facie infantis, propter ipsius assiduam fricationem, signa uariolarum permixtere post morbi resolutionem uidebuntur, tunc R. pinguedinis humanæ, pinguedinis ursi, medullæ ceruinæ, medullæ bubulæ, balsami ueri, pulueris camphoræ an. partes æquales, musci parum misce, & signa inunge. Vel R. pulueris seminis crucæ, pulueris chrysocolle, alcyonij primi, & secundi, farine fabarum, pulueris sulphuris, lithargirii argentei, cornu ceruiusti, pulueris ireos, pul. tartari albi, pulueris thuris an. dr. s. radice brionie oleo decoctæ, & subtilissime contusæ, olei amygdalarum dulcium, olei è luteis ouorum, olei de myrrha an. unc. s. unguenti rosati. unc. i. misce, & in mortario plumbeo s. a. fiat linimentum, & utitor.

## D E S C A B I E.

## CAP. XXIII.

**Q**UONIAM uerò sæpè ob contagionem facile penetrantem in corpora nostra, infantes a scabie uexari, & tentari uidemus: propterea de hac ipsa affectione in hoc libro silendum nobis non est. Porro ea nihil aliud est, quàm durior cutis rubicunda, ex qua pustulæ cum pruritu oriuntur,

quæ

DEFINIT.  
MORB:  
Cel. lib: 3:  
cap. 28:  
Paul. lib. 4.  
cap. 21

CAUSA.

SIGNA.

Hip. lib. 6.  
aphor. 8.  
Gal. ibidem  
in comm.

PROGNO-  
STIC.  
Auc. ibid.

VICTVS  
RATIO.

quædam humidiores, quædam sicciore, uel est, quæ summâ corporis cutē uaria erosionē figurat, fursureaq; ex se corpuscula edit, cū pruritu, & corporis colliquatione, & à Græcis *Λιγνυ* uocatur. Causa in infante interdum excitatur ob cōtagium, uel si lac fugit propter cibos à nutrico ingestos salso, & nimis calido, & aromata acuta, amaraq;. Duplex autem ab ipsa scabie sumitur indicatio; cū una humidior sit; altera siccior; quæ enim humidior est, generatur a sanguine, cui admiscetur phlegma salsum. Altera, quæ siccior est, existit a sanguine bide flaua permisto; Signa uerò sunt pruritus, cutis rubicunda, & pustulæ quædam latæ, quædam eminentes, a quibus sanies interdum glutinosa, interdum tenuis fluit; cæterum ex ijs, quæ eminentiores sunt, quoniam a calidiore humore generantur, pruritus efficiunt, quod latæ non item; diffilatur enim, & in latitudinem extente, & facientem ipsas humorem minus acrem habent. Et scabies excorticata multiplicatur in autumno. Pruritus materia aggregatur inter duas cutes. Et scabies quidem sæda attrahit exituras, & permutatur ad impetigines, alfabafati, & inducit corporis colliquationem. Scabies uerò si humida est, uictus ratio in omnibus sex rebus non naturalibus (ut indicationis rationem obseruare uideamur) ad frigidum, & siccum uergat; si sicca parum declinet ad humidum. Et nutrix, si infans lac fugit, exercitationi incumbat; euitet diurnum somnum, post cibum; aluus quotidie deiciat, uel sponte, uel arte, clysterijs communibus, uel balanis ex melle, perturbationes animi fugiat; Et inter olera comedere poterit endiuia, lactucam, spinachiam, cichoream, lupulos, & melones, &

cucur

cucurbitas, & similia. Euitet in cibo ea, quæ habent facultatem calefaciendi, prout sunt aromata, salsa, oleagino-  
sa, acuta, & acria, ut allia, porri, cæpe, & raphani; absti-  
neat à uino generoso, uestatur cibus boni succi, & facilis  
concoctionis. Quod uero ad ipsam curationem attinet, du-  
plici ea modo perficitur; uno cum purgatione corporis; al-  
tero loci affecti inunctione. Purgatio statuenda est, hoc  
pacto. Nutrix si lactat infantem, quotidie sumat deco-  
ctionis infra scriptæ. unc. vi. diluculo, per dies septem con-  
tinuos, quæ hoc modo perficitur. R. fumiterra, endi-  
uia, cichoreæ, boraginis, lupulorum, epithymi an. M. i.  
bulliant omnia in s. q. a. usque ad tertias postea coletur  
decoctio; cui adde sacchari optimi. q. s. & denuò lento  
igne bulliat una leni ebullitione; deinde in uase cooper-  
to seruetur. Infanti uero, si ablactatus est, uel si ali-  
quid sumit, exhibere possumus hanc potionem per dies quin-  
que continuos, loco syrupi, diluculo: R. aquæ lactis. unc.  
iij. succi fumiterre. unc. i. misce pro syrupo. Verum post  
quam assumpserit nutrix decoctiones supradictas, sumat,  
per horas duas, ante cibum, manè, bolum istum. R. ele-  
ctuarij lenitiui de dactylis, diacatholicon an. unc. s. misce, &  
cum saccharo. f. b. uel sumat similiter ante cibum per horas  
quatuor pilulas has. R. pilularum de fumoterra, de agarico  
Mesue an. dr. s. cociarum scrup. i. misce, & cū melle rosato  
reformentur p. v. & aurentur. Infanti uero si bimus est, post  
syupos detur agarici præparati drac. i. uel cum saccharo rosa-  
to, uel cū ferculo, quam Itali panatelā uocant, aut reubarbari  
electi, et mundi, contriti scrup. i. cum saccharo rosato. Deinde  
sic

MEDICA  
RATIO.

medici. 191



sic facta purgatione, ad inunctionem deueniendum est, quæ pluribus modis perficitur, at in infante propter virium eius imbecillitatem, mitibus, lenibusq; inunctionibus utendū est.

ADIGM  
OLIAN

Pau. ibidem

Quotidie igitur per tres, aut quinque dies continuos, sero antequam dormitum uadat in loco calido apud ignem nutrix; si scabies humida est, corpus suum in loco affecto unguento hoc inungat. R. succi lapatij acuti. unc. iij. olei de nucibus. unc. i. picis. unc. s. misce, postea parum bulliant lento igne, mox coletur, & colatura addantur sulphuris contriti subtiliter, pulueris tartari an. drac. i. misce, & fiat unguentum. Vel ad siccam scabiem hoc unguento illinito. R. cerussæ, amyli an. unc. s. anchusæ M. i. ceræ, olei rosacei an. unc. ij. anchusam unā cum rosaceo elixato; deinde reliqua inijcito. Vel solo oleo sulphuris puluere misto, calefacto mungito. Infanti uerò post lauacrum, ad ignem, si scabies humida est unguento hoc illinito; R. olei rosacei, laurini an. unc. ij. pulueris salis, nitri, sulphuris. an. drac. iij. styracis drac. ij. misce & inungito. Et si scabies sicca est, hoc unguento inungito. R. terebinthinæ lotæ unc. i. s. butyri unc. s. succi limonum, succi lapatij, & atitor. Vel R. aquæ rosacæ, aquæ ex floribus malorum medicorum an. unc. ij. terebinthinæ, nitri, lithargyrj, an. dr. iij. misce, & utitor. Vel uitis ueteris corticem in uase fictili frigito, eoque locum scabiosum fricato butyroq; illinito. Pruritus uerò a scabie excitatos, aqua marina calida, aut aceto calido perlue. Demum post inunctionem nutritis, & infantis corpora uniuersa abluere aqua calida oportet, & ea induere ad euitandam contagionem uestimentis mundis, nouisq;.

rib: lib. 7:  
cap. 8.



**F**EBRIS Etiam, quæ græcè dicitur πυρετος aliquan-  
do infantibus accidit. In progressu enim cum iam den-  
tire incipiunt, gingivarum prurigines, et febres superueniunt,  
& hoc per consensum ex dolore, et cruciatu pruriginis gingiva-  
rum inflammationem excitantibus. Signa, ex uigilijs per tactū  
caloris extranei, & frequentia pulsus, satis innotescunt. Et  
curatio facilis est, nā probè uictus ratio instituta tantum, post  
ortū dentium, cessante inflammatione, febris cessabit. Igitur nu-  
trici, (si infans lacte nutritur) uictus ratio in oībus institua-  
tur ad humidū, & frigidum uergens, comedat in ferculis, la-  
ctucā, blitū, endiuia, acetosam, spinachia, atriplicē, ordeū, et si-  
milia, quæ simul refrigerāt, et humectāt, lacq; augēt, ueluti ē  
amygdalarū dulciū lac, & ptisana, et syrupus de endiuia, de  
acetosa, uiolarū, acetosus simplex, et similes, tam nutritici, quā  
infanti cōueniunt; pro nutrice hoc mō, R. Syrupi acetosi simpl.  
unc. i. de endi. unc. s. aquarū endiuia, acet. an. unc. i. s. misce pro  
syrupo. Pro infanti uerò, si ablactatus ē, R. Syrupi acet. simpl.  
de endiuia an. unc. s. aquarū endiuia acet. an. unc. i. misce pro  
syrupo, et magis, et minus secūdū ætatis rōnem, morbi, tēporis,  
et loci exigentiā. Et febre persenerāte, post ortū dentium, &  
post assumptionē syruporū quinq; digesta materia, eā educere  
poteris, adhibito uno scrupulo reubarbari electi, cōtriti, uel cū  
saccharo rosato sumpto, uel in infusione cū suis correctiuis, s. a.  
cū decoct. florū, & fructuū cordialiū dissoluto, et in diluculo  
per horas quinq; antè cibū assūpto. Quies ēt ī infante statuēda  
ē, et aluus, ut sepe dictū ē, uel sponte, uel arte quotidie deijciat.

Hip. lib. 3.  
aphor. 25.  
CAUSA.  
SIGNA.  
PROGNO-  
STICA.

VICTVS  
RATIO.

MEDICA.  
RATIO.

Et si uigiliae superuenerint, aut stomachi dolor uomitus, & alia symptomata succurrendum est ipsi infanti, prout a nobis in suis proprijs capitibus, declaratum est.

## DE AMBUSTIS.

CAP. XXV.

DESCRIP-  
TIO  
MORB.  
CAUSA.

SIGNA.  
PROGNO-  
STIC.

VICTVS  
RATIO.  
MEDICA.  
RATIO.

**I**NTERDUM Per incuriam nutricum infantibus accidit etiam, ut uel casu in ignem, uel feruenti aqua, aliquo modo comburantur, quorum corpora combusta *τὸν πυρκαϊστὰ*, Greci uocant. Causa patet. Signa sunt dolor, bullae seu pustulae, & exulceratio. Qui morbus si non recte curatur, ex ipsis ulceribus relinquit, & in facie, & in alijs partibus corporis signa monstrosa, & partes affectae, aliquando exsiccatae, captae, debilesq; remanent. Propterea statim succurrendum est, & uictus ratio in omnibus nutrici instituta ad humidum, & frigidum uergens: loco ambusto hoc modo in principio linimentum hoc, sine ulla dubitatione apponito: Ego enim ipsum expertus sum faeliciter cum multis ambustis, & praecipue cum Angela filia mihi carissima, quae dum tertium decimum mensem ageret in ignem ob incuriam eius nutricis cecidit, et totam fere faciem sibi combusit. R. albuminis duorum ouorum, olei rosati. unc. ij. aquae rosatae unc. i. misce, & simul omnia optimè conuassentur: postea panniculus albus, subtilissimus aut lini, aut serici, qui non sit nimis strictae texturae, madefactus prius in dicto linimento, superponatur loco ambusto, & ligetur, & nunquam auferetur, donec conualescat, sed quotidie bis, terue sine remotione ipsius panniculi, locus affectus super ipsum panniculum inungatur, & illinatur, tran-  
sacto

facto uerò principio, & hoc usque ad diem ambustionis quartum loco albuminis ouorum, ponantur, & conquassentur in dicto linimento uitelli eorum, & semper super ipsum panniculum inungito, donec uideatur cutis regeneratio noua fieri; tunc uerò cum forfice paulatim, de die, in diem, ubi noua cutis ipsa, & sanitas apparuerit, panniculum incidere debemus, adeò ut totus paulatim auferatur, quo ablato, uidebitur locus affectus, procul dubio, sine ullo signo permanere. Et huius rei amplissimum testimonium omnibus afferre possunt *PETRVS, & BALTHASSAR CAROTTI* Humanissimi fratres, probi, ac peritissimi pharmacopœ in ciuitate Verona ad signum aurei plaustri, ubi eorū clara officina medicamentorum salutarium plenissima, assidue ad quotidianum usum pro infirmis a medicis frequentatur; qui modo predicto, ac uirtute istius linimenti sola ab omnibus signis faciei, & totius corporis, infantes quamplurimos combustos, reuocatos, ac incolumes uiderunt. Multa alia inueniuntur remedia ex *Paulo Aegineta, & Aetio*, ad istum morbum attinentia, & ex multis alijs approbatis scriptoribus, qui tibi sunt consulendi. Sed ego fateor ingenuè coram Deo, & hominibus, me nunquam expertum fuisse hoc linimentum, modo superius assignato, nisi fœliciter, & quod penes me, tantquam arcanum habere decreueram; nihilominus utilitatis publicæ causa, in medium mihi proferendum putauì ad laudem, & gloriam  
D. O. M.

Paul. lib. 4.  
cap. 22.  
Aet. lib. 14.  
cap. 64.

# ERRATA, QVAE IN HOC OPERE

impresso penitus vitari non licuit,

sic corrigenda.

Pag.			Pag.		
2.	Pro Biliosi	lege Biliosi	76.	ui expressus	ui expressa
7.	nutrimētiue	nutrimentumue	eadem.	excedens	exedens
13.	emplastei	emplastri	eadem.	Postulæ	Pustulæ
16.	Pupillarum	Papillarum.	eadem.	apparet	apparet
20.	in	si	77.	erysipelas	erysipelas
21.	rosati	rosati	79.	mista	mistæ
22.	præter	præter	80.	fulpharīs	fulphuris
37.	pereunt	pereant	84.	foraminibus	foraminibus
55.	aliquo	aliqua	111.	facili	facilis
56.	uirum	uirum	127.	medicamētorā	medicamentorū
58.	inuidiores	inuidiores	eadem.	iudicabunt	indicabunt
59.	incedendam	incedendum	185.	reietis	reiectis
70.	amare	amaræ	186.	alaminthæ	calaminthæ

